

2021 中医助理医师考试

# 模拟密押卷

2021 年

中医助理医师  
资格考试专用

## 第一单元

### A1

- 足太阴脾经与手少阴心经的交接位置是A.  
胸中  
B. 肺中 C.  
心中 D.  
目内眦E.  
足大趾
- 五脏藏五神，肾藏  
A. 魄  
B. 志  
C. 魂  
D. 神  
E. 意
- 以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是  
A. 阴阳偏盛  
B. 阴阳格拒  
C. 阴阳偏衰  
D. 阴阳互损  
E. 阴阳离决
- 阴中求阳的治法适用于  
A. 阳盛  
B. 阴阳两虚  
C. 阴虚  
D. 阳虚  
E. 阴盛
- 木为火之  
A. 所不胜  
B. 相克 C.  
母  
D. 子  
E. 所胜
- 具有“五脏六腑之海”之称的是  
A. 督脉  
B. 任脉  
C. 冲脉  
D. 带脉  
E. 维脉
- 以下属于奇经八脉生理功能的是  
A. 加强了十二经脉中互为表里的两经之间的联系  
B. 主束骨而利机关  
C. 调节十二经脉的气血  
D. 分主一身左右之阴阳  
E. 加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系8.  
以下病机哪项是以阴阳失调来阐释真寒假热或真热假寒的  
A. 阴阳互损  
B. 阴阳离决  
C. 阴阳偏盛  
D. 阴阳偏衰  
E. 阴阳格拒
- 足手阴经的交接部位是  
A. 肩胛部  
B. 头面部  
C. 胸部 D.  
背部 E.  
四肢部
- 冲脉的基本功能是  
A. 调节阳经气血  
B. 调节阴经气血 C.  
调节十二经气血D.  
维系全身经脉 E.  
主司下肢运动11.  
肾在志为  
A. 怒  
B. 喜  
C. 思  
D. 悲  
E. 恐
- “将军之官，谋虑出焉”指的脏腑是A.  
心

- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

13. 外感六淫中易伤阳气的是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 火邪
- E. 燥邪

14. 五行指导脏腑用药，赤色、苦味入A. 心

- B. 脾
- C. 肺
- D. 肝
- E. 肾

15. 元气生成的主要物质来源是

- A. 肾中精气
- B. 水谷精气
- C. 清气
- D. 脏腑精气
- E. 经气

16. 下列不会导致实证短气的是

- A. 痰饮
- B. 胃肠积滞
- C. 火盛
- D. 气滞
- E. 瘀阻

17. 外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，这种现象称为A.

少气

- B. 短气
- C. 子嗜
- D. 金实不鸣
- E. 金破不鸣

18. 患者恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽。气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。属

- A. 表证
- B. 里证

- C. 寒证
- D. 热证
- E. 阴证

19. 体弱气虚者其坐姿为

- A. 坐而喜俯 B.
- 坐而喜仰 C.
- 坐卧不安 D.
- 但卧不得坐E.
- 但坐不得卧

20. 相兼脉主病中沉涩脉主

- A. 痰热
- B. 血瘀
- C. 痰火
- D. 湿热
- E. 阴虚火旺

21. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是

- A. 身热不扬
- B. 脘腹痞闷
- C. 面黄不泽
- D. 口渴喜饮
- E. 白带量多

22. 临床表现主要为胃脘嘈杂，饥不欲食，干呕呃逆，口燥咽干，舌红少苔，脉细数的证候为

- A. 胃阴虚 B.
- 胃阳虚 C.
- 食滞胃脘D.
- 肝胃不和E.
- 肝脾不调

23. 面色淡黄，枯槁无华称为

- A. 萎黄
- B. 黄胖
- C. 阴黄
- D. 阳黄
- E. 黄疸

24. 形瘦多食者，多属于

- A. 中气虚弱

- B. 中焦有火
- C. 阴虚不足
- D. 阳气不足
- E. 痰湿内盛

25. 下列不属于气虚证临床表现的是

- A. 气短声低 B. 精神疲惫 C. 少气懒言 D. 体倦乏力 E. 脘腹坠胀感

26. 脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表现是

- A. 沉脉
- B. 实脉
- C. 缓脉
- D. 长脉
- E. 滑脉

27. 暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于

- A. 暑为阳邪，其性炎上
- B. 暑性升散，伤津耗气
- C. 暑多夹湿，阻遏气机
- D. 暑性升发，易扰心神
- E. 暑性干涩，易伤津液

28. 既能泻下冷积，逐水退肿，又能祛痰利咽，治疗喉痹的药物是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 牛蒡子
- D. 巴豆 E. 芫花

29. 大蓟治疗血热出血证，多用于治疗

- A. 尿血、血淋
- B. 吐血、咯血
- C. 面部出血 D. 胃肠出血 E. 便血

30. 功效燥湿消痰，下气除满，治疗梅核气

的药物是

- A. 苍术 B. 枳实 C. 厚朴 D. 陈皮 E. 木香

31. 郁李仁的功效是

- A. 润肠通便，润肺止咳
- B. 疏散风热，清肺利咽
- C. 润肠通便，下气利水
- D. 润肠通便，祛痰利咽
- E. 润肠通便，消肿散结

32. 下列各项，不属栀子主治病证的是

- A. 血淋涩痛
- B. 骨蒸潮热
- C. 火毒疮疡
- D. 湿热黄疸
- E. 血热吐衄

33. 辛夷入汤剂宜

- A. 冲服
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 先煎
- E. 烊化

34. 下列药物中既能止咳平喘，又能润肠通便的为 A.

- 薏苡仁B. 火麻仁C. 苦杏仁D. 郁李仁E. 酸枣仁

35. 下列具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 吴茱萸
- D. 高良姜
- E. 附子

36. 下列药物中具有润肺清心，养阴生津功效的是

- A. 石斛
- B. 生地
- C. 麦冬
- D. 黄精
- E. 天冬

37. 具有补血活血，调经止痛，润肠通便功效的药物是

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 三七
- D. 何首乌
- E. 阿胶

38. 下列具有解表退热功效的是

- A. 薄荷
- B. 柴胡
- C. 刺蒺藜
- D. 菟丝子
- E. 钩藤

39. 下列药物中，不具有行气，止痛功效的药物是

- A. 郁金
- B. 白前
- C. 三棱
- D. 姜黄
- E. 川芎

40. 具有养阴生津功效的药物是

- A. 牡丹皮
- B. 赤芍
- C. 紫草
- D. 金银花
- E. 生地黄

41. 补气养血药中加入适量肉桂，其主要目的为

- A. 补而不滞
- B. 发汗解表
- C. 引火归原

D. 鼓舞气血生长

E. 散寒止痛

42. 蒲黄的功效是

- A. 凉血，止血，利尿
- B. 活血，祛瘀，止痛
- C. 止血，化瘀，通淋
- D. 止血，化瘀，利尿
- E. 止血，消肿，生肌

43. 属于桑菊饮功用的是

- A. 消食导滞
- B. 行气化滞
- C. 宣肺止咳
- D. 燥湿和胃
- E. 消痞除癥

44. 酸枣仁汤中益心脾而宁心神的药物是A.

茯苓

- B. 远志
- C. 茯神木
- D. 石菖蒲
- E. 琥珀

45. 不含川芎的方剂是

- A. 温经汤
- B. 四物汤
- C. 越鞠丸
- D. 生化汤
- E. 归脾汤

46. 半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，脉缓无力者。选方为

- A. 桃核承气汤
- B. 小活络丹
- C. 温经汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 补阳还五汤

47. 恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。治宜选用

- A. 越鞠丸
- B. 麻杏石甘汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 九味羌活汤
- E. 大青龙汤

48. 下列不属于至宝丹功用的是

- A. 开窍

- B. 息风
- C. 化浊
- D. 解毒
- E. 清热

49. 属于天台乌药散组成药物的是A.

- 陈皮
- B. 草豆蔻
- C. 肉桂
- D. 厚朴
- E. 川楝子

50. 玉屏风散的功用为

- A. 涩肠止遗
- B. 清热养血
- C. 固冲摄血
- D. 补肾纳气
- E. 益气固表止汗

51. 朱砂安神丸中泻火除烦的药物是A.

- 黄连
- B. 石膏
- C. 竹叶
- D. 知母
- E. 栀子

52. 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有

- A. 炙甘草
- B. 玄参
- C. 黄柏
- D. 生地黄
- E. 酸枣仁

53. 骨髓增生异常综合征血象检查最明显的改变是

- A. 白细胞计数明显增多
- B. 白细胞持续降低
- C. 持续性全血细胞减少
- D. 骨髓巨核细胞减少
- E. 持续性全血细胞增多

54. 富含嘌呤的食物是

- A. 牛奶
- B. 鸡蛋
- C. 动物内脏
- D. 黄瓜
- E. 米饭

55. 肠套叠可见腹痛，并伴有的症状是A. 急性发热

- B. 黄疸
- C. 呃逆
- D. 腹泻
- E. 血便

56. 患者 X 线下见两肺上部有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的疾病为

- A. 肺大泡
- B. 肺脓肿
- C. 浸润型肺结核空洞形成
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 周围型肺癌空洞形成

57. 下列哪项是甲状腺功能减退病人可见的面容

- A. 黏液性水肿面容
- B. 苦笑面容
- C. 无欲貌
- D. 满月脸
- E. 肢端肥大症面容

58. 风湿热引起发热的主要原因是

- A. 坏死物质吸收
- B. 内分泌与代谢障碍
- C. 产热过多
- D. 散热过少
- E. 抗原-抗体反应

59. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 蚕豆病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胰头癌
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 毒蕈中毒

60. 胆囊触痛征（墨菲征）阳性，见于

- A. 胰头癌
- B. 肝癌
- C. 急性胆囊炎
- D. 肝硬化
- E. 胆囊癌

61. 红细胞直径  $>15 \mu\text{m}$  见于

- A. 溶血性贫血
- B. 失血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 再生障碍性贫血

62. 导致内出血低热的原因可能是

- A. 代谢障碍  
B. 植物神经功能紊乱  
C. 无菌性坏死物质吸收  
D. 继发感染  
E. 失血导致体温调节中枢功能障碍
63. 患者，女，18岁。头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑。治疗除主穴外，应配选
- A. 血海、合谷  
B. 中脘、丰隆  
C. 上星、头维  
D. 百会、通天  
E. 率谷、太阳
64. 患者，男性，26岁。因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。针灸治疗除主穴外，宜选取
- A. 风池、合谷  
B. 曲池、合谷  
C. 血海、膈俞  
D. 合谷、大椎  
E. 风池、内关
65. 患者，女性，23岁。月经不调，常提前7天以上，甚至10余日一行。治疗应首选
- A. 气海、三阴交、归来  
B. 关元、三阴交、肝俞  
C. 足三里、脾俞、太冲  
D. 命门、三阴交、足三里  
E. 关元、三阴交、血海
66. 患者，男性，62岁。咳嗽一个月，劳累后加重，咳吐黏稠痰，胸脘痞闷，胃纳减少，舌苔白腻，脉濡滑。治疗除主穴外，还应取
- A. 尺泽、列缺  
B. 脾俞、阴陵泉  
C. 风门、大椎  
D. 丰隆、阴陵泉  
E. 脾俞、胃俞
67. 患者，男，23岁。目赤肿痛，眼涩难开，流泪，畏光，伴发热、恶风、头痛，舌苔薄黄，脉浮数。治疗除取主穴外，还应加
- A. 四白、养老  
B. 风池、侠溪  
C. 印堂、内庭  
D. 少商、外关  
E. 关冲、支沟
68. 患者，男，45岁，天冷外出突觉心前区刺痛，心痛彻背，心慌汗出，面色晦暗，唇甲青紫，舌质紫暗，脉涩，针灸治疗除主穴外，应配
- A. 内关、阴郛  
B. 心俞、脾俞  
C. 膻中、心俞  
D. 神阙、关元  
E. 神阙、至阳
69. 患者体质素弱，近2个月来，呕吐时作时止，倦怠乏力，脘腹痛而喜温喜按，舌苔薄白，脉弱。治疗除主穴外，应选用
- A. 期门、太冲  
B. 脾俞、胃俞  
C. 丰隆、公孙  
D. 上脘、胃俞  
E. 梁门、天枢
70. 患者突然出现左半身活动不利，舌强语蹇，兼眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用
- A. 足三里、气海  
B. 太溪、风池  
C. 丰隆、合谷  
D. 曲池、内庭  
E. 太冲、太溪
71. 患者，女性，35岁。2个月前突发高热，热退后出现周身乏力，并见下肢痿软无力，食少纳呆，腹胀便溏，神疲乏力。治疗本病应选用主要经脉是
- A. 手足阳明经穴、夹脊穴  
B. 手足太阳经穴、夹脊穴  
C. 手足太阴经穴、夹脊穴  
D. 手足厥阴经穴、夹脊穴  
E. 手足少阳经穴、夹脊穴
72. 患者，女性，48岁。失眠1年，多梦少寐，入睡迟，易惊醒，多疑善惊，气短头晕，舌淡，脉弦细。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是
- A. 肝俞、间使  
B. 脾俞、胃俞  
C. 心俞、胆俞  
D. 心俞、肾俞  
E. 心俞、脾俞
73. 患者，男，70岁。右侧肢体活动不利1月，神志清楚，伴舌强语蹇，右侧口角下垂。

治疗应首选的经穴是

- A. 督脉.手厥阴及足太阴经穴
- B. 督脉.手厥阴及足少阴经穴
- C. 督脉.手少阴及足太阴经穴
- D. 督脉.手少阴及足厥阴经穴
- E. 督脉.手少阴及足少阴经穴

74. 患者,女,66岁。夜间难以入睡2月,平素急躁易怒,时有心烦,舌红,苔黄,脉弦数。针刺选穴中具有调理阴阳.安神助眠作用的腧穴是

- A. 后溪、太溪
- B. 后溪、照海
- C. 列缺、申脉
- D. 太溪、申脉
- E. 照海、申脉

75. 患者,男,79岁。哮喘反复发作,声低气怯,气息短促,体质虚弱,舌淡,脉细无力。治疗除相应背俞少外,还应选取的经穴是

- A. 手太阴、手阳明经穴
- B. 手阳明、足太阴经穴
- C. 手太阴、足少阴经穴
- D. 手少阴、足太阴经穴
- E. 手少阴、足少阴经穴

76. 患者,女,26岁。产后乳少,乳房胀满疼痛,胸胁胀闷,舌红,苔薄黄,脉弦。除乳根、膻中、少泽外,应加取

- A. 太冲、内关
- B. 外关、肝俞
- C. 膈俞、期门
- D. 中脘、天枢、期门
- E. 足三里、脾俞、胃俞

77. 患者咽喉肿痛,咽干,口渴,便秘,舌红,苔黄,脉洪大。除少商、合谷、尺泽、关冲外,应加取

- A. 内庭、关冲
- B. 厉兑、天突
- C. 内庭、鱼际
- D. 列缺、照海
- E. 曲池、鱼际

78. 医学伦理学的研究对象是

- A. 医学道德难题
- B. 医学道德关系
- C. 医学基本理论

D. 医学基本规范

E. 医学基本原则

79. 下列除哪项外均是医德品质的内容

- A. 公正
- B. 严谨
- C. 奉献
- D. 乐观
- E. 仁爱

80. 患者权利包括

- A. 平等享有医疗的权利
- B. 获得自己所患疾病真实情况
- C. 拒绝治疗的权利
- D. 监督医疗过程的权利
- E. 以上都是

## A2

81. 患者,男,38岁,现身热,无恶寒,汗出,烦渴,胸闷痛,舌红苔黄,脉数。其证属

- A. 邪热壅肺证
- B. 热扰胸膈证
- C. 风热犯肺证
- D. 燥热犯肺证
- E. 热灼营阴证

82. 患者,女,35岁,现症见面色晦滞,神疲乏力,气短懒言,食少纳呆,肢体麻木,舌淡紫或有瘀点瘀斑,脉细涩。其证属

- A. 气虚证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气血两虚证
- D. 气不摄血证
- E. 气滞血瘀证

83. 患者,男,69岁,近日脘腹痞胀,泛吐清水,伴有胸闷,心悸,息促不得卧,舌苔白滑,脉滑。其证属

- A. 痰证
- B. 水停证
- C. 饮证
- D. 气虚证
- E. 气逆证

84. 患者手足厥寒,腰腿疼痛,口不渴,舌淡苔白,脉沉细。治宜首选的是

- A. 桂枝汤倍桂枝



- B. 桂枝汤去芍药  
C. 桂枝汤倍芍药  
D. 桂枝汤倍芍药，加饴糖  
E. 桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛
85. 患者牙痛牵引头疼，面颊发热，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数。治宜首选的方剂是 A. 黄连解毒汤  
B. 左金丸  
C. 导赤散  
D. 白虎汤  
E. 清胃散
86. 急性上消化道出血患者，查体心率 122 次/分，血压 70/50mmHg，估计患者出血量至少是  
A. 500mL  
B. 1000mL  
C. 1200mL  
D. 1500mL  
E. 2000mL
87. 女性，45 岁，上腹痛 2 天，呕吐，腹胀，血淀粉酶 750U/L (Somogyi)，血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，最可能的诊断为  
A. 急性胃炎  
B. 急性胰腺炎  
C. 急性心肌梗死  
D. 急性肾功能衰竭  
E. 急性肝炎
88. 患者，男，42 岁。哮喘反复发作 5 年，本次发作喘促不能平卧，咳痰清稀，无汗，头痛，脉浮紧。治疗应首选  
A. 中府、列缺、肺俞、尺泽  
B. 肺俞、风门、丰隆、太渊  
C. 膻中、太渊、太溪、肾俞  
D. 天突、定喘、尺泽、膻中  
E. 膏肓、肾俞、太溪、丰隆
89. 患者，男，40 岁。胃脘疼痛隐隐，喜按喜暖，空腹痛甚，纳后痛减，兼见泛吐清水，便溏，手足不温，舌淡苔薄，脉虚弱，在足三里、内关、中脘基础上，应加取  
A. 胃俞、梁门  
B. 下脘、梁门  
C. 太冲、肝俞

- D. 肾俞、太溪  
E. 关元、脾俞、胃俞
90. 某女，17 岁，痫病发作后来诊，发病前有眩晕，胸闷，现痰多，舌红，苔白腻，脉滑。针灸治疗除印堂、鸠尾、间使、太冲、丰隆外，应加用  
A. 曲池、神门、内庭  
B. 合谷、阴陵泉、风池  
C. 心俞、脾俞、足三里  
D. 肝俞、肾俞、太溪  
E. 丰隆、膈俞、内关

## B1

- A. 佐金平木法  
B. 抑木扶土法  
C. 滋水涵木法  
D. 培土生金法  
E. 泻南补北法
91. 肝火犯肺证的治法是  
92. 肝脾不和的治法是  
A. 因时制宜  
B. 因地制宜  
C. 治病求本  
D. 祛除邪气  
E. 因人制宜
93. 属于夏季用药慎用温热的理论依据的是  
94. 属于阴盛之体慎用寒凉的理论依据是  
A. 任脉  
B. 督脉  
C. 带脉  
D. 冲脉  
E. 阴维脉
95. 被称为十二经脉之海的是  
96. 与女子妊娠密切相关的经脉  
A. 虚寒  
B. 真寒假热  
C. 实热  
D. 实寒  
E. 虚热
97. 阴偏衰所形成的病理变化是

98. 阴偏胜所形成的病理变化是

- A. 阴维脉、阳维脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉、阳跷脉

99. 具有维络腰腹，提系胞胎，固护胎元作用的经脉是

100. 维系联络全身阴经和阳经的经脉是

(101~102 题共用备选答案)

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 胶艾汤
- D. 附子汤
- E. 白术散

101. 妊娠腹痛由于阳虚寒甚者，选用

102. 妊娠腹痛由于冲任虚寒者，选用

(103~104 题共用备选答案)

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

103. 歪斜舌多见于

104. 颤动舌多见于

(105~106 题共用备选答案)

- A. 中阳偏旺
- B. 胃家实
- C. 中焦气机壅滞
- D. 脾胃健运
- E. 中脘胀满

105. “中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”，其中“中气实”的最佳解释是

106. “若湿热之证，不夹内伤，中气实者，其病必微”，其中“中气实”的最佳解释是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 舌尖
- B. 舌中
- C. 舌根
- D. 舌两侧
- E. 舌底

107. 肾在舌上分属部位是

108. 肝在舌上分属部位是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 口腔不洁
- B. 食积胃肠
- C. 胃热
- D. 牙疳
- E. 内有溃腐脓疡

109. 口气臭秽者多见于

110. 口臭难闻，牙龈腐烂者多见于

- A. 既能治疗血虚证，又能治疗遗精盗汗证
- B. 既能治疗血虚证，又能治疗胁肋脘腹疼痛
- C. 既能治疗血虚证，又能治疗痈疽疮疡证
- D. 既能治疗血虚证，又能治疗虚劳喘咳证
- E. 既能治疗血虚证，又能治疗出血证

111. 阿胶的主治病证是

112. 白芍的主治病证是

- A. 蕲蛇
- B. 木瓜
- C. 威灵仙
- D. 秦艽
- E. 桑寄生

113. 具有祛风，通络，止痉功效的药物是

114. 具有舒筋活络，和胃化湿功效的药物是

- A. 开窍醒神，清热止痛
- B. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛
- C. 开窍醒神，辟秽止痛
- D. 化痰开窍，凉肝息风，清热解毒
- E. 开窍醒神，清心化痰

115. 麝香的功效是

116. 牛黄的功效是

- A. 滑石
- B. 茵陈
- C. 萆薢
- D. 地肤子
- E. 泽泻

117. 具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

118. 具有清利湿热，利胆退黄功效的药物是

- A. 干姜
- B. 附子
- C. 肉桂
- D. 丁香

E. 吴茱萸

119. 治疗腹痛、泄泻，为温暖中焦之主药的是

120. 治疗阳痿、宫冷，虚阳上浮的药物是

A. 收敛肺气

B. 安蛔止痛

C. 生津止渴

D. 涩精止遗

E. 固冲止血

121. 二陈汤中乌梅的配伍意义是

122. 乌梅丸中乌梅的配伍意义是

A. 猪苓汤

B. 真武汤

C. 实脾散

D. 五苓散

E. 苓桂术甘汤

123. 主治阳虚水泛证的首选方剂是

124. 主治脾肾阳虚，水气内停之阴水的首选方剂是

A. 透邪解郁，疏肝理脾

B. 寒热平调，消痞散结

C. 温阳健脾，行气利水

D. 清胆利湿，和胃化痰

E. 肝疏解郁，养血健脾

125. 四逆散的功用是

126. 逍遥散的功用是

A. 清营解毒，透热养阴

B. 清泻肺热，止咳平喘

C. 清热解毒，凉血散瘀

D. 清肺化痰，逐瘀排脓

E. 清泻肝火，降逆止呕

127. 左金丸的功用是

128. 芩茎汤的功用是

A. 口服碳酸钙

B. 必需氨基酸疗法

C. 补充(OH)

D. 促红细胞生成素

E. 血液透析治疗

129. 慢性肾功能不全出现肾性贫血最合适的治疗药物是

130. 尿毒症患者伴高钾血症最有效降血钾疗法是

A. 慢性阻塞性肺气肿

B. 慢性支气管炎

C. 支气管扩张症

D. 肺炎

E. 急性肺水肿

131. 咳嗽痰量大有分层现象的疾病是

132. 咳嗽咯粉红色泡沫样痰的疾病是

A. 扁平胸

B. 鸡胸

C. 桶状胸

D. 漏斗胸

E. 胸廓局限变形

133. 慢性消耗性疾病患者的胸廓是

134. 慢性阻塞性肺气肿患者的胸廓是

A. 急性白血病

B. 传染性单核细胞增多症

C. 再生障碍性贫血

D. 类白血病反应

E. 特发性血小板减少性紫癜 135.

肝炎病毒可诱发的血液病是

136. 人类 T 淋巴细胞病毒 I 型可诱发的血液病是

A. 病人呼气时进针，吸气时出针

B. 进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针

C. 进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针

D. 出针时摇大针孔而不按

E. 病人吸气时进针，呼气时出针

137. 属于疾徐补法操作的是

138. 属于呼吸泻法操作的是

A. 四肢疼痛

B. 全身疼痛

C. 乳痈

D. 咳嗽

E. 瘾疹

139. 常用大包穴治疗的是

140. 常用血海穴治疗的是

- A.神门
- B.通里
- C.少府
- D.阴郄
- E.少海

141. 在腕横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

142. 在腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

- A. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
- B. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘
- C. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
- D. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
- E. 外踝高点上 2 寸，腓骨前缘

143. 悬钟穴的定位是

144. 丘墟穴的定位是

- A. 目内眦
- B. 目外眦
- C. 目上
- D. 目下
- E. 鼻旁

145. 手少阳经与足少阳经相交接的部位是

146. 手太阳经与足太阳经相交接的部位是

- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
- B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短
- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔

147. 属于提插补法操作的是

148. 属于开阖补法操作的是

- A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
- B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
- C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
- D. 强调人的责任、义务
- E. 生命神圣与生命质量统一

149. 符合“功利论”的是

150. 符合“道义论”的是

## 第二单元

1. 治疗咳血之燥热伤肺证，应首选

- A. 麦门冬汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 桑杏汤
- E. 百合固金汤

2. 下列哪个部位是胃痞的基本病位

- A. 肝胆
- B. 脾胃
- C. 肝脾
- D. 脾
- E. 胃

3. 下列不属于外感腰痛的致病病邪是

- A. 热
- B. 燥
- C. 风
- D. 寒
- E. 湿

4. 尿血与血淋的鉴别，主要在于

- A. 有无尿痛
- B. 尿味的情况
- C. 尿色的深浅
- D. 尿量的多少
- E. 以上均非

5. 治疗胃痛饮食伤胃证的中医治法是

- A. 温胃散寒，行气止痛
- B. 疏肝解郁，理气止痛
- C. 清化湿热，理气和胃
- D. 消食导滞，和胃止痛
- E. 以上均非

6. 治疗呃逆气机郁滞证，应首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 丁香散
- D. 益胃汤
- E. 五磨饮子

7. 治疗胃痛脾胃虚寒证，应首选

- A. 良附丸
- B. 黄芪建中汤

- c.小建中汤  
D.理中丸  
E.附子理中丸
8. 气秘的治法是A.  
通便止痛  
B.益气润肠  
C.润肠通便  
D.顺气导滞  
E.以上均非
9. 以下哪项是健忘的表现  
A.神情呆滞  
B.精神恍惚  
C.善忘前事  
D.告知不晓  
E.智能减退
10. 脾肾两虚型痴呆的治法是  
A.补肾益髓，填精养神  
B.健脾化浊，豁痰开窍  
C.活血化瘀，开窍醒脑  
D.益气养血，清心宣窍  
E.补肾健脾，益气生精
11. 内伤发热虚证的治疗原则不包括的是A.  
清热  
B.养血  
C.滋阴  
D.温阳  
E.益气
12. 冷哮咳痰特点  
A.臭脓痰  
B.痰稠黄胶黏  
C.痰少咯吐不爽，色白而多泡沫  
D.痰如白沫量多  
E.痰黄白相兼
13. 下列情况对胃痞和胸痹的鉴别诊断最具有价值者为  
A.诱因  
B.转归  
C.病位  
D.病程  
E.起病
14. 咳嗽之风寒袭肺证，首选方剂是A.  
荆防达表汤  
B.沙参麦冬汤  
C.桑菊饮  
D.三拗汤合止嗽散  
E.桑杏汤
15. 不适合用清热法治疗的是  
A.流痰后期，阴虚火旺，虚热不退者  
B.药物性皮炎皮损色红灼热  
C.局部红.肿.热.痛  
D.热毒内传之走黄内陷  
E.疮色晦暗不泽，皮温较低
16. 疮疡疾患中，部位表浅，范围较小的急性化脓性疾病是  
A.疔  
B.发  
C.流注  
D.有头疽  
E.无头疽
17. 中医外科学中，温阳托毒法的代表方剂是  
A.右归丸  
B.托里消毒散  
C.金匱肾气丸  
D.六君子汤  
E.神功内托散
18. 疔的病因病机  
A.内郁湿火，外感风邪  
B.营卫不和，气血凝滞  
C.汗出不畅，湿热蕴蒸肌肤  
D.搔抓痱子，破伤染毒  
E.感受暑毒
19. 属于瘾疹的特点是  
A.呈带状分布的红斑上成簇的水疱  
B.大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退  
C.皮肤上浅在性脓疱和脓痂  
D.皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑  
E.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒
20. 桃红四物汤宜用于脱疽的哪一证型  
A.气阴两虚证  
B.血脉瘀阻证  
C.热毒伤阴证  
D.寒湿阻滞证  
E.湿热毒盛证
21. 持“阳非有余，阴常不足”学术观点的医家是  
A.薛己  
B.陈自明

- C.赵献可  
D.陈修园  
E.张介宾
- 22.脾失统摄，冲任不固可导致的妇科疾病是
- A.经期延长  
B.带下臭秽  
C.经行吐衄  
D.痛经  
E.闭经
- 23.经行乳房胀痛肝气郁结证的治法是A.疏肝解郁，行气止痛  
B.疏肝理气，和胃通络  
C.疏肝解郁，活血止痛  
D.疏肝理气，柔肝止痛  
E.疏肝解郁，养血止痛
- 24.治疗经行浮肿脾肾阳虚证，应首选的方剂是
- A.参苓白术散  
B.二仙汤合苓桂术甘汤  
C.肾气丸合苓桂术甘汤  
D.金匱肾气丸  
E.右归丸合苓桂术甘汤
- 25.月经产生机制是
- A.肾气.天癸.冲任.经络协调作用于胞宫  
B.脏腑.天癸.气血.经络协调作用于胞宫  
C.肾气.天癸.气血.冲任调作用于胞宫  
D.脏腑.气血.天癸.冲任调作用于胞宫  
E.脾胃.气血.冲任.经络调作用于胞宫
- 26.分泌晚期，子宫内膜正常厚度为
- A.子宫内膜厚达 3mm  
B.子宫内膜厚达 5mm  
C.子宫内膜厚达 7mm  
D.子宫内膜厚达 8mm  
E.子宫内膜厚达 10mm
- 27.小儿稚阴稚阳学说，是指其生理状态为
- A.脏气清灵，易趋健康  
B.脾常不足，肝常有余  
C.阳常有余，阴常不足  
D.脏腑娇嫩，形气未充  
E.生机蓬勃，发育迅速
- 28.治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是A.乌梅丸  
B.驱虫粉  
C.使君子散  
D.化虫丸  
E.追虫丸
- 29.7 周岁小儿的身长应为
- A.95cm  
B.100cm  
C.105cm  
D.124cm  
E.90cm
- 30.治疗小儿厌食脾失健运证，应首选的方剂是
- A.异功散  
B.平胃散  
C.不换金正气散  
D.保和丸  
E.健脾丸
- 31.治疗小儿厌食脾胃气虚证，应首选的方剂是
- A.补中益气汤  
B.不换金正气散  
C.保和丸  
D.异功散  
E.四君子汤
- 32.小儿遗尿的病机主要是
- A.肝经郁热，疏泄失司  
B.脾肾气虚，下元不固  
C.肾气不足，膀胱虚寒  
D.肺脾气虚，水道失约  
E.心肾失交，水火不济
- 33.下列抗菌药物中是治疗肺炎球菌肺炎首选的是
- A.青霉素  
B.红霉素  
C.四环素  
D.庆大霉素  
E.三代头孢菌素
- 33.关于急性白血病的叙述，不正确的是A.出血的机制是凝血因子缺乏  
B.呈正细胞正色素性贫血  
C.是造血干细胞的恶性克隆性疾病D.半数以上患者以发热起病  
E.感染是最常见的死亡原因之一
- 34.糖化血红蛋白A1可反映平均血糖水平的时间是

- A.6~8周  
B.8~12周  
C.1~2周  
D.2~4周  
E.4~6周
- 35.关于肺心病的说法,错误的是  
A.COPD病史最常见  
B.肺动脉瓣区S2亢进  
C.剑突下可触及心脏搏动  
D.下肢水肿  
E.心力衰竭以左心衰为主
- 36.癫痫单纯部分性发作一般不超过A.  
数十分钟  
B.1小时  
C.不超过1分钟  
D.数分钟  
E.十数分钟
- 37.肺癌常见的淋巴结转移部位是A.  
颌下淋巴结  
B.颈下淋巴结 C.  
颈前淋巴结 D.  
锁骨上淋巴结E.  
腋窝淋巴结
- 38.慢性肾炎治疗措施中不做常规应用的是  
A.避免有损肾功能的因素  
B.应用血小板解聚药  
C.糖皮质激素及细胞毒药物  
D.积极控制血压  
E.优质低蛋白饮食及低磷饮食
- 39.与原发肝癌发病最密切相关的是A.  
戊型肝炎  
B.自身免疫性肝炎  
C.肝血管瘤  
D.乙型肝炎  
E.多囊肝
- 40.可继发再生障碍性贫血的疾病是A.  
慢性肾炎  
B.肾病综合征  
C.急性胰腺炎  
D.病毒性肝炎  
E.糖尿病
- 41.救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是  
A.输注新鲜全血  
B.输注浓缩红细胞悬液  
C.应用呼吸兴奋剂  
D.进行机械通气  
E.高压氧治疗
- 42.有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是  
A.大蒜臭味  
B.汗臭味 C.  
烂苹果味D.  
氨味  
E.肝臭味
- 43.下列有关流脑传染源的叙述,不正确的是  
A.人不是唯一宿主  
B.带菌者是重要的传染源  
C.患者是本病的传染源  
D.流行期间以A群为主  
E.B和C群以散发为主
- 44.下列有关消毒方法的描述,不正确的是  
A.高效消毒法能杀灭一切细菌繁殖体  
B.中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物  
C.低效消毒法只能消灭细菌繁殖体.部分真菌和亲脂性病毒  
D.灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物  
E.超声波消毒法属于低效消毒法
- 45.属于随时消毒的是  
A.传染病患者的尸体处理  
B.传染病室日常消毒  
C.传染病患者转科后病室的消毒  
D.SARS患者入院后对其原居住地的消毒  
E.传染病患者出院后对其所用物品的消毒
- 46.下列肝功能检查指标中,对诊断重型肝炎有重要意义的是  
A.胆碱酯酶下降  
B.血清胆红素升高  
C.胆酶分离  
D.凝血酶原活动度(PTA)≤40%  
E.血清白/球比值倒置
- 47.发生传染病暴发时,要求有关单位向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限为  
小时内  
B.2小时内

- C.3 小时内  
D.4 小时内  
E.5 小时内
48. 预防肺结核的最主要措施是
- A.禁止随地吐痰  
B.隔离和有效治疗排菌患者  
C.健全防痨组织  
D.加强登记管理  
E.接种卡介苗, 化疗
49. 中医诊断开办错误的是
- A. 中医诊所应当将本诊所的诊疗范围在诊所的明显位置公示  
B. 中医医师的姓名在诊所的明显位置公示  
C. 中医诊所的执业范围在诊所的明显位置公示  
D. 设备完善的情况下可进行外科手术治疗  
E. 需将诊所的名称.地址.诊疗范围.人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案
50. 未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是
- A.经济补偿  
B.赔礼道歉  
C.赔偿责任  
D.行政处分  
E.行政处罚

## A2

51. 某患者尿血日久, 体倦乏力, 气短声低, 面色不华, 舌质淡, 脉弱, 治疗应首选
- A.归脾汤  
B.十灰散  
C.小蓟饮子  
D.知柏地黄丸  
E.无比山药丸
52. 患者胸胁支满, 心下痞闷, 胃中有振水音, 脘腹喜温畏冷, 背寒, 呕吐清水痰涎, 水入易吐, 口渴不欲饮, 心悸, 气短, 头晕目眩, 食少, 形体逐渐消瘦, 舌苔白滑, 脉弦细而滑。其治法是
- A.温化寒湿  
B.逐水化饮  
C.宣肺化饮  
D.淡渗利水  
E.温脾化饮
53. 患者低热, 头晕眼花, 身倦乏力, 心悸不宁, 面白少华, 唇甲色淡, 舌质淡, 脉细弱。其主治方剂是
- A.清骨散  
B.补中益气汤  
C.归脾汤  
D.金匱肾气丸  
E.以上均非
54. 患者, 女性, 31 岁, 症见入寐困难 1 个月, 多梦, 胸闷胁胀, 急躁易怒, 伴头晕头胀, 口干口苦, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉弦数。治疗方剂是
- A.泻心汤  
B.当归龙荟丸  
C.龙胆泻肝汤  
D.滋水清肝饮  
E.礞石滚痰丸
55. 患者, 女性, 56 岁。有 15 年肺胀病史, 1 周前劳累后出现面部水肿, 呼吸喘促难续, 心悸, 胸脘痞闷, 尿少, 怕冷, 纳呆, 舌苔白滑, 脉沉细。治疗应首选
- A.参附汤  
B.金匱肾气丸  
C.济生肾气丸  
D.真武汤合五苓散  
E.实脾饮
56. 患者平素眩晕, 耳鸣, 突然发生口舌歪斜, 舌强语蹇, 半身不遂, 但其神志清楚, 舌红, 脉弦细数。其治法是
- A.平肝潜阳, 活血通络  
B.祛风化痰通络  
C.息风清火, 豁痰开窍  
D.滋阴潜阳, 息风通络  
E.以上均非
57. 某患者, 有哮喘反复发作史。气短声低, 自汗, 怕风, 常易感冒, 倦怠无力, 食少便溏, 或喉中时有轻度哮鸣, 痰多质稀色白, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。其诊断是
- A.虚喘, 肺虚证  
B.虚喘, 肾虚证  
C.哮喘缓解期, 肺脾气虚证  
D.哮喘缓解期, 脾虚证



E.哮喘缓解期，肾虚证

58. 患者腹内积块明显，硬痛不移，面黯消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫暗苔薄，脉细涩。其证候是

- A.瘀血内结证
- B.正虚瘀结证
- C.肝气郁滞证
- D.食滞痰阻证
- E.气滞血阻证

59. 患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。其治法是

- A.清化湿热，理气和胃
- B.化瘀通络，理气和胃
- C.养阴益胃，和中止痛
- D.温中健脾，和胃止痛
- E.以上均非

60. 胸痹患者，女性，45岁。胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A.寒凝气滞证
- B.气虚血瘀证
- C.饮邪上犯证
- D.痰浊闭阻证
- E.心血瘀阻证

61. 患者，男，46岁，头痛以前额为甚，面红，牙痛，便干，舌红苔黄，脉弦。处方用药加用白芷，其经络归属为

- A.厥阴经
- B.少阳经
- C.太阳经
- D.阳明经
- E.少阴经

62. 张某，女性，28岁。10分钟前进食冰淇淋后，出现呃逆，呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。其诊断是

- A.呃逆脾胃阳虚证
- B.呃逆气机郁滞证
- C.呃逆之胃寒气逆证
- D.胃痛脾胃虚寒证
- E.呃逆胃火上逆证

63. 李某，男性，40岁。反复胃脘疼痛8年，近2天，胃脘疼痛，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，黑便，舌质紫暗，脉涩。其治疗应首选的方剂是

- A.身痛逐瘀汤
- B.复元活血汤
- C.血府逐瘀汤
- D.失笑散合丹参饮
- E.桃核承气汤

64. 李某，男性，35岁。7天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A.肺痈溃脓期
- B.咳嗽痰热蕴肺证
- C.肺痈初期
- D.肺痈恢复期
- E.肺痈成痈期

65. 患者，右足怕冷，麻木疼痛，间歇性跛行年余。近两个月来足痛加剧，夜难入寐，步履艰难，足背动脉搏动消失。应诊断为

- A.痹证
- B.脱疽
- C.糖尿病足
- D.下肢静脉炎
- E.雷诺综合征

66. 患者王某，便时肛内常有肿物脱出，色紫黯，甚则表面溃破糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗宜选用

- A.草薢渗湿汤
- B.补中益气汤
- C.马勃散
- D.升麻葛根汤
- E.以上均非

67. 患者外生殖器出现疣状赘生物，色灰，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。其证候是

- A.血脉瘀阻证
- B.湿热壅盛证
- C.营血两伤证

- D.邪毒内陷证  
E.湿毒下注证
68. 患者，被毒蜂叮咬后引发皮炎，皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治疗方剂为
- A. 龙胆泻肝汤  
B. 五味消毒饮合黄连解毒汤  
C. 萆薢化毒汤合黄连解毒汤  
D. 萆薢渗湿汤合龙胆泻肝汤  
E. 清瘟败毒饮合黄连解毒汤
69. 患者，女，46岁。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。其诊断是A. 静脉曲张性外痔  
B. 结缔组织性外痔  
C. 血栓性外痔  
D. 混合痔  
E. 内痔脱出
70. 患者尿路结石，发病急骤，腰腹疼痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿赤，血尿，舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是
- A. 济生肾气丸  
B. 龙胆泻肝汤  
C. 化坚二陈丸合石韦散  
D. 三金排石汤  
E. 金铃子散合石韦散
71. 患者，男，38岁。左足大趾剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，溃破腐烂，身热口干，舌红，苔黄腻，脉弦数。其辨证是 A. 寒湿阻络证  
B. 血脉瘀阻证  
C. 湿热毒盛证  
D. 热毒伤阴证  
E. 气阴两虚证
72. 陈某，女，婚后5年未怀孕，月经多推后几天，经来小腹胀痛，经色紫黯，有血块，块下痛减，有时经行不畅；伴见肛门坠痛，性交痛；舌质紫黯，脉弦细涩。治疗选用 A. 少腹逐瘀汤  
B. 苍附导痰丸  
C. 百灵调肝汤  
D. 养精种玉汤  
E. 以上均非
73. 已婚女性，26岁。月经延后2周，量少，色淡，质稀，心悸少寐，小腹绵绵作痛，面色苍白，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选A. 大补元煎  
B. 十全大补汤  
C. 人参养营汤  
D. 补中益气汤  
E. 四君子汤
74. 患者张某，经期烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是 A. 清肝泄热，解郁安神  
B. 清热化痰，宁心安神  
C. 补血养心，安神定志  
D. 祛痰通络，安神定志  
E. 以上均非
75. 患者每值月经前后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。中医治法可采用
- A. 健脾和胃，益气和血  
B. 疏肝健脾，燥湿止泻  
C. 温阳补肾，健脾止泻  
D. 健脾渗湿，理气调经  
E. 以上均非
76. 患者带下量多，色黄，如豆渣状，阴部瘙痒；皖闷纳差，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是
- A. 健脾益气，升阳除湿  
B. 温肾培元，固涩止带  
C. 滋肾益阴，清热利湿  
D. 清热利湿，疏风化浊  
E. 清利湿热，佐以解毒杀虫
77. 患者，女，25岁，未婚。近半年经前、经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色黯有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是
- A. 少腹逐瘀汤  
B. 当归芍药散  
C. 调肝汤  
D. 圣愈汤  
E. 膈下逐瘀汤

78. 患儿，3岁。平素饮食肥甘厚味，现症见汗出，以自汗为主，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为汗证，其治法为

- A. 益气养阴
- B. 调和营卫
- C. 益气固表
- D. 清热泻脾
- E. 清热固表

79. 患儿，5岁。诊断为猩红热，现壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治疗首选的方剂是

- A. 益胃汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 竹叶石膏汤
- D. 增液承气汤
- E. 凉营清气汤

80. 患儿，3岁，诊断为肺炎喘嗽，证见咳嗽日久不愈，伴有低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，脉细数。其中医辨证为

- A. 肺脾气虚证
- B. 阴虚肺热证
- C. 气阴两虚证
- D. 风热郁肺证
- E. 毒热闭肺证

81. 患儿，4岁。突然出现神昏惊厥，伴发热头痛，咳嗽流涕，咽红，舌苔薄黄，脉象浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 紫雪丹
- C. 柴葛解肌汤
- D. 银翘散
- E. 银翘散合羚角钩藤汤

82. 患儿，2岁。患有痫证，起病前常有惊吓史。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，

舌淡红，舌苔白，指纹色青。治疗应首选的方剂是

- A. 镇惊丸
- B. 涤痰汤
- C. 定痫丸
- D. 远志丸
- E. 定魄丸

83. 患儿，8个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹啼叫，已解清稀大便3次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

- A. 脾虚泻
- B. 脾肾阳虚泻
- C. 湿热泻
- D. 风寒泻
- E. 伤食泻

84. 患儿，1岁。形体消瘦显著，面色萎黄，食欲不振，肚腹膨胀，青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，舌淡苔腻，脉沉细而滑。诊断为疳证，治疗宜用

- A. 健脾丸
- B. 资生健脾丸
- C. 消食导滞丸
- D. 肥儿丸

85. 患儿流涕、咳嗽4天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀。其证 A. 痰热咳嗽

- B. 心阳虚衰
- C. 风寒闭肺
- D. 风热闭肺
- E. 痰热闭肺

86. 男性，56岁，身高175cm，体重75kg，因2个月内体重下降5kg而就诊，查空腹血糖7.9mmol/L，下列正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
- C. 可诊断继发性糖尿病
- D. 可诊断糖耐量减低
- E. 应进行100g口服葡萄糖耐量试验

87. 男性, 39 岁, 发作时先觉胃部一股气体上升, 并有咀嚼、吞咽动作, 喃喃自语, 走动, 似在找东西, 呼唤无反应, 持续约 4 分钟。其癫痫的发作类型是

- A. 强直-阵挛性发作
- B. 失神发作
- C. 复杂部分性发作
- D. 脑缺血发作
- E. 假性发作

88. 患者高热.胸痛.咳嗽.咳痰, 经检查诊断为肺炎链球菌肺炎, 其治疗应首选的药物

- A. 青霉素
- B. 红霉素 C.
- 甲硝唑 D.
- 氧氟沙星
- E. 头孢唑啉钠

89. 患者 59 岁, COPD 病史 11 年, 近来因咳.痰.喘加重就诊, 查体示 P2 亢强, 剑突下可触及心脏搏动, 该患者最可能的诊断是

- A. 合并支气管肺炎
- B. 合并支气管扩张
- C. 合并冠心病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. COPD 急性加重期

90. 男性, 36 岁, 反复浮肿, 高血压 4 年, 近日气喘明显, 深大呼吸, 查血红蛋白 60g/L, 双肺呼吸音清晰, 未闻及啰音, 心率 92 次/分, 节律整齐。患者气喘最可能的原因是A.

- 心功能不全
- B. 贫血
- C. 酸中毒
- D. 上呼吸道感染
- E. 水肿

91. 女性, 54 岁, 类风湿关节炎病史 5 年, 可生活自理, 不能参加工作, 活动受限, 其关节功能障碍的分级是

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级

E. V 级

92. 女性, 29 岁, 因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是

- A. 轻度贫血
- B. 血沉增快
- C. C 反应蛋白升高
- D. 心脏超声示少量心包积液
- E. 手部 X 线检查未见骨质改变

93. 女性, 47 岁, 既往健康, 晨练时突然出现剧烈头痛伴喷射性呕吐, 拟诊为蛛网膜下腔出血, 尽快确诊应首选的检查是

- A. 脑血流图
- B. 脑脊液检查
- C. 脑血管造影
- D. 出凝血项目检测
- E. 免疫学检查

94. 男性, 40 岁, 慢性肝炎病史 14 年, 近来腹胀、消瘦。查体: 巩膜黄染, 右上腹部触到拳头大、质硬、表面不光滑包块。最可能的诊断是

- A. 原发性肝癌
- B. 转移性肝癌
- C. 慢性活动性肝炎
- D. 肝脓肿
- E. 肝硬化

### A3

(95-97 题共用题干)

患者男性, 56 岁, 肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄, 脉弦。

95. 该病诊断为

- A. 颤证
- B. 痹证
- C. 痿证

D.痫证

E.癲证

96. 该病治法为

A.平肝潜阳，熄风活络

B.舒筋止颤，镇肝熄风

C.填精补髓，育阴熄风

D.益气养血，濡养筋脉

E.清热化痰，平肝熄风

97. 该病代表方剂是

A.导痰汤合羚角钩藤汤

B.人参养荣汤

C.龟鹿二仙膏

D.天麻钩藤汤合镇肝熄风汤加減

E.地黄饮子

(95-97 题共用题干)

患者，女性，48岁。既往有焦虑、忧愁病史，常因情志抑郁起病。此次因与他人发生争执后，症状加重。遂来就诊。现症见：情绪不宁，心悸健忘，失眠多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

98. 其中医诊断为

A.郁证

B.癲证

C.痫证

D.狂证

E.虚火喉痹

99. 其中医辨证为

A.心脾两虚证

B.气郁化火证

C.心肾阴虚证

D.肝气郁结证

E.心神失养证

100. 治疗宜首选的方剂是

A.归脾汤

B.天王补心丹

C.羚角钩藤汤

D.镇肝息风汤

E.甘麦大枣汤

(101-103 题共用题干)

患者于某，女性，58岁。两年前曾患“中风”，经治已愈，之后逐渐出现善忘呆滞，言语模糊不清，行为古怪孤僻，时哭时笑，症见两目黯晦，舌黯，脉细涩。

101. 其诊断是

A.中风恢复期

B.中风后遗症

C.郁证

D.健忘

E.痴呆

102. 其辨证分型是

A.髓海不足证

B.瘀血内阻证

C.风痰瘀阻证

D.气虚络瘀证

E.痰浊蒙窍证

103. 其治法是

A.活血化瘀，开窍醒脑

B.豁痰开窍，健脾化浊

C.祛风化痰，通络化瘀

D.益气养血，化瘀通络

E.搜风化痰，行瘀通络

(104-106 题共用题干)

患者，女，52岁。肉瘿病史3年，近来颈前肿块突然增大，质地坚硬如石，推之不动。

104. 应首先考虑的是

A.失荣

B.瘰疬

C.瘰疬

D.气瘿

E.石瘿

105. 以下不属于此病病因病机的是

A.情志不畅

B.气滞血瘀

C.肉瘿日久转化而来

D.痰瘀互结

E.外感风邪

106. 首选治疗方法为

A.手术切除

B.化疗

C.理疗

D.化疗配理疗

E.阳和膏外涂

(107-109 题共用题干)

患者，女，33岁，已婚。经血非时而下，淋漓不尽，色紫暗。有块。小腹胀痛。舌紫苔薄白，脉涩。

107. 辨病为

A.崩漏

- B. 经间期出血
- C. 经期延长
- D. 月经先后无定期
- E. 痛经

108. 辨证为

- A. 血瘀证
- B. 脾虚证
- C. 虚热证
- D. 肾虚证
- E. 气虚证

109. 治疗首选

- A. 固冲汤
- B. 固本止崩汤
- C. 右归丸
- D. 清热固经汤
- E. 逐瘀止血汤

(110-112 题共用题干)

患儿，2 岁。发热咳嗽 2 天，高热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，突见面色苍白，口唇紫绀，精神萎靡，肋下痞块，舌质紫，苔薄白，指纹紫滞。

110. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热闭肺
- B. 毒热闭肺
- C. 邪陷厥阴
- D. 心阳虚衰
- E. 痰热闭肺

111. 治疗宜采用的治法为

- A. 辛温宣肺，化痰止咳。
- B. 温补心阳，救逆固脱
- C. 清心开窍，平肝息风
- D. 补肺益气，健脾化痰
- E. 清热涤痰，开肺定喘

112. 治疗采用的代表方为

- A. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 人参五味子汤
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 羚角钩藤汤合牛黄清心丸
- E. 麻杏石甘汤

(113-118 题共用题干)

男，24 岁。突然意识不清，跌倒，全身强直数秒钟后抽搐，咬破舌。2 分钟后抽搐停止。醒后活动正常。

113. 首选应考虑的疾病是

- A. 脑出血
  - B. 脑血栓
  - C. 蛛网膜下腔出血
  - D. 癫痫
  - E. 脑栓塞
114. 应进一步做的检查是

- A. 头颅 X 线片
- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒 (TCD)

115. 治疗的首选药物是

- A. 降颅压药
- B. 溶栓治疗
- C. 止血药
- D. 扩血管药
- E. 抗癫痫药

(116-118 题共用题干)

男性，55 岁的心房颤动患者，近期反复出现发作性眩晕，眼球震颤，伴有恶心、呕吐，每次持续 10 分钟。查体无神经系统异常。急诊 CT 未发现与症状相关的病灶。

116. 目前可能的诊断是

- A. 脑动脉瘤
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑血管畸形
- E. 短暂性脑缺血发作

117. 出现以上症状及体征，完全恢复最长应在

- A. 6 小时内
- B. 12 小时内
- C. 24 小时内
- D. 48 小时内
- E. 72 小时内

118. 预防复发应首先的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 丙戊酸钠
- D. 胞二磷胆碱
- E. 降纤酶

B1

- A. 黄芩.黄连
- B. 金钱草.海金沙
- C. 延胡索.川楝子
- D. 茵陈.黄柏
- E. 大黄.芒硝

119. 胁痛肝胆湿热证, 若兼见发热.黄疸, 应加用

120. 胁痛肝胆湿热证, 如砂石阻滞胆道, 应加用

- A. 小便混浊, 白如泔浆, 尿道不痛
- B. 小便混浊, 状如脂膏, 尿热涩痛
- C. 发热, 小便赤热, 尿时灼痛
- D. 排出砂石, 排尿中断, 腰酸绞痛
- E. 小腹胀满, 尿涩疼痛, 余沥不尽

121. 膏淋的临床特点是  
122. 尿浊的临床特点是

- A. 左归丸
- B. 大补元煎
- C. 滋水清肝饮
- D. 黄连阿胶汤
- E. 二阴煎

123. 治肾精不足之眩晕首选  
124. 治疗肾虚头痛首选

- A. 暖气呃逆, 呕吐痰涎
- B. 水饮不下, 面浮足肿
- C. 胸膈痞胀, 暖气则舒
- D. 胸膈刺痛, 痛处固定不移
- E. 食道干涩, 饮食难下

125. 噎膈痰气交阻证的主症特点是  
126. 噎膈瘀血内结者的主症特点是

- A. 防风通圣散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 当归饮子
- D. 消风散
- E. 麻黄桂枝各半汤

127. 治疗瘾疹风寒束表证, 采用的治疗方药为

128. 治疗瘾疹风热犯表证, 采用的治疗方药

为

- A. 清热凉血, 解毒消斑
- B. 清利湿热, 解毒通络
- C. 养血滋阴, 润肤息风
- D. 清热泻火, 凉血解毒
- E. 活血化瘀, 解毒通络

129. 治疗白疔湿毒蕴阻证, 采用的治疗方法为

130. 治疗白疔火毒炽盛证, 采用的治疗方法为

- A. 疏肝理气, 散瘀除热
- B. 滋养肝肾, 育阴清热
- C. 补益血气, 甘温除热
- D. 补益肾气, 清热调经
- E. 活血化瘀, 清热凉血

131. 经行发热肝肾阴虚证的治法是  
132. 经行发热血气虚弱证的治法是

- A. 血热证
- B. 血虚证
- C. 气虚证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

133. 恶露量多, 色紫红, 有块, 腹痛拒按, 其辨证是

134. 恶露量多, 色红有臭气, 其辨证是

- A. 热.烦.渴.饮, 疹稠色暗, 神昏抽搐
- B. 热.咳.喘.痰, 疹稠色暗
- C. 热.咳.涕.泪, 麻疹黏膜斑
- D. 热.烦.汗出, 皮疹透发 E. 疹没脱屑, 低热不退

135. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是  
136. 麻疹邪入肺胃证的主要证候是

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散合养阴清肺汤
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

137. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是

138. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是

- A. 甲状腺呈弥漫性或结节性肿大,  $^{131}\text{I}$  摄取率高但能够被 T3 所抑制, 对 TRH 反应正常
- B. 心悸、出汗、怕热、粗大肌肉震颤, 但测定甲状腺功能正常, 无突眼
- C. 甲状腺肿大大多呈弥漫性、对称性, 较软, 可伴震颤及杂音, 有突眼, 吸碘率增高伴高峰前移
- D. 有发热, 短期内甲状腺肿大, 触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高, 血沉增高, 摄  $^{131}\text{I}$  碘率下降
- E. 易疲劳、怕冷、体重增加、嗜睡, 血清 TSH 增高, TT3、TT4 降低

139. Graves 病的特点是

140. 亚急性甲状腺炎的特点是

- A. PaO<sub>2</sub> 为 50mmHg, PaCO<sub>2</sub> 为 40mmHg
- B. PaO<sub>2</sub> 为 50mmHg, PaCO<sub>2</sub> 为 60mmHg
- C. PaO<sub>2</sub> 为 65mmHg, PaCO<sub>2</sub> 为 40mmHg
- D. PaO<sub>2</sub> 为 70mmHg, PaCO<sub>2</sub> 为 40mmHg
- E. PaO<sub>2</sub> 为 70mmHg, PaCO<sub>2</sub> 为 45mmHg

141. 符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

142. 符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

- A. 黄疸
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 血便
- E. 急性发热

143. 肠梗阻可见腹痛, 并伴有

144. 肠套叠可见腹痛, 并伴有

- A. 鼠疫、霍乱
- B. 狂犬病、流行性乙型脑炎
- C. 登革热、炭疽
- D. 阿米巴性痢疾、肺结核
- E. 黑热病、包虫病

145. 丙类传染病是

146. 甲类传染病是

- A. 肥达反应
- B. 临床表现
- C. 尿培养
- D. 粪便培养

E. 血培养

147. 流脑确诊的依据是

148. 伤寒确诊的依据是

- A. 医师的社会地位
- B. 医师的执业条件
- C. 医师的职责
- D. 医师的权利
- E. 医师的义务

149. 医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

150. 医师在执业活动中, 人格尊严、人身安全不受侵犯体现了