

诊断学基础
习题课

1、属于感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热
- E. 广泛性皮炎

2、属于无菌性坏死物质吸收导致发热的是

- A. 风湿热
- B. 急性溶血
- C. 脑出血
- D. 甲状腺功能亢进症
- E. 慢性心功能不全

3、表现典型弛张热的是

- A. 风湿热
- B. 疟疾
- C. 渗出性胸膜炎
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

4、表现典型稽留热的是

- A. 风湿热
- B. 疟疾
- C. 渗出性胸膜炎
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

(5~7 题共用选项)

- A. 败血症
- B. 结核病
- C. 伤寒
- D. 霍奇金病
- E. 急性肾盂肾炎

5、热型呈稽留热的是

6、热型呈弛张热的是

7、热型呈间歇热的是

CA

8、典型心绞痛的疼痛性质

- A. 灼痛
- B. 刺痛痛
- C. 闷痛
- D. 压榨样痛
- E. 酸痛

9、下列哪个疾病胸痛后体力活动后反而减轻

- A. 心绞痛

- B. 心肌梗死
- C. 胸膜炎
- D. 心脏神经症
- E. 返流性食管炎

10、患者，男性，35岁。40分钟前因情绪激动突发胸骨后闷痛，疼痛可向左臂放射，舌下含服硝酸甘油未见缓解。心电图检查存在室性心律失常。既往有冠心病病史。首先考虑

- A. 心绞痛
- B. 心肌梗死
- C. 急性心功能不全
- D. 干性胸膜炎
- E. 肺梗死

11、胸痛常表现为呼吸时加重，屏气时消失的疾病是

- A. 食管癌
- B. 急性心肌梗死
- C. 干性胸膜炎
- D. 支气管肺癌
- E. 肋间神经痛

12、血尿伴剧烈腹痛最常见于

- A. 过敏性紫癜
- B. 膀胱结核
- C. 泌尿系结石
- D. 肾炎
- E. 肾肿瘤

13、下列各项，可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是

- A. 消化性溃疡
- B. 胆道蛔虫梗阻
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻
- E. 急性弥漫性腹膜炎

(14~16题共用选项)

- A. 刀割样痛
- B. 烧灼样痛
- C. 压榨样痛
- D. 绞痛
- E. 胀痛

14、消化性溃疡的疼痛性质

15、胆道蛔虫症梗阻的疼痛性质

16、肾结石的疼痛性质

BD

17、咳嗽带有鸡鸣样吼声见于

- A. 百日咳
- B. 纵膈肿瘤
- C. 支气管肺癌
- D. 喉炎

E. 喉癌

18、犬吠样咳嗽，可见于

A. 急性支气管炎

B. 肺结核

C. 肺癌

D. 支气管哮喘

E. 急性喉炎

19、可见干性咳嗽的疾病是

A. 慢性咽喉炎

B. 胸膜炎

C. 慢性支气管炎

D. 肺脓肿

E. 肺炎

20、引起痰分层现象的疾病是

A. 慢性支气管炎

B. 肺脓肿

C. 肺结核

D. 肺炎链球菌性肺炎

E. 心源性哮喘

(21~22 题共用选项)

A. 肺结核

B. 支气管扩张症

C. 胸膜炎

D. 喉头水肿

E. 上呼吸道感染

21、上述各项，常出现咳嗽、咯血伴低热、盗汗的是

22、上述各项，常出现咳嗽、咯血伴大量脓痰的是

A

(23~24 题共用选项)

A. 咳大量脓痰

B. 干咳无痰

C. 咳铁锈色痰

D. 咯吐大量鲜血

E. 咳粉红色泡沫痰

23、急性左心功能不全，常伴有

24、肺炎链球菌肺炎，常伴有

25、引起我国咯血最常见的疾病是

A. 肺结核

B. 肺淤血

C. 肺部恶性肿瘤

D. 肺炎球菌性肺炎

E. 肺梗死

26、大量咯血的日咯血量是

A. 100-200ml

- B. 200-300ml
- C. 300-400ml
- D. 400-500ml
- E. 大于 500ml

27、慢阻肺时，呼吸困难主要特点是

- A. 呼吸深快
- B. 吸气费力
- C. 呼吸深慢
- D. 呼气费力
- E. 吸气与呼气均费力

28、引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 气胸
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 大块肺不张
- D. 气管肿瘤
- E. 支气管哮喘

29、下列不属于心源性呼吸困难的是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 端坐呼吸
- C. 夜间阵发性呼吸困难
- D. 憋醒被迫体位
- E. 呼吸深大而规则

30、吗啡中毒引起呼吸性困难的主要原因是

- A. 兴奋呼吸中枢
- B. 是支气管痉挛
- C. 使肺淤血
- D. 肺泡弹性减弱
- E. 呼吸中枢受抑制

31、水肿多表现为局限性的是

- A. 心源性水肿
- B. 肝性水肿
- C. 营养不良性水肿
- D. 肾性水肿
- E. 血管神经性水肿

(32~33 题共用选项)

- A. 丝虫病
- B. 慢性肾炎
- C. 肝硬化
- D. 甲减
- E. 右心功能不全

32、常可引起非凹陷型水肿的是

33、常可引起局部性水肿的是

34、下列疾病，多表现为下垂性水肿的是

- A. 肝硬化

- B. 肾小球肾炎
- C. 右心衰竭
- D. 血管神经性水肿
- E. 甲状腺功能减退症

35、肾源性水肿者，其水肿常出现的部位是

- A. 下肢
- B. 上肢
- C. 眼睑
- D. 胸腔
- E. 腹腔

36、发生妊娠呕吐最主要的原因是

- A. 精神因素
- B. HCG 增加
- C. 维生素 B6 缺乏
- D. 前庭功能障碍
- E. 颅内压增高

37、下列除哪项外，均可出现反射性呕吐

- A. 洋地黄中毒
- B. 急性胃炎
- C. 胃肿瘤
- D. 胆囊炎
- E. 急性腹膜炎

38、呕吐物为个餐食物，并含腐酵气味，提示疾病是

- A. 胆道蛔虫
- B. 胃炎
- C. 上消化道出血
- D. 幽门梗阻
- E. 低位梗阻

39、引起上消化道出血最常见的疾病是

- A. 胃癌
- B. 胃炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 消化性溃疡
- E. 肝硬化

40、符合阻塞性黄疸表现的是

- A. 粪便颜色加深
- B. 尿中胆红素阴性
- C. 尿中尿胆原增加
- D. 心率加快
- E. 血清碱性磷酸酶明显增高

41、溶血性黄疸的主要特点是

- A. 血中结合胆红素明显增高
- B. 血中非结合胆红素增高
- C. 血中两种胆红素一定均增高

D. 尿胆红素阳性

E. 尿胆原阴性

42、可引起阻塞性黄疸的疾病是

A. 原发性胆汁性肝硬化

B. 系统性红斑狼疮

C. 毒蕈中毒

D. 蚕豆病

E. 病毒性肝炎

43、可引起肝细胞性黄疸的疾病是

A. 梗阻后胆汁不畅

B. 钩端螺旋体病

C. 溶血病

D. 蚕豆病

E. 珠蛋白生成障碍性贫血

44、可引起黄疸持续性加重的疾病是

A. 急性胰腺炎

B. 肝炎

C. 胆石症

D. 肝癌

E. 胆道蛔虫症

(45~47 题共用选项)

A. 破伤风

B. 铅中毒

C. 癫痫

D. 低钙抽搐

E. 蛛网膜下腔出血

45、抽搐前伴剧烈头痛的是

46、抽搐伴瞳孔散大、意识丧失的是

47、抽搐伴苦笑面容的是

E48、昏睡的主要临床表现是

A. 呼唤和推动身体不能使其清醒

B. 对强烈疼痛刺激可唤醒

C. 角膜、对光反射消失

D. 腱反射消失

E. 能正确回答问题

49、肝颈静脉回流征阳性主要见于

A. 左心衰

B. 肝硬化

C. 心包积液

D. 急性心肌梗死

E. 肾功能不全

50、属于意识大部分丧失，强刺激也不能唤醒，但对疼痛刺激有反应的是

A. 深昏迷

B. 意识模糊

- C. 中度昏迷
- D. 昏睡
- E. 浅昏迷

51、下列不属于“既往史”的是

- A. 过去曾患过传染病
- B. 过敏史
- C. 预防接种史
- D. 外伤手术史
- E. 吸烟史

52、下列除哪项外，均符合问诊的要求

- A. 态度和蔼，言语亲切
- B. 对危重病人只扼要询问，待病情缓和后再补充
- C. 医生要多提出诱导性的问题
- D. 交谈时避免使用特定意义的医学术语
- E. 要将病人陈述的内容去粗取精，去伪存真

53、主诉应包括的内容是

- A. 对治疗的反应
- B. 发病时间
- C. 治疗过程
- D. 就诊过程
- E. 此次发病的全过程

(54~55 题共用选项)

- A. 双颊暗红，口唇紫绀
- B. 表情淡漠，反应迟钝，呈无欲状态
- C. 面色苍白，颜面浮肿
- D. 眼裂增宽，眼球突出，目光闪烁，呈惊恐貌
- E. 面色潮红，兴奋不安，口唇干燥

54、典型二尖瓣面容的是

55、典型伤寒面容的是

A (56~57 题共用选项)

- A. 慢性病面容
- B. 二尖瓣面容
- C. 伤寒面容
- D. 甲亢面容
- E. 苦笑面容

56、消瘦，两眼球突出，兴奋不安，呈惊恐貌，多见于

57、两颧紫红，口唇发绀，多见于

58、蜘蛛痣罕见的部位是

- A. 面颊部
- B. 前臂
- C. 上臂
- D. 手臂
- E. 下肢

59、急性有机磷杀虫药中毒患者呼出气的气味是

- A. 腥臭味
- B. 刺激性蒜味
- C. 烂苹果味
- D. 氨味
- E. 酒味

60、下列情况不引起瞳孔缩小的是

- A. 吗啡
- B. 毛果芸香碱
- C. 虹膜炎
- D. 有机磷中毒
- E. 阿托品药物

61、可出现草莓舌的疾病是

- A. 贫血
- B. 结核
- C. 猩红热
- D. 维生素缺乏症
- E. 慢性萎缩性胃炎

62、胸廓一侧膨隆多见于

- A. 肺不张
- B. 肺纤维化
- C. 大量胸腔积液
- D. 心包积液
- E. 肋骨骨折

63、下列各项，叩诊不出现浊音的是

- A. 胸壁水肿
- B. 肺不张
- C. 肺空洞
- D. 胸膜粘连增厚
- E. 胸腔积液

(64~65 题共用选项)

- A. 肺气肿
- B. 大量胸腔积液
- C. 气胸
- D. 支气管肺炎
- E. 肺不张

64、肺部叩诊呈过清音的是

65、胸部叩诊呈鼓音的是

A

66、主动脉听诊区的位置是

- A. 胸骨左缘第 2 肋间
- B. 胸骨右缘第 2 肋间
- C. 胸骨左缘第 3、4 肋间
- D. 心尖部
- E. 剑突下偏左、偏右处

67、正常心尖搏动的位置是

- A. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 0.5-1.0cm 处
- B. 左侧第 5 肋间锁骨中线外 0.5-1.0cm 处
- C. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 1.5-2.0cm 处
- D. 左侧第 5 肋间锁骨中线外 1.5-2.0cm 处
- E. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 2.0-2.5cm 处

(68~69 题共用选项)

- A. 收缩期吹风样杂音
- B. 舒张期隆隆样杂音
- C. 舒张期叹气样杂音
- D. 连续性机器样杂音
- E. 乐音样杂音

68、二尖瓣狭窄的杂音是

69、主动脉瓣关闭不全的杂音

B

70、听诊可闻及心尖区舒张期杂音的是

- A. 三尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 以上都不是

71、主动脉瓣狭窄，可出现的体征是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨右缘第 2 肋间隙舒张期震颤

72、叩诊发现心影呈梨形的是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 室间隔缺损

73、高血压性心脏病左心室增大，其心脏浊音界呈

- A. 心腰部凸出
- B. 梨形
- C. 靴形
- D. 烧瓶形
- E. 普大型

74、第二心音听诊的特点是

- A. 不如第一心音清脆
- B. 音调较高
- C. 音调较低
- D. 历时较长

E. 强度较响型

75、下列各项，最常出现心尖部舒张早期奔马律的是

- A. 左心衰竭
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 心包炎
- D. 感染性心内膜炎
- E. 肺源性心脏病

76、下列各项，不会出现枪击音的疾病是

- A. 发热
- B. 严重贫血
- C. 甲状腺功能亢进症
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	A	E	C	A	E	D	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	E	B	D	D	A	E	B	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	E	C	A	E	D	D	E	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	D	A	C	C	B	A	D	D	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	B	D	E	C	A	B	C	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	C	B	A	B	D	B	E	B	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	C	C	A	C	B	A	B	C	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	A	C	B	A	E				