

2021 执业医师考试

压轴命题卷



2021 年

金英杰口腔学院
医师资格考试专用



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

第一单元

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

多肽链中主链骨架的组成是

- A.-NCCNNCCNNCCN-
- B.-CONHCONHCONH-
- C.-CHNOCHNOCHNO-
- D.-CNOHCNOHCNOH-
- E.-CNHOCHNOCHNO-

2. 竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是

- A. $K_m \uparrow V_{MAX}$ 不变
- B. $K_m \downarrow V_{MAX} \downarrow$
- C. K_m 不变 , $V_{MAX} \uparrow$
- D. $K_m \downarrow , V_{MAX} \uparrow$
- E. $K_m \downarrow , V_{MAX}$ 不变

3. 糖异生途径是

- A.可逆反应的过程
- B.没有膜障
- C.不需耗能
- D.在肾的线粒体及细胞质中进行
- E.肌细胞缺乏果糖双磷酸酶-1 而不能糖异

4. 呼吸链位于

- A.线粒体内膜
- B.线粒体外膜
- C.细胞膜
- D.核膜
- E.内质网膜

5. 体内氨基酸代谢库中的氨基酸参与的代谢活动不包括

- A.嘌呤碱的合成当
- B.嘧啶碱的合成
- C.血红素的合成
- D.糖异生作用
- E.甘油二酯的合成

6. tRNA 的结构特点不包括

- A.含甲基化核苷酸
- B.5'末端具有特殊的帽子结构
- C.三叶草形的二级结构
- D.局部有双链结构
- E.含有二氢尿嘧啶环

7. 关于“基因表达”的概念，叙述错误的是

- A.其过程总是经历基因转录及翻译的过程



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- B.某些基因表达产物是蛋白质分子 D.改善微循环
- C.某些基因表达经历基因转录及翻译等过程 E.可用于中毒性肺炎
- D.某些基因表达产物是 RNA 分子
- E.某些基因表达产物不是蛋白质分子
- 8.原癌基因异常激活而形成癌基因的主要方式不包括
- A.乙酰化和磷酸化
- B.获得启动子和增强子
- C.原癌基因扩增
- D.染色体易位
- E.点突变
- 9.药物的 ED₅₀ 值愈大，表示其
- A.毒性愈大
- B.毒性愈小
- C.作用愈小
- D.安全性愈大
- E.治疗指数愈高
- 10.以下对阿托品抗休克的描述不正确的是
- A.解除血管痉挛
- B.扩张支气管，改善呼吸
- C.舒张外周血管
- D.改善微循环
- E.可用于中毒性肺炎
- 11.胺碘酮的药理作用包括
- A.有翻转使用依赖性
- B.拮抗β受体
- C.明显延长 APD 和 ERP
- D.增加窦房结传导性
- E.收缩冠状动脉
- 12.庆大霉素的适应证除外
- A.支气管肺炎
- B.脑膜炎
- C.结核病
- D.烧伤感染
- E.细菌性痢疾
- 13.下列微生物中只含一种核酸的是
- A.支原体
- B.噬菌体
- C.立克次体
- D.螺旋体
- E.衣原体
- 14.不属于原核细胞型微生物的是
- A.新生隐球菌





B.梅毒螺旋体

C.免疫缺陷病

C.结核分枝杆菌

D.月中瘤

D.衣原体

E.移植排斥反应

E.立克次体

18.下列膜分子中，与 B 淋巴细胞摄取抗原

15.关于梅毒螺旋体致病性与免疫性的描述，

有关的是

错误的是

A.FcR

A.人是梅毒的唯一传染源

B.mIg

B.梅毒螺旋体是通过内毒素和外毒素致病

C.MHC I 类分子

C.一、二期梅毒传染性强，而对机体的破

D.黏附分子

坏性小

E.MHC II 类分子

D.二期梅毒传染性小，而对机体的破坏性

19.补体激活旁路途径中不包括

大

A.C3 裂解为 C3a 和 C3b

E.梅毒的免疫力为感染性免疫

B.C4 裂解为 C4a 和 C4b

16.呼吸道感染的病毒是

C.C5 裂解为 C5a 和 C5b

A.甲型肝炎病毒

D.膜攻击复合物的形成

B.脊髓灰质炎病毒

E.过敏毒素的产生

C.轮状病毒

20.T 细胞活化时只有第一信号，缺乏第二

D.流感病毒

信号，其结果将导致

E.HIV

A.T 细胞分裂

17.免疫监视功能低下易导致

B.T 细胞凋亡

A.超敏反应

C.T 细胞处于克隆无能状态

B.自身免疫病

D.T 细胞克隆扩增

更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- E.T 细胞活化
- 21.边缘嵴的生理功能是
- A.排溢食物的主要通道
 - B.将食物局限在(牙合)面窝内
 - C.有引导侧方运动的作用
 - D.捣碎食物的主要工具
 - E.咀嚼时联合切削的作用
- 22.牙根为接近牙冠长的 2 倍，根颈横切面的形态为卵圆三角形的牙齿是
- A.上颌中切牙
 - B.下颌中切牙
 - C.上颌尖牙
 - D.下颌尖牙
 - E.上颌第一前磨牙
- 23.上颌第一磨牙的斜嵴组成是
- A.近中颊尖三角嵴和远中舌尖三角嵴相连形成
 - B.近中舌尖三角嵴和远中颊尖三角嵴相连形成
 - C.远中舌尖二角嵴相连形成
 - D.近、远中颊尖三角嵴相连形成
 - E.近中舌尖和近中颊尖三角嵴相连形成
- 24.上、下颌磨牙形态区别中，不正确的是
- A.上颌磨牙的牙冠呈斜方形
 - B.上颌磨牙的牙冠较直
 - C.下颌磨牙的牙冠倾向舌侧
 - D.上颌磨牙颊尖钝而舌尖锐
 - E.下颌磨牙一般为双根
- 25.根管最狭窄的地方是
- A.约距根尖孔 1mm 处
 - B.约距根尖 1mm 处
 - C.约距根中 1/3 与根尖 1/3 交界处
 - D.约距根颈 1/3 与根中 1/3 交界处
 - E.约在根管口处
- 26.尖牙保护牙合的脸型特点是
- A.侧方(牙合)运动时，工作侧只有尖牙形成接触
 - B.侧方(牙合)运动时，工作侧只有尖牙脱离接触
 - C.侧方(牙合)运动时，非工作侧只有尖牙形成接触
 - D.侧方(牙合)运动时，非工作侧只有尖牙脱离接触
 - E.非正中(牙合)时，双侧尖牙形成均匀接触



27. 寻找颏孔时，常作为标志的牙是
 A. 下颌中切牙 D. 蝶骨翼突钩
 B. 下颌侧切牙 E. 颏小凹
 C. 下颌尖牙
30. 不参与软腭构成的肌肉是
 A. 颤帆张肌
 B. 颤帆提肌
 C. 咽上缩肌
 D. 颤舌肌
 E. 颤垂肌
28. 左侧侧方咀嚼运动，研磨食物开始阶段的生物杠杆是
 A. 左侧髁突为支点，左侧降颌肌为力点，研磨食物处为重点
 B. 左侧髁突为支点，右侧降颌肌为力点，研磨食物处为重点
 C. 右侧髁突为支点，左侧升颌肌为力点，研磨食物处为重点
 D. 右侧髁突为支点，右侧升颌肌为力点，研磨食物处为重点
 E. 研磨食物处为支点，左侧升颌肌为力点，右侧髁突为重点
31. 蝶骨翼突钩位于上颌第三磨牙后内侧面约是
 A. 0.5~1.0cm
 B. 1.0~1.5cm
 C. 1.5~2.0cm
 D. 2.0~2.5cm
 E. 以上都不是
32. 下颌骨较易发生骨折的薄弱部位不包括
 A. 颏孔区
 B. 下颌孔区
 C. 正中联合处
 D. 下颌角
 E. 髁突颈部
33. 下颌做侧方运动时，同时收缩的肌肉不



- 包括 A.来源于颈总动脉
- A.对侧的翼外肌下头 B.开始在颈内动脉前内侧，继而转到前外
- B.对侧的翼内肌 侧
- C.同侧的咬肌 C.在颈部有一系列分支
- D.对侧的咬肌 D.上行于腮腺的浅面，形成终支—颞浅动脉
- E.同侧的颞肌 E.暂时阻断颈外动脉，颞浅动脉和面动脉
- 34.关于关节韧带的描述，正确的是 均无波动
- A.颞下颌韧带是颞下颌关节内侧面一对坚强的侧副韧带
- B.颞下颌韧带亦是颞下颌关节外侧面坚强的侧副韧带
- C.下颌主要由茎突下颌韧带悬挂
- D.防止下颌过度向前移位的韧带是蝶下颌韧带
- E.颞下颌韧带主要防止关节向前方脱位
- 35.颧牙槽嵴是
- A.起自颧突，伸向上颌第二磨牙
- B.位于上颌骨后部
- C.是上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志
- D.为翼外肌浅头的附着点
- E.在面部或口腔前庭不易触及
- 36.关于颈外动脉的描述，错误的是
- A.来源于颈总动脉
- B.开始在颈内动脉前内侧，继而转到前外
- C.在颈部有一系列分支
- D.上行于腮腺的浅面，形成终支—颞浅动脉
- E.暂时阻断颈外动脉，颞浅动脉和面动脉
- 37.关于唇淋巴的叙述中，错误的是
- A.下唇中部的淋巴管，不交叉至对侧
- B.上、下唇的淋巴管均可注入下颌下淋巴结
- C.下唇的淋巴管有时可注入耳前或颈深上淋巴结
- D.下唇外 1/3 的淋巴管可通过颏孔进入下颌骨
- E.下唇中部的淋巴管主要注入颏下淋巴结
- 38.胃癌或食管癌淋巴结转移时常可侵及的淋巴结是
- A.脊副淋巴结
- B.左锁骨上淋巴结
- C.右锁骨上淋巴结



- D.颈深上淋巴结 可见的结构是
- E.颈深下淋巴结 A.舌深动脉
- 39.鼻腭神经局麻的表面标志是 B.舌深静脉
- A.切牙乳头 C.舌下神经伴行静脉
- B.腭大孔 D.舌下神经
- C.腭小孔 E.舌神经
- D.颏孔 43.翼下颌间隙内的结构主要有
- E.颧牙槽嵴 A.舌神经、下牙槽神经及下牙槽动、静脉
- 40.分布于下颌牙及其牙周膜、牙槽骨的神 B.颊神经、舌神经和下牙槽神经
- 经是 C.翼丛、舌神经和下牙槽神经
- A.颊神经 D.颊神经、舌神经和上颌动脉
- B.舌神经 E.舌神经、下牙槽神经和面深动脉
- C.下牙槽神经 44.行气管切开术时，应将患者头部处于
- D.颏神经 A.头偏一侧
- E.腭前神经 B.头正中位
- 41.导致眼睑不能闭合，可能损伤的神经是 C.头俯位
- A.面神经颞支 D.头后仰位
- B.面神经颧支 E.头正中后仰位
- C.面神经颊支 45.咀嚼效率是指
- D.面神经下颌缘支 A.嚼碎一定量食物所需的时间
- E.面神经颈支 B.在一定时间内嚼碎食物的数量
- 42.舌系带与伞襞之间的三角区域内，清晰 C.在一定时间内将食物嚼碎的能力



D.将一定量食物嚼碎的能力 B.下后牙咬合平面

E.在一定时间内将一定量食物嚼碎的程度 C.颊垫尖

46.面神经颅外段的分支不正确的是 D.翼下颌韧带

A.颞支 E.腮腺导管开口

B.颧支

50.上颌侧切牙牙冠唇舌面外形高点应在

C.颊支

A.牙冠唇舌面中 1/3 处

D.下颌支

B.牙冠唇舌面 1/2 处

E.颈支

C.牙冠唇舌面切 1/3 处

47.面神经颊支

D.牙冠唇舌面颈缘处

A.出腮腺前缘行于咬肌筋膜深面

E.牙冠唇舌面颈 1/3 处

B.一般与腮腺导管平行

51.腭裂是由于

C.来自颤面干

A.侧腭突和鼻中隔未联合的结果

D.损伤时口角歪斜

B.侧腭突和中鼻突未联合的结果

E.位于耳屏问切迹与鼻翼上缘的连线

C.侧腭突和前腭突未联合的结果

48.发自髓室底至根分叉处的管道是

D.侧腭突和上颌突未联合的结果

A.管问吻合

E.侧腭突和下颌突未联合的结果

B.根管侧支

52.决定牙尖数目多少的是

C.根尖分歧

A.成釉器

D.侧支根管

B.牙乳头

E.副根管

C.牙囊

49.下牙槽神经阻滞麻醉的主要标志是

D.生长中心

A.口腔前庭沟

E.牙板

53. 成熟牙釉质中的蛋白质主要是
 A. 釉原蛋白和非釉原蛋白
 B. 釉丛蛋白
 C. 成釉蛋白
 D. 釉蛋白
 E. 釉原蛋白和釉丛蛋白
54. 牙釉质牙本质界弧形的凹面
 A. 与牙釉质生长线平行
 B. 朝向牙本质
 C. 朝向牙釉质
 D. 与施雷格板平行
 E. 与釉板长轴平行
55. 牙髓属于
 A. 神经组织
 B. 疏松结缔组织
 C. 致密结缔组织
 D. 黏液组织
 E. 脂肪组织
56. 被覆黏膜的特点不包括
 A. 表层无角化
 B. 粒层不明显
 C. 上皮与结缔组织交界比较平坦
- D. 有较疏松的黏膜下组织
 E. 胶原纤维粗大，排列紧密
57. 早期牙釉质龋透明层的表现是
 A. 晶体孔隙增加，约占牙釉质容积的 0.1%
 B. 镁和碳酸盐含量降低
 C. 釉柱晶体从核心处开始溶解
 D. 釉柱排列改变
 E. 少量脱矿
58. 牙周炎始发期上皮下结缔组织内的炎症细胞浸润主要为
 A. B 淋巴细胞
 B. T 淋巴细胞
 C. 浆细胞
 D. 中性粒细胞
 E. 巨噬细胞
59. 骨嗜酸性肉芽肿病变为
 A. 慢性播散型
 B. 亚急性播散型
 C. 急性播散型
 D. 慢性局灶型
 E. 急性局灶型
60. 来源于缩余釉上皮的囊肿是



A.发育性根侧囊肿

E.乳头状囊腺瘤

B.牙龈囊肿

64.下列不是腺泡细胞癌构成细胞的是

C.萌出囊肿

A.空泡细胞

D.残余囊肿

B.闰管样细胞

E.炎性根侧囊肿

C.透明细胞

61.下述变化不是扁平苔藓病理表现的是

D.腺泡样细胞

A.上皮钉突不规则伸长

E.肌上皮细胞

B.基底细胞液化变性

65.单囊型成釉细胞瘤I型的组织学特点是

C.胶原纤维变性

A.囊腔衬里上皮基底细胞层细胞核深染

D.上皮下疱形成

B.基底细胞呈栅栏状排列，核靠近基底膜

E.胶样小体出现

C.基底层以上的细胞的细胞质出现空泡变

62.口腔鳞癌最少发生转移的是

性

A.舌癌

D.中心部细胞类似于成釉器的星网状层

B.颊癌

E.周边部细胞呈柱状

C.牙龈癌

66.舌的发育始于

D.唇癌

A.胚胎第2周

E.口底癌

B.胚胎第3周

63.组织发生来自闰管储备细胞的肿瘤是

C.胚胎第4周

A.基底细胞腺瘤

D.胚胎第5周

B.嗜酸性腺瘤

E.胚胎第6周

C.管状腺瘤

67.牙体硬组织的形成始于

D.Warthin瘤

A.帽状晚期



- | | |
|---------|--------------------|
| B.帽状早期 | E.严重期胶原纤维破坏消失 |
| C.钟状晚期 | 71.以下病理变化提示念珠菌感染的是 |
| D.钟状早期 | A.上皮棘层增生 |
| E.牙板形成期 | B.基底膜部分被炎症破坏 |
- 68.唾液腺的排泄管
- A.与闰管相延续
 - B.又称纹管
 - C.可穿行于小叶间结缔组织中
 - D.管壁为单层柱状上皮
 - E.为最细小的终末分支部分
- 69.牙根尖部完全发育形成是在牙萌出的
- A.0.5~1年
 - B.2年
 - C.2~3年
 - D.4年
 - E.4~5年
- 70.关于复发性阿弗他口炎，以下错误的是
- A.40%~50%的患者有家族史
 - B.不会发生于牙龈、硬腭
 - C.早期黏膜上皮水肿，继而形成非特异性溃疡
 - D.愈合后不留瘢痕
- 
- | | |
|------------------------|-------------------|
| C.角化层内有中性粒细胞浸润，常形成微脓肿 | D.结缔组织内充血的毛细血管 |
| E.上皮表层过度角化 | 72.肉芽肿性唇炎的典型病理改变为 |
| A.血管周围上皮样细胞、淋巴细胞及浆细胞聚集 | B.上皮下疱 |
| B.上皮内疱 | C.上皮中心易发生坏死 |
| D.结节中心易发生坏死 | E.导管扩张，有慢性炎细胞浸润 |
| E.艾滋病患者在口腔可出现以下表现，除外 | A.毛状白斑 |
| | B.坏死性龈炎 |
| | C.Kaposi肉瘤 |
| | D.Wegener肉芽肿 |
| | E.非霍奇金淋巴瘤 |



- 74.关于口腔毛状白斑，以下错误的是
- A.口腔分泌物常可检出 EB 病毒
 - B.本病通常发生于牙龈
 - C.病变区 T 细胞功能降低
 - D.上皮过度不全角化可形成刺状突起
 - E.靠近表层 1/3 的棘细胞层常可见肿大的气球样细胞
- 75.关于牙本质龋透明层，错误的说法是
- A.牙本质小管变窄
 - B.管腔中矿物盐沉积
 - C.硬度较正常牙本质高
 - D.存在轻度的脱矿
 - E.可出现脂肪变层
- 76.关于牙本质龋脱矿层，错误的说法是
- A.小管形态不完整
 - B.无细菌侵入
 - C.色素容易沉着
 - D.有再矿化现象发生
 - E.部分成牙本质细胞突变性坏死
- 77.托姆斯颗粒层位于
- A.牙釉质牙本质界内侧
 - B.牙本质小管周围
- C.牙本质钙质小球之间
- D.根部牙本质透明层的内侧
- E.冠部牙本质透明层的内侧
- A2
- ◆每一道考试题都是以一个小案例出现的，其下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。
- 78.磷酸戊糖途径又称为磷酸葡萄糖酸旁路，产生 ATP 供能不是其主要功能，它的主要功能是生成
- A.5-磷酸核糖和 NADH+H⁺
 - B.6-磷酸果糖和 NADPH+H⁺
 - C.3-磷酸甘油醛和 NADH+H⁺
 - D.5-磷酸核糖和 NADPH+H⁺
 - E.6-磷酸葡萄糖酸不口 NADH+H⁺
- 79.一个工人被派去打扫洒在地上的白色粉末，不久后发现其出现呼吸困难和惊厥，通过检测发现白色粉末为鱼藤酮，鱼藤酮进入人体的作用是抑制
- A.氧气的运输
 - B.血液流动
 - C.线粒体呼吸链



D.外周信号转导

E.不一定

E.肌肉收缩

83.患者，女，74岁。自觉因擦背着凉后

80.有机磷农药中毒时，受到抑制的酶是

两肩和后背阵阵酸痛，每次10分钟左右，

A.己糖激酶

无发热，仍可下床走动。于今晨1时许，

B.胆碱酯酶

突然出现心前区剧痛，并向双肩、后背和

C.碳酸酐酶

左臂放射，伴大汗，休息后不见缓解，早

D.乳酸脱氢酶

8点急诊住院。检查：年迈，半卧位，无

E.含巯基的酶

明显青紫，颈静脉不怒张，肺(-)，心略向

81.6个月女婴，母乳喂养未添加辅食，面

左侧扩大，心律尚齐，未闻心脏杂音及摩

色苍黄、嗜睡，诊断巨幼细胞贫血，主要

擦音。心电图：病理性Q波，ST段抬高，

原因是缺乏

T波倒置。诊断：急性心肌梗死。为防止

A.蛋白质

室性心律失常的发生，患者应立即给予的

B.铁

药物是

C.维生素A

A.奎尼丁

D.维生素B₂

B.利多卡因

E.维生素B₁₂

C.普萘洛尔

82.某患者表现巩膜和皮肤黄染，诊断为溶

D.胺碘酮

血性黄疸，那么其血中胆红素变化情况为

E.苯妥英钠

A.直接胆红素升高，间接胆红素改变不大

84.患者，女，34岁。为免疫缺陷患者，

B.间接胆红素升高，直接胆红素改变不大

现合并严重革兰氏阴性杆菌感染，最好选

C.间接胆红素和直接胆红素两者都升高

用的氨基糖苷类药物是

D.间接胆红素和直接胆红素两者都不升高

A.阿米卡星



B.奈替米星

D.MART-1

C.卡那霉素

E.TGFBR1

D.庆大霉素

88.下列关于 AIDS 的说法，不正确的是

E.妥布霉素

A.HIV 主要侵犯 CD4⁺T 细胞

85.对噬菌体的描述正确的是

B.常伴发 Kaposi 肉瘤

A.具有细胞结构

C.易发机会感染

B.包含两种核酸

D.疫苗预防有效

C.有严格的宿主特异性

E.可以通过血液等途径传播

D.不能侵袭细菌

89.患者，男，70岁。上下牙列缺失，上

E.体积偏小，可用光学显微镜观察

下总义齿修复，使用8年。患者主诉为上

86.预防艾滋病的主要措施应除外

下全口义齿易掉，咀嚼无力。临床检查示：

A.广泛开展宣传教育，杜绝吸毒和性滥交

正中(牙合)位时面下1/3垂直距离过低，义

B.建立 HIV 感染的检测系统，掌握流动行

齿严重磨损，义齿固位和稳定性差。戴用

态

这样的不良修复体会对病人的咀嚼运动造

C.加强国境检疫，严防 HIV 传入

成的影响除外

D.对供血者进行严格的 HIV 检测，确保血

A.咀嚼效率低，硬韧性食物不易嚼碎

制品的安全性

B.咀嚼时义齿不稳定

E.严格注意空气质量，加强室内空气消毒

C.剩余牙槽骨骨密质低

87.以下不属于肿瘤抗原的是

D.对食物味道的品尝能力下降

A.MAGE 蛋白

E.咀嚼效率逐渐稳定，较好

B.前列腺特异蛋白

90.患者，女，50岁。右侧上颌缺失第一

C.gp100

前磨牙、第一和第二磨牙，左侧上颌缺失



- 侧切牙。在这种情况下，患者的咀嚼运动 A.调(牙合)、心理治疗
- 类型为 B.理疗(消除肌肉疼痛)、治疗关节内病变、
- A.单侧咀嚼 心理治疗
- B.双侧同时咀嚼 C.治疗关节内病变、调(牙合)
- C.双侧交替咀嚼 D.心理治疗、理疗
- D.前牙咀嚼 E.心理治疗、理疗、调(牙合)
- E.后牙咀嚼
- 93.患者，男，30岁。1个月前打呵欠后出现左关节区疼痛及张口受限，伴咀嚼和侧方运动痛。无关节弹响史。口腔检查：张口度25mm，被动张口度35mm。张口末下颌偏向左侧，相当左侧下关节处有压痛，左侧后牙不能咬合。诊断为
- 91.上题中的女性患者长期不进行义齿修复，临床检查中会发现的问题不包括 A.左侧 TMJ 脱位
- A.出现早接触点 B.左右两侧咀嚼肌强度不一致 C.左右两侧颞下颌关节松紧度不一致 D.(牙合)面磨耗程度不一致 E..牙齿艮土曾生王 B.右侧 TMJ 脱位
- 92.患者，女，39岁。双侧颞下颌关节区弹响、不适2年多，明显加重1周。近来因家事繁多，精神紧张，睡眠差并出现紧咬牙，自觉肌肉酸痛。临床检查示：精神忧虑，张口度38mm，张口型偏摆不定，右侧关节张口末及左侧张口初弹响，咬肌、颞肌、翼外肌触痛。非工作侧干扰。合适的治疗方案为 C.左侧翼外肌痉挛
- D.右侧翼外肌痉挛
- E.左侧咬肌痉挛
- 94.患者，男，65岁。76|67缺失，|34磨耗较重，后牙工作尖及非工作尖磨耗均较重。临床修复时，人工牙的选择应为 A.有尖牙
- B.无尖牙



C.牙尖斜度大

D.正中关系位

D.牙尖斜度小

E.尖牙保护(牙合)位

E.线性(牙合)

97.患者，男，50岁。因“口内多数牙齿

95.一个3岁的男童，在常规检查口腔情况

缺失，要求修复”来医院治疗。患者平躺

时，发现所有乳牙均已萌出，并且已建立

在治疗椅上，在检查过程中，发现患者口

咬合关系。临床检查发现下列5种情况，

腔在不说话、不咀嚼、不吞咽时，上下颌

不符合这一年龄段(牙合)关系的特点的是

牙弓脱离接触。此时，患者下颌所处的位

A.牙齿排列较紧密

置是

B.切缘和(牙合)面没有明显的磨耗

A.息止颌位

C.上下颌的乳磨牙有(牙合)接触

B.正中关系

D.下颌第二乳磨牙在上颌第二乳磨牙的近

C.下颌姿势位

中达一个牙尖

D.正中(牙合)位

E.下颌第二乳磨牙与上颌第二乳磨牙的远

E.以上都不是

中面平齐

98.一位总义齿修复的患者，在调(牙合)时

96.患者，40岁。在口腔检查时，被要求

发现，下颌前伸至上下颌前牙切缘相对时，

做以下动作：下颌自然闭合到与上颌牙齿

左侧上下颌第二磨牙有接触，右侧下

接触，并紧咬牙。检查发现，此时患者口

颌第一磨牙与上颌第二前磨牙也有接触。

内的所有牙都保持接触，磨耗面对(牙合)良

可以描述为

好，此时患者下颌所处的位置是

A.前伸(牙合)三点接触(牙合)平衡

A.正中(牙合)

B.前伸(牙合)多点接触(牙合)平衡

B.正中关系

C.前伸(牙合)完善接触(牙合)平衡

C.正中(牙合)位

D.前伸(牙合)不平衡



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- E.前伸(牙合)早接触 其原因是
- 99.患者，男，30岁。在做常规口腔检查时发现，患者正中关系(牙合)和正中(牙合)是同一位置。在做侧方运动时，非工作侧均无接触，但在做左侧方运动时，左侧上下颌尖牙保持接触；在做右侧方运动时，右侧上下颌的尖牙，前磨牙和磨牙都有接触，这种情况可描述为
- A.左侧是尖牙保护(牙合)，右侧也是尖牙保护(牙合)
B.左侧是尖牙保护(牙合)，右侧是组牙功能(牙合)
C.左侧是尖牙保护(牙合)，右侧既是尖牙(牙合)，又是组牙功能(牙合)
D.两侧都是组牙功能(牙合)
E.错(牙合)畸形
- 100.患者因右侧关节痛，开口受限，来院就诊。临床检查发现，开口度28mm，开口型偏右侧，右侧髁突动度明显低于左侧，患者否认外伤史，颌面部其他部位触诊无压痛，右侧关节造影显示为右侧关节盘不可复性前移位。患者的下颌之所以有偏，
- A.右侧关节盘妨碍右侧髁突运动，导致下颌在开口过程中右偏
B.由于右侧关节有疼痛，而使左侧关节的功能发挥过度，而出现下颌开口时右偏
C.由于右侧关节疼痛，而使右侧咀嚼肌比左侧咀嚼肌的咀嚼力量减小
D.可能是牙齿咬合关系不良
E.患者偏颌畸形
- 101.患者，女，25岁。在做下颌运动轨迹检查时发现：患者在闭口末期，从牙有接触开始到牙齿完全咬合住这一阶段，冠状面的切点运动轨迹向右侧有偏斜。出现这一段异常下颌运动轨迹，其最可能的原因是
- A.闭口末期，咀嚼肌施力两侧不均匀
B.两侧颞下颌关节有结构性差异
C.口内某些牙的接触早于其他牙的接触
D.可能是偶然因素
E.右侧关节盘不可复性前移位
- 102.患者，男，40岁。在试戴金属冠时，反映戴上右侧后牙冠咬合时下颌有偏移，



- 去除冠后无上述情况发生。临床检查发现： B.长骨折段向前上移位
- 右侧上颌第一磨牙金属冠的颊尖舌斜面有 C.常无移位
- 咬合滑走印迹。导致患者下颌在咬合时发 D.A+B
- 生偏移的主要原因是 E.短骨折段向前上外移位，长骨折段向后下方移位
- A.患者对冠不适应，使用一段时间，偏移会消失
- B.冠的颊尖舌斜面上有早接触，从而导致下颌偏移
- C.由于冠还处于试戴期，没有磨光和粘固，经磨光和粘固后，下颌偏移能消失
- D.患者精神紧张，是一种下意识的动作
- E.冠解剖形态不佳
- 103.髁突颈部完全性骨折，造成髁突向内方移位的原因为
- A.患侧咬肌的牵拉
- B.患侧颞肌的牵拉
- C.患侧翼内肌的牵拉
- D.患侧翼外肌的牵拉
- E.患侧蝶下颌韧带的牵拉
- 104.右侧下颌角完全性骨折，骨折线由磨牙后斜向下前方，此时骨折片移位情况为
- A.短骨折段向后下移位
- 105.上唇及鼻根部炎症，若处理不当可使菌血栓逆流入颅而导致海绵窦化脓性血栓性静脉炎，下列可能的逆流途径中错误的是
- A.面静脉→内眦静脉→眼下静脉→海绵窦
- B.面静脉→面深静脉→翼丛→眼下静脉→眼上静脉→海绵窦
- C.面静脉→面深静脉→翼丛→破裂孔导血管→海绵窦
- D.面静脉→面深静脉→翼丛→卵圆孔网→海绵窦
- E.面静脉→面深静脉→翼丛→上颌静脉→脑膜中静脉→海绵窦
- 106.某患者患下颌骨恶性肿物，进行性张口困难，下唇麻木，出现这些症状的可能原因为
- A.颊长神经及颤下颌关节受累



- | | |
|----------------|------------|
| B.下颌缘支及升颌肌群受累 | A.家族性巨颌症 |
| C.下牙槽神经及升颌肌群受累 | B.骨巨细胞瘤 |
| D.颊长神经及升颌肌群受累 | C.骨纤维异常增生症 |
| E.下颌缘支及颞下颌关节受累 | D.骨化纤维瘤 |
107. 牙龈边缘呈蚕食状缺损，坏死组织为腐肉，表面覆盖假膜，伴严重口臭。镜下见密集的炎症及坏死区域，伴大量中性粒细胞浸润。行龈沟液涂片可见梭形杆菌。该疾病可能是
- A.青春期龈炎
 - B.浆细胞龈炎
 - C.急性坏死溃疡性龈炎
 - D.剥脱性龈病损
 - E.药物性龈炎
108. 患儿，男，6岁。双侧下颌角区对称性肿大半年，下颌牙槽突膨胀，舌抬高，影响言语、咀嚼、吞咽。X线片见下颌骨对称性膨胀及多囊性密度减低区。镜下见病变区骨组织为纤维结缔组织代替，且纤维纤细而排列疏松，血管周围见嗜酸性物质沉积，多核巨细胞围绕血管壁。病理诊断应为
109. 舌癌病变，镜下见角化珠量多，细胞间桥明显，核分裂象少见，无非典型核分裂象及多核巨细胞。依据WHO2005年的分级标准应为
- A.鳞癌Ⅲ级
 - B.鳞癌Ⅱ~Ⅲ级
 - C.鳞癌Ⅰ级
 - D.鳞癌Ⅰ~Ⅱ级
 - E.鳞癌Ⅱ级
110. 患牙多见于上、下颌前磨牙和上颌恒切牙。病变为乳牙有关的感染或创伤引起继生恒牙成釉细胞的损伤，导致继生恒牙釉质形成不全或矿化不全。该疾病是
- A.氟牙症
 - B.釉质形成缺陷症
 - C.Turner牙
 - D.先天性梅毒牙





微信搜一搜



金英杰口腔学院

E.牙釉质浑浊症

111.牙骨质表面有许多小而浅的凹陷，内有大量细菌。牙骨质磷灰石晶体出现程度不同的溶解、破坏，胶原纤维断裂消失。病损相应髓腔处出现修复性牙本质。该疾

病是

A.慢性牙周炎

B.牙骨质发育不全

C.牙骨质过度增生

D.牙骨质龋

E.牙本质龋

112.患牙有较大的穿髓孔并且根尖孔粗大，炎性牙髓组织呈息肉状经穿髓孔突出，探之不易出血。镜下见息肉由大量成纤维细胞和胶原纤维构成，伴散在的慢性炎细胞

浸润，其表面被覆复层扁平上皮。该疾病是

A.牙髓钙化

B.慢性溃疡性牙髓炎

C.溃疡型慢性增生性牙髓炎

D.上皮型慢性增生性牙髓炎

E.牙髓纤维性变

113.患者有维生素 C 缺乏史。牙龈呈紫色

肿胀，质地柔软，易出血。镜下见上皮下结缔组织水肿明显，毛细血管增生、扩张、充血。该疾病是

A.炎症水肿型慢性龈炎

B.纤维增生型慢性龈炎

C.维生素 C 缺乏性龈炎

D.剥脱性龈病损

E.药物性龈炎

114.患者，女，50岁。双腮腺肿大多年，自觉口干。镜下见腺体内淋巴细胞及组织细胞增生浸润，侵犯腺小叶，腺泡破坏、消失，密集的淋巴细胞可形成淋巴滤泡，小叶内导管上皮增生。最可能的病理诊断是

A.病毒性腮腺炎

B.慢性腮腺炎

C.急性腮腺炎

D.唾液腺腺病

E.舍格伦综合征

115.患者，女，45岁。右下颌磨牙区膨胀1年，X线见不规则透射区并含大小不等的



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院

- 不透光区。镜下肿瘤由片状或岛状多边形上皮细胞组成，细胞间桥清晰，肿瘤细胞及细胞核有多形性，但核分裂象罕见。肿瘤组织内见嗜酸性均质状物质，刚果红染色阳性。最可能的病理诊断是
- A.成釉细胞瘤
 - B.牙源性钙化囊性瘤
 - C.牙源性钙化上皮瘤
 - D.牙源性角化囊性瘤
 - E.牙源性鳞状细胞瘤
- 116.关于口腔黑色素瘤，错误的是
- A.由片状或岛状的上皮样黑色素细胞构成
 - B.95%以上的病例 CK 阳性、S-100 阴性
 - C.更特异的标志物包括 HMB-45、Melan-A
 - D.可分为原位、侵袭性和混合型三类
 - E.多来源于皮内痣
- 117.腮腺肿瘤，镜下见两种瘤细胞成分形成腺管样结构，
- A.多形性腺瘤
 - B.肌上皮瘤
 - C.基底细胞腺癌
 - D.上皮-肌上皮癌
 - E.腺样囊性癌
- 118.前牙区牙龈肿物，呈息肉状。镜下见肿物由大小不等的毛细血管组成，被纤维组织分成小叶状，有明显炎症，表面上皮萎缩，有肉芽组织形成。最可能的病理诊断是
- A.增生性牙龈炎
 - B.纤维性牙龈瘤
 - C.毛细血管瘤
 - D.化脓性肉芽肿
 - E.纤维上皮息肉
- 119.患者，男，55岁。左下后牙床肿痛3天。检查：左下第一磨牙颊侧牙龈处有局限性肿胀、隆起，扪有波动感，该牙未见龋坏，温度测验有感觉，反应与对照牙相同，颊侧近中及中央处探诊深度7mm。最可能的诊断为
- A.急性坏死性龈炎
 - B.急性牙龈脓肿
 - C.急性牙周脓肿
 - D.急性根尖周脓肿



- E.急性龈乳头炎 122.磷酸核糖的活性供体
- 120.患者牙龈缘红肿光亮，松软，探诊易 123.甲基的活性供体
- 出血，无疼痛感。牙龈沟内上皮下方可见 124.甲基的间接供体
- 中性粒细胞浸润，其下方为大量的淋巴细 (125~126题共用备选答案)
- 胞。病理诊断为
- A.慢性牙周炎 A.副作用
- B.慢性龈炎 B.特异质反应
- C.龈上增生 C.毒性反应
- D.浆细胞龈炎 D.超敏反应
- E.急性坏死性溃疡性龈炎 E.后遗效应
- 《《《《B1型题以下提供若干组考试题，每 125.少数患者对某些药物的反应异常，性
- 组考试题共用在考试题前列出的A、B、C、 质可能与常人不同，称为
- D、E五个备选答案。请从中选择一个与问 126.机体受药物刺激发生异常免疫反应，
- 题关系最密切的答案。某个备选答案可能 称为
- 被选择一次、多次或不被选择。
- (121~124题共用备选答案) (127~128题共用备选答案)
- A.PRPP A.抗毒素
- B.N⁵-CH₃-FH₄ B.类毒素
- C.FH₄ C.减毒活菌苗
- D.NAD⁺ D.死菌苗
- E.SAM E.丙种球蛋白
- 121.一碳单位的载体 127.有毒力的牛型结核分枝杆菌在特殊培
- 养基中传代培养13年后可成为
- 128.将白喉毒素用0.4%甲醛处理后成为消





微信搜一搜



金英杰口腔学院

除毒性而保留抗原性的物质称为

D.上提咽喉，向前牵引咽腭弓，使两侧咽

(129~130题共用备选答案)

腭弓接近

A.CD3

E.提腭垂

B.CD4

134.腭帆提肌

C.CD8

135.腭帆张肌

D.CD16

(136~140题共用备选答案)

E.CTLA-4

A.唇舌径在牙颈部最大

129.能与MHCⅡ类分子相结合的分子是

B.根管较小，根管侧壁薄，仅厚1mm

130.能与B7分子相结合的分子是

C.近远中径在脸面宽而近颈部窄

(131~133题共用备选答案)

D.髓室顶与髓室底相距较近

A.上颌第一前磨牙

E.牙冠向舌侧倾斜，髓室偏向颊侧女

B.上颌第二前磨牙

136.下颌恒磨牙开髓部位应在(牙合)面偏向

C.上颌第一磨牙

颊尖处，因为

D.下颌第一磨牙

137.上颌前牙开髓时应从舌面窝中央向牙

E.下颌第一前磨牙

颈方向钻入，因为

131.有一个颊沟的牙是

138.上颌前磨牙开髓时要防止从近中面或

132.有两个颊沟的牙是

远中面穿孔，因为

133.有近中沟的牙是

139.下颌切牙根管治疗时应防止侧穿根管

(134~135题共用备选答案)

壁，因为

A.作用为紧张腭帆，开大咽鼓管

140.下颌第一恒磨牙开髓时应防止穿通髓

B.使软腭上提，咽侧壁向内运动

室底，因为

C.下降腭帆，紧缩咽门

(141~145题共用备选答案)

更多医师考试资料

微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.在成釉器内、外釉上皮之间的星形细胞

但无典型牙齿

B.钟状期末牙板断裂后残留的上皮岛

148.肿瘤内含同心圆状钙化物的是

C.釉质发育完成后，其表面由成釉器各层

149.病变含有 ghost epithelial cell 的是

细胞相互结合形成的鳞状上皮

150.玫瑰花样结构见于

D.釉质发育完成后，成釉细胞在釉质表面
分泌的无结构有机物薄膜

E.上皮根鞘断裂后遗留在牙周膜中的上皮
岛

141.缩余釉上皮

142.马拉瑟上皮剩余(Malassez epithelial
rest)

143.牙板上皮剩余

144.釉小皮

145.星网状层

(146~150 题共用备选答案)

A.组合性牙瘤

B.混合性牙瘤

C.牙源性钙化上皮瘤

D.牙源性腺样瘤

E.牙源性钙化囊肿

146.肿瘤由许多牙样结构组成

147.肿瘤由混乱排列的牙组织成分组成，

第二单元



A1 型题◆每一道考试题下面有 A、B、C

、D、E 五个备选答案。请从中选择一个

最佳答案。

1.变异链球菌致龋过程中所涉及的最重要
的物质是

A.巧克力

B.蔗糖

C.麦芽糖

D.葡聚糖

E.葡萄糖

2.蔗糖致龋的必要条件是

A.菌斑存在

B.多次食用

C.黏附牙面

D.加工精细

E.溶解于水

3.传播变异链球菌给儿童的主要来源是

A.母亲



- B.父亲
C.幼儿园小朋友
D.老师
E.医院

- 4.中龋为病损发展到
A.牙釉质全层
B.牙釉质牙本质界
C.牙本质浅层
D.牙本质中层
E.牙本质深层

- 5.各洞过程中，保护牙髓的措施为
A.高速涡轮手机钻须有冷却水伴随
B.慢速手机去腐不必保持窝洞干燥
C.切削牙体组织应采用持续磨除法
D.深龋制备窝洞不能在局麻下操作
E.机械去除腐质时应用较大的压力

- 6.发生意外穿髓后首选的处理方法是
A.扩大穿髓孔
B.丁香油氧化锌安抚
C.直接盖髓术
D.封快失活剂
E.麻醉下拔髓

- 7.有关浅龋的描述，不正确的是
A.位于牙冠的浅龋可分为窝沟龋和平滑面龋
B.平滑面龋早期一般呈白垩色斑块
C.窝沟龋的浅龋早期表现为龋损部位色泽变黑
D.浅龋仅发生于牙釉质内
E.X线片有助于早期诊断

- 8.消毒窝洞理想的药物应该是
A.消毒力弱、刺激性小、不损伤深层牙髓活力
B.刺激性小、渗透性小、向深层组织侵袭
C.刺激性大、消毒力强、足以杀死细菌
D.消毒力强、刺激性小、渗透性小、不使牙体组织变色

- E.消毒力适中、刺激性小、渗透性强、不使牙体组织变色
- 9.对畸形中央尖描述错误的是
A.对圆钝而无妨碍的中央尖可不予处理
B.可以多次少量调磨中央尖
C.畸形中央尖内无牙髓组织
D.畸形中央尖高度为 1~3mm



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院

- E.畸形中央尖常对称发生 A.牙隐裂
- 10.形成四环素牙的原因是 B.颞下颌关节紊乱病
- A.服用四环素过量 C.食物嵌塞
- B.用金霉素液漱口 D.牙髓病
- C.根管冲洗时使用了金霉素液 E.创伤性溃疡
- D.牙齿发育矿化期间服用了四环素类药物
- E.8岁以后服用四环素类药物
- 11.下列发育异常的牙是由两个正常的牙胚融合而成的是 14.怀疑左下第一磨牙有可复性牙髓炎，进行牙髓活力测验时，应先检查的牙是
- A.融合牙 A.左下第一磨牙
- B.双生牙 B.左下第二磨牙
- C.结合牙 C.右下第一磨牙
- D.多生牙 D.左上第一磨牙
- E.牙中牙 E.左下第一前磨牙
- 12.对嵌入性脱位的年轻恒牙，下列处理中不正确的是 15.急性牙髓炎的临床特点不包括
- A.对症处理 A.自发性疼痛
- B.观察 B.冷刺激去除后，疼痛立即消失
- C.任其自然萌出 C.夜间痛
- D.强行拉出复位 D.疼痛不能自行定位
- E.拍X线片定期复查 E.温度刺激加剧疼痛
- 13.下列选项不是牙磨损并发症的是 16.当细菌侵入牙本质，牙本质的厚度为多少时，牙髓内可找到细菌
- A.≤2mm B.≤1.1mm



- C. $\leq 0.3\text{mm}$
- D. $\leq 0.2\text{mm}$
- E. $\leq 0.1\text{mm}$

20.根管充填的终止点应位于

- A.解剖性根尖孔
- B.生理性根尖孔

- 17.化学性根尖周炎的主要病因是

- A.感染因素
- B.温度因素
- C.创伤因素
- D.医源因素
- E.免疫因素
- D.X线片上根尖的位置
- E.根尖分歧

21.根尖诱导成形术进行永久充填的指征不

- 包括
- A.瘘管闭合
- B.患牙无明显松动和疼痛
- C.牙根继续发育
- D.根尖有明显硬组织形成
- E.根尖透射区缩小

- 18.下列不属于慢性根尖周炎临床病理类型

- 的是
- A.根周膜炎
- B.根尖周肉芽肿
- C.慢性根尖周脓肿
- D.根尖周囊肿
- E.根尖周致密性骨炎

22.关于根管冲洗，不正确的说法是

- A.常用过氧化氢和次氯酸钠
- B.用27号弯针头注射器
- C.针头伸入髓腔即可
- D.针头松松插入根管深部
- E.忌加压注入冲洗液

- 19.用于盖髓剂的氢氧化钙制剂的pH为

- A.9~12
- B.7~8
- C.12.3~14
- D.14.1~15
- E.6.5~6.9

23.下列不是根管预备目的的是

- A.消除感染源
- B.扩大根管便于根管消毒



- C.扩大根尖孔以利引流 27.关于牙周炎预后的影响因素，下列与之
D.减少弯曲根管的弯曲度 无关的是
E.预备根管形态以利充填 A.牙齿松动情况

24.塑化液导入根管后覆盖根管口的材料是 B.牙槽骨吸收程度
A.氧化锌丁香油粘固剂 C.牙周炎类型
B.磷酸锌粘固剂 D.牙龈增生程度
C.氢氧化钙糊剂 E.患者依从性-I
D.碘仿糊剂 28.牙周病复查的时间一般为
E.无特殊要求 A.1~2个月复查1次

25.可复性牙髓炎行盖髓术治疗后复诊的时间应为 B.3~6个月复查1次
A.1~2周 C.9个月复查1次
B.1~2个月 D.10个月复查1次
C.2~3个月 E.12个月复查1次
D.3~4天 29.关于牙周炎治疗的基本目标，下列错误
E.5~6天 的是

26.检查牙本质敏感症的主要方法是 A.消除炎症
A.温度刺激 B.消除牙周炎所导致的不适、出血、疼痛
B.化学刺激 等症状
C.探针检查 C.使牙周组织破坏停止
D.视诊叩诊 D.使松动牙重新变牢
E.牙髓电活力测试 E.促使牙周组织修复再生

30.牙周病治疗的正确程序始于



A.基础治疗

C.全口多个牙泛发

B.牙周手术治疗

D.治愈后牙龈恢复正常

C.修复治疗

E.可探及深牙周袋

D.松牙固定术

34.下列关于青春期龈炎的治疗原则不正确

E.根面平整

的是

31.下述方法不能有效清除牙齿邻面菌斑的

是

A.去除局部刺激因素是关键

A.使用牙线

B.可配合局部药物治疗

B.使用牙签

C.青春期后不用定期复查

C.使用牙间隙刷

D.对于过度增生的牙龈可以行手术切除

D.使用一般牙刷

E.自我口腔卫生维护很重要

E.使用锥形橡皮尖抛光邻面

35.造成牙龈炎最主要的因素是

32.Papmon-Lefevre 综合征一般不涉及

A.遗传

A.手掌

B.龈上菌斑

B.足底

C.病毒感染

C.膝部

D.激素改变

D.躯干

E.龈下菌斑和龈下牙石

E.牙周组织

36.下列不属于青春期龈炎临床表现的是

33.关于急性多发性龈脓肿与牙周脓肿的不

A.探诊出血

同点描述错误的是

B.龈乳头呈球状突起

A.可发生于非牙周炎患者

C.多发生于前牙的唇侧牙龈

B.脓肿位于龈乳头

D.可形成假性牙周袋

E.龈缘坏死、溃疡和假膜形成

更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院



微信搜一搜

金英杰口腔学院

37.妊娠期龈炎的直接病因是 C.青壮年

A.妊娠 D.老年

B.食物嵌塞 E.中老年

C.不良卫生习惯

41.慢性坏死性龈炎的主要表现是

D.牙菌斑

A.牙龈乳头消失

E.饮食习惯

B.牙龈增生

38.下列关于急性白血病牙龈病损的治疗，

C.点彩消失

说法正确的是

D.附着龈增生

A.首诊时需进行彻底的牙周洁治

E.游离龈消失

B.及时与血液内科医师配合治疗

42.下面关于牙龈瘤的说法，错误的是

C.2%氯己定含漱

A.发生在牙龈的炎症反应性瘤样增生物

D.牙周手术切除增生的牙龈

B.主要见于牙龈乳头部位

E.需活检明确诊断

C.来源于牙周膜和牙龈的结缔组织

39.下列不是牙龈增生原因的是

D.属于良性肿瘤

A.感染

E.容易复发

B.内分泌失调

43.下面关于急性乳头炎的治疗，不正确的

C.药物性

是

D.创伤性

A.全身应用抗生素

E.特发性

B.去除局部刺激因素

40.ANUG 好发的年龄段是

C.局部使用抗菌药物冲洗

A.婴幼儿

D.急性炎症过后，彻底去除病因，如邻面

B.儿童

龋、不良修复体等



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

E.去除邻面的菌斑、牙石，以缓解急性炎症 A.牙冠切 1/3 处

44.急性多发性龈脓肿的发病特点，错误的是 B.牙冠切 1/3~中 1/3 处

C.牙冠中 1/3~1/3 处

D.牙冠 1/3 处

A.多发于春、秋两季 E.牙冠 1/3~中 1/3 处

B.多数病例起病急骤

C.大多有前驱症状

D.主要发生于青壮年女性

E.患病前多有全口性的慢性牙龈炎症

45.急性龈乳头炎的主要临床特征是

A.伴有全身症状

B.口臭

C.牙松动

D.牙龈乳头发红肿胀，探诊和吸吮时出血

E.累及附着龈

46.恒切牙助萌术的施行条件是

A.乳切牙过早脱落

B.恒切牙萌出方向异常

C.多生牙阻碍

D.囊肿阻碍

E.增厚的龈片组织阻碍

47 乳牙环状龋多位手

A.牙冠切 1/3 处

B.牙冠切 1/3~中 1/3 处

C.牙冠中 1/3~1/3 处

D.牙冠 1/3 处

E.牙冠 1/3~中 1/3 处

48.下列不是金属成品冠修复乳牙窝洞优点

的是

A.牙体制备所去除的组织较少

B.较易恢复牙冠解剖外形

C.较易恢复牙冠功能

D.操作比较简单

E.成品冠不易磨损

49.乳牙充填后，继发龋是常见的并发症，

常见的原因包括

A.乳牙牙龈乳头位置低，容易食物嵌塞

B.乳牙牙釉质无机物含量高，儿童易食甜

食，故易产酸脱矿

C.乳牙各洞时不易达到抗力型和固位型，

充填体易松动

D.软化牙本质去除过多

E.乳牙牙髓血运少，抵抗力低

50.临床诊断乳牙根尖周病不依赖于



A.疼痛

D.鹅口疮

B.肿胀

E.义齿性口炎

C.松动

54.药物过敏性口炎的临床特征为

D.龋洞深度

A.皮肤红斑、水疱，口腔大小不等水疱

E.X 线检查

B.皮肤水疱或斑丘疹，口腔为相互融合自

51.乳牙根尖周病治疗成功的标准不包括

透明小水疱

A.无异常松动

C.皮肤结节性红斑，口腔为反复发作自溃

B.无龈瘘

疡

C.牙齿无变色

D.皮肤红色丘疹，口腔为网状条纹

D.无肿胀

E.皮肤大疱，口腔黏膜白色瘢痕

E.X 线片示根尖周无病变

55.对于老年人长期不愈、边缘隆起且深及：

52.以下关于单纯疱疹说法正确的是

膜下层的溃疡，溃疡附近能找到残根、残

A.病损双侧对称分布

冠或不良修复体，应首先考虑

B.病原微生物是单纯疱疹病毒

A.Bednar 溃疡

C.病损为簇集性小水疱，可沿三叉神经单
侧分布

B.禢疮性溃疡

D.反复发作，又称为疱疹样口疮

C.结核性溃疡

E.可有皮肤病损，常表现为靶形红斑

D.恶性肿瘤

53.下列疾病不属于念珠菌性口炎的是

E.Riga-Fede 溃疡

A.膜性口炎

56.以下关于腺周口疮和结核性溃疡的说法，

B.雪口病

不正确的是

C.抗生素口炎

A.病因不同

B.均有自限性



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- C.腺周口疮可呈弹坑状 A.精神创伤
- D.结核性溃疡呈潜掘状 B.内分泌因素
- E.结核性溃疡常伴有全身症状 C.病毒感染
- 57.以下关于天疱疮作为自身免疫性疾病削弱，不正确的是
- A.在病损部位发现抗棘细胞层间黏合物质的自身抗体
- B.电镜下可见到细胞间黏合物质的游和桥粒的破坏
- C.采用肾上腺皮质激素及细胞毒类药治疗取得了显著疗效
- D.循环抗体中约有 80%~90% 属 IgM 抗体
- E.天疱疮疱液中补体成分减少，而病损局部存在补体成分
- 58.以下关于寻常型天疱疮说法，不正确的
- A.口腔病损少见
- B.多见于中老年人
- C.肾上腺皮质激素为首选药物
- D.尼氏征阳性
- E.皮肤病损易出现于易受摩擦处
- 59.以下与口腔扁平苔藓发病机制无关的是
- A.精神创伤
- B.内分泌因素
- C.病毒感染
- D.真菌感染
- E.微循环障碍
- 60.以下疾病中不具有癌变倾向的是
- A.口腔白斑病
- B.口腔红斑病
- C.口腔扁平苔藓
- D.盘状红斑狼疮
- E.坏死性黏膜腺周围炎
- 61.以萎缩性损害为主的舌炎是
- A.丝状乳头炎
- B.菌状乳头炎
- C.轮廓乳头炎
- D.叶状乳头炎
- E.毛舌
- 62.下列疾患不会造成舌乳头萎缩的是
- A.扁平苔藓
- B.地图舌
- C.天疱疮
- D.口腔念珠菌感染



- E.B 族维生素缺乏 D.与 EB 病毒有关
- 63.梅毒临床治愈是指 E.多为单侧发生
- A.症状消失，损害愈合 66.对于艾滋病，以下关于医护人员的保护
- B.症状消失，损害愈合，损害愈合后无功 措施，说法不完全正确的是
- 能障碍
- C.症状消失，损害愈合，损害愈合后无组 A.应具有高度的责任心和良好的职业习惯
- 织缺损
- D.症状消失，损害愈合，梅毒血清反应阴 B.戴乳胶手套
- 性
- E.症状消失，损害愈合，损害愈合后无瘢 C.如接触过的污染源 HIV 阴性，可不需采
- 痕形成
- 64.梅毒的病原体为 取进一步措施
- A.苍白密螺旋体 D.如接触过的污染源 HIV 阳性，应尽快进
- B.奋森螺旋体 行预防性治疗
- C.巨细胞病毒 E.医务人员的职业感染多为针具刺伤所致
- D.人乳头瘤病毒
- E.人类免疫缺陷病毒
- 65.毛状白斑是 HIV 感染者的一种特殊口腔 67.有关紫癜，正确的是
- 损害，以下说法正确的是
- A.是一种癌前病变 A.皮肤出现红色或暗红色斑，一般高于皮
- B.与 HPV 有关 肤表面
- C.与 HSV 有关
- D.皮肤出现红色或暗红色斑，发生的充血
- E.皮肤出现红色或暗红色斑，压之不褪色
- F.皮肤出现红色或暗红色斑，预后可有皮
- G.皮肤脱屑
- H.皮肤出现红色或暗红色斑，可伴有关节
- I.腔出血
- J.68.外源性致热原的特点，正确的是





- A.分子量较小 B.每年持续发作至少 1 个月，持续 2 年以上
- B.其致热原性可被蛋白酶类所破坏 C.每年持续发作至少 2 个月，持续 3 年以上
- C.能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞 D.直接作用于体温调节中枢
- D.在体内最终由肝、肾灭活和排泄 E.每年持续发作至少 3 个月，持续 2 年以上
- 69.肝硬化失代偿期最突出的表现是 E.每年持续发作至少 6 个月，持续 4 年以上
- A.出血 B.腹水 C.脾功能亢进 D.电解质紊乱 E.肝性脑病
- 70.慢性肺心病患者在肺心功能失代偿期，其主要表现为 A.心力衰竭 B.肾小球肾炎 C.迁移性脓肿
- A.胸痛 D.细菌性动脉瘤 E.脑栓塞与脑脓肿
- B.呼吸衰竭和右心衰竭 C.咯血 D.休克 E.呼吸困难
- 71.有关慢性支气管炎的诊断标准，咳嗽、咳痰反复发作时间应为 A.西咪替丁 B.阿托品
- A.每年持续发作至少 3 个月，持续 10 年以上 C.硫糖铝 D.奥美拉唑 E.枸橼酸铋钾



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院

74.慢性乙型肝炎(中度)的治疗原则包括

- A.禁酒、避免劳累、适当休息
- B.可用保肝、降酶、退黄药物
- C.应用免疫调节药物
- D.抗病毒治疗
- E.注射乙肝疫苗

D.有色素沉着

E.根髓感染

75.磺脲类降糖药主要适用于

- A.1型糖尿病可合并应用本药加双胍类
- B.单用饮食管理不能获得满意控制的2糖尿病患者
- C.糖尿病患者手术前控制血糖
- D.糖尿病合并感染时
- E.糖尿病合并妊娠

77.患者，男，48岁。述右上后牙咬物痛3

个月，咬在某一特定位置可引起较明显疼痛。

检查：右上第一磨牙咬合面磨损，牙本质暴露，颊尖高陡，近中边缘嵴至舌尖

方向似有隐裂。进一步检查方法是

- A.探诊
- B.温度测验
- C.碘酊染色
- D.电活力测验
- E.X线片检查

78.患者，男，43岁。左上后牙补牙后，

咀嚼疼痛1周。无冷、热刺激痛，无自发

痛。检查：原银汞合金充填物无折裂，见

咬合亮点。叩诊(-)，探诊(-)，无松动。温

度刺激试验(-)。引起疼痛的原因最可能是

- A.备洞时对牙髓刺激过强
- B.未垫底或垫底材料选择不当
- C.充填物过高，引起牙周性疼痛
- D.接触点恢复不良，形成食物嵌塞
- E.小的穿髓孔未被发现

《《《A2型题每一道考试题都是以一个小

案例出现的，其下面有A、B、C、D、E

五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

76.制备窝洞时，腐质去尽未发现露髓，在

修整洞形后，髓角处有一红点，轻探剧痛。

应判断为

- A.腐质未去净
- B.意外穿髓孔
- C.龋坏穿髓孔



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- 79.患者因龋坏牙充填后 5 年出现冷热刺激痛，偶有自发钝痛就诊。检查： $\overline{16}$ 近中邻面充填体存在，颊侧龈壁发黑，可探入，叩诊(±)，冷热测疼痛。其原因为
- A.充填物早接触
 - B.充填时没垫底
 - C.继发龋
 - D.各洞时操作不当
 - E.充填体的化学性刺激
- 80.患者，女，25岁。因牙面斑点要求进行前牙美观治疗，自诉从牙齿萌出后，牙面即有黄色斑块。检查：全口牙均可见不同程度散在黄褐色及白垩状斑。该患牙最可能诊断为
- A.牙釉质发育不全症
 - B.氟牙症
 - C.四环素牙
 - D.浅龋
 - E.遗传性乳牙本质
- 81.成年人上前牙外伤，冠折 1/3，露髓，根正常。其治疗原则为
- A.活髓切断术
- 82.患者左上第一前磨牙深龋洞，热诊引起剧烈疼痛，刺激去除后持续一段时间，诊断应为
- A.可复性牙髓炎
 - B.急性牙髓炎
 - C.根尖周炎
 - D.不可复性牙髓炎
 - E.残髓炎
- 83.患者，男，36岁。半年来右上后牙牙龈反复出现小脓包，曾两次肿痛，流出少许咸味液体。检查时最可能见到
- A.右上后牙龋齿和龈瘘
 - B.多个牙齿松动
 - C.多个龋坏牙齿
 - D.牙龈处多处口腔溃疡
 - E.变色牙和口腔溃疡
- 84.一磨牙因慢性根尖周炎进行根管治疗，在根管预备的注意事项中不正确的是



A.首先测定工作长度

E.根尖诱导成形术

B.器械只应到达根尖狭窄处

87.患者，女，20岁。上切牙远中移位，

C.根管锉应逐号使用

间隙增宽，影响美观，求治。检查：上前

D.每换一根锉，应进行根管冲洗

牙牙周袋深5mm，第一恒磨牙松动I度，

E.器械应超出根尖孔超预备

牙周袋深6mm。X线片显示：上前牙区牙

85.患者，女，28岁。左上第二磨牙因龋

槽骨水平吸收，第一磨牙牙槽骨弧形吸收。

致牙髓炎，患牙在根管治疗过程中的工作

诊断为

长度具体指

A.青少年后期牙周炎

A.X线上牙齿的长度

B.慢性牙周炎

B.根管长度

C.侵袭性牙周炎

C.牙齿实际长度

D.快速进展型牙周炎

D.根管口一根尖部的长度

E.成人牙周炎

E.洞缘标志点到根尖狭窄部的长度

88.患者，男，28岁。右下后牙牙龈反复

86.患儿，男，12岁。右下后牙咬合痛1

肿胀。牙松动2年，每次发作口服牙周康，

周D检查F畸形中央尖已穿髓，探痛(-)，

症状好转。检查：牙体完整，牙龈肿胀，

叩痛(++)，温度试验(-)。X线示根管口呈

近中可探及7mm深的牙周袋，松动II度，

喇叭口状，根尖无明显暗影。最佳治疗方

可探及龈下牙石。X线检查示牙槽骨吸收

案为

达根长1/2。在下列诊断中最可能的是

A.活髓切断术

A.慢性根尖周炎

B.直接盖髓术

B.急性牙周脓肿

C.间接盖髓术

C.慢性牙周脓肿

D.根管治疗

D.牙龈脓肿



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

E.牙髓炎 疼痛天，否认咬硬物史。口腔检查：局部

89.患者自诉左下后牙冷热刺激痛、夜间痛，牙龈头充血水肿，牙间有食物嵌塞，探痛力射状疼痛3天。检查： $\overline{16}$ 牙龈探诊出血，明显。其最可能的诊断是

PD6~9mm，GR1~2mm，TMⅡ度。X A.妊娠期龈炎

线片：历槽骨吸收达根长2/3。 $\overline{16}$ 最合适的 B.急性牙龈乳头炎

诊断是 C.牙根折裂

A.牙周-牙髓联合病变 D.急性坏死性龈炎

B.慢性牙周炎 E.逆行性牙髓炎

C.侵袭性牙周炎

D.快速进展型牙周炎

E.成人牙周炎

90.患者，女，51岁。右下后牙咬合无力 A.去除病因

半年， j 自发性疼痛。检查：石 \mid 牙周袋深 B.牙周洁治

6mm，牙世明显退缩，根分叉区完全暴露。 C.局部药物治疗

X线片：跟分叉区呈完全透射区域。最可 D.全身应用抗生素

能的诊断是 E.定期复查，防止复发

A.根尖周炎

B.I度根分叉病变

C.II度根分叉病变

D.III度根分叉病变

E.IV度根分叉病变

91.患者，男，24岁。左下后牙突然自发 A.牙齿松动

B.牙龈乳头水肿

92.患者，女，21岁。主诉：近2年来，

晨起时口中有血丝。若诊断为慢性龈炎，

下列不是其治疗原则的是

A.去除病因

B.牙周洁治

C.局部药物治疗

D.全身应用抗生素

E.定期复查，防止复发

93.患者，女，27岁。主诉：全口牙龈自

动出血伴牙龈疼痛1周。如果诊断为急性

坏死溃疡性龈炎，此患者最可能的临床表

现是

A.牙齿松动

B.牙龈乳头水肿

- C.全口牙龈充血，多处溃疡
D.牙龈乳头变平，表面有白色假膜
E.较深的牙周袋
- 94.患者，女，26岁。主诉：牙龈肿胀疼痛2天。检查：多数龈乳头有脓肿形成。
如果诊断为急性多发性龈脓肿，最佳治疗方案是
A.牙周洁治
B.牙周洁治+含漱液
C.牙周洁治+休息
D.牙周洁治+中西医疗法
E.牙周洁治+抗生素+维生素C
- 95.患者，女，27岁。主诉：牙龈长肿物5个月，并慢慢增大，影响进食。在确诊前，最应该询问的病史是
A.刷牙史
B.药物史
C.家族史
D.妊娠史
E.服避孕药史
- 96.患儿，男，20天。出生时萌出下颌中切牙两颗，Ⅲ度松动，并影响患儿吮吸母乳。下面说法不正确的是
A.乳牙早萌
B.新生期牙
C.拔除这两颗牙
D.牙根尚未发育完成
E.若引起创伤性溃疡，涂以甲紫
- 97.患儿，女，10岁。左上颌中切牙及侧切牙受外伤，未发现硬组织折断，叩诊(+)，松动度(-)，诊断为牙齿震荡。不合理的处置方法是
A.消除咬合创伤
B.减少或避免不良刺激
C.为预防感染，可服用抗生素
D.牙釉质若出现裂纹，可用复合树脂修复
E.定期追踪复查
- 98.患者，男，58岁。4天前左面部、唇周出现成簇带状群集分布的水疱，持续灼痛，另外左颊黏膜见多而密集的小水疱，遗留较大的浅溃疡面。最可能的诊断是
A.急性疱疹性口炎
B.天疱疮
C.类天疱疮



- D.疱疹样口疮 十个圆形肿物，质软，呈“人”字形排列，
- E.带状疱疹 疼痛不明显。最可能的诊断是
- 99.患者，女，65岁。下颌义齿基托边缘锐利，下后牙前庭沟处可见一处深在溃疡，边缘隆起，疼痛不明显。最可能的诊断是
- A.自伤性溃疡 A.轮廓乳头炎
- B.结核性溃疡 B.叶状乳头炎
- C.癌性溃疡 C.舌扁桃体肥大
- D.褥疮性溃疡 D.舌淀粉样变性
- E.Riga-Fede 溃疡 E.恶性肿瘤
- 102.患者，男，32岁。发现舌背黏膜出现大白色斑片，可用棉签擦去，近期未使用抗生素也未接受过肿瘤放化疗，曾有不洁交史。应考虑
- A.HPV 感染 A.HPV 感染
- B.HIV 感染 B.HIV 感染
- C.HSV 感染 C.HSV 感染
- D.梅毒性黏膜炎 D.梅毒性黏膜炎
- E.尖锐湿疣 E.尖锐湿疣
- 103.患者，男，69岁。患糖尿病7年，无心悸、胸痛史。早餐后1小时，突然烦躁、面色苍白、出汗、恐惧感、胸闷，无胸痛。心率100次/min，血压86/70mmHg。首先应该考虑
- A.急性心肌梗死 A.急性心肌梗死
- 101.患者，女，35岁。发现舌背后份有近



B.不典型心绞痛

D.间歇输注血浆或白蛋白

C.低血糖反应

E.利尿效果不佳时做腹水浓缩回输

D.变异型心绞痛

106.患者，男，14岁。患者血尿伴黑便2

E.糖尿病酮症酸中毒

天，既往史，体检肝、脾不大，上腹无压

104.患者，男，40岁。上腹不适5年伴嗳

痛。红蛋白70g/L，白细胞 $12.0\times10^9/L$ ，

气，胃镜检查见胃窦黏膜苍白，皱襞变细而平坦，活检发现中度不典型增生。最重要的措施是

血小板 $20\times10^9/L$ 。骨髓象示：增生活跃，巨核细胞数量增多，伴成熟障碍。其最可能的诊断是

A.外科手术切除

A.急性原发免疫性血小板减少症

B.定期做胃酸分泌功能测定

B.慢性再生障碍性贫血

C.定期复查胃肠钡餐检查

C.缺铁性贫血

D.防止幽门梗阻发生

D.慢性原发免疫性血小板减少症合并铁性

E.定期胃镜检查追踪观察

贫血

105.患者，男，43岁。5年前曾患肝炎，

E.溶血性贫血

腹胀个月，加重1周。体检：面色黝黑，颈部J散在分布的蜘蛛痣，蛙状腹，腹围100cm，移动性浊音(+)，肝肋下2cm，质地硬，丹肋下4cm。拟诊肝硬化伴腹水。

107.患者，女，45岁。有慢性尿路感染反

下述治疗措施不妥的是

复作10年，现血尿素氮9mmol/L，血肌

A.低盐饮食

 $186\mu\text{mol}/\text{L}$ ，尿~中红细胞5~10个/HP。

B.限制进水量，每日约给1000ml

肾功能属于

C.强化利尿，至每周体重减轻2~3kg

A.肾功能正常期

B.肾功能代偿期

C.肾功能失代偿期

D.肾衰竭期



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

E.肾衰竭加重期

108.患者，女，46岁。反复发生尿急、尿频、尿痛6年。多次尿检白细胞0~2个/HP，尿细菌定量培养(-)，最可能的诊断是

- A.慢性膀胱炎
- B.慢性肾盂肾炎
- C.尿路感染复发
- D.尿道综合征
- E.神经官能症

109.患者，女，72岁。原无恙，近期消瘦、嗜睡、神态淡漠。胃镜、肠镜检查无阳性，肝、肾功能正常，心电图示心房颤动，该患者诊断最大可能是

- A.冠心病心房颤动
- B.抑郁症
- C.甲状腺功能减退症
- D.淡漠型甲亢
- E.老年性痴呆

110.患儿，男，10岁。近8天来食欲不振，恶心，呕吐，乏力，尿色黄来院就诊，病前两周曾注射丙种球蛋白1支。检查：巩

膜黄染，肝肋下1cm，脾未触及。实验室

检查：ALT 500U/L，胆红素 85.5μmol/L，抗 HAV-IgM(+)，抗 HAV-IgG(+)，HBsAg(+)，抗 HBc-IgM(+)。应诊断为

- A.急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- B.急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- C.急性甲型肝炎、乙型肝炎
- D.被动获得甲肝抗体，急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- E.被动获得甲肝抗体，急性乙型肝炎

◆《《《《B1型题以下提供若干组考试题，每组考试题共用在考试题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(111~113题共用备选答案)

- A.窝洞的点线角太锐
- B.洞的边缘制备于深窝沟处
- C.边缘微渗漏
- D.悬突
- E.垫底材料选择不当

下列情况的出现可能是由于



111.牙体折裂 牙髓组织成为非感染性无害物质，根尖部

112.龋齿一次性充填后的激发痛 牙髓仍可保持活力的治疗方法是

113.继发龋 (120~122 题共用备选答案)

- A.牙周袋
- B.坏死牙髓
- C.接近龈缘
- D.接近龈颊沟
- E.牙龈炎

114.牙周脓肿多源于 120.急性肾衰竭
 115.牙槽脓肿多源于 121.慢性肾衰竭
 116.牙周脓肿发生的部位一般发生于 122.肾前性氮质血症
 117.牙槽脓肿发生的部位一般发生于 (123~127 题共用题干)
 患者，女，30岁。下颌第一恒磨牙咬合不

(118~119 题共用备选答案) 适 1 周，患牙伸长，初时紧咬牙可缓解

- A.干髓术 不适，昨天开始不敢咬牙并出现自发痛，
- B.Ca(OH)₂ 活髓切断术 无放射痛。查下颌第一恒磨牙远中(牙合)面
- C.FC 切髓术 深龋及髓，探诊(-)，可疑叩痛，牙齿不松动，龈(-)，根尖区压痛(+)。
- D.根管治疗术
- E.根尖诱导成形术

118.上颌中切牙(年轻恒牙)冠 2/3 横折 4 小时，牙髓暴露。治疗方案是： 123.根据上述材料，最可能的诊断为

119.为控制牙髓感染和炎症，利用药物使 A.急性牙髓炎

B.急性根尖周炎

C.急性牙周炎



D.急性牙龈炎 D.停药，观察，如无不适，留底，完成充

E.材料不足，无法作出任何诊断

124.为明确诊断，以下最有意义的检查是

A.根尖 X 线片检查

B.冷热测试

C.电活力测试

D.牙周袋探测

E.外周血白细胞计数

125.应急处理首选

A.服用抗炎镇痛药

B.根尖区牙龈切开引流

C.针刺镇痛，并用氢氧化钙直接盖髓安抚

D.去腐、开髓，置氧化锌丁香油棉球安镇

痛

E.去除病髓后开放引流

126.3 天后患者复诊，诉症状明显缓解，

此时处理应当是

A.封失活剂，嘱再次复诊

B.去除引流条，继续服消炎药，条件许应

做洁治术，并嘱 3 个月后复查

C.清理髓腔，根管预备，下次复诊时完根管充填

D.停药，观察，如无不适，留底，完成充

E.拔除患牙，常规医嘱考虑 3 个月后修复

127.依照前面一系列处理，如无意外情况

患者初次起病的 6 个月后，相当于下颌第一恒磨牙的位置，应当是

A.活动桥修复

B.下颌第一恒磨牙活髓，远中面见金属充填物

C.下颌第一恒磨牙死髓，已完成牙髓治疗，并充填

D.以上情况都有可能

E.以上情况都不可能发生

128. (128~130 题共用题干)

患者，男，24 岁。三年前曾于外院行上颌

前牙充填治疗，1 个月前充填物脱落。3 日

前上颌前牙区出现自发性疼痛，深夜加重，

今来诊。口腔检查：1|牙近中切角缺损，

探(++)，冷热诊(敏感)，叩(+)，无松动；

2|牙近中见牙色充填物，充填物边缘发黑，

探痛(-)，冷热测试(-)叩痛(-)，无松动。X

线根尖片示 1|牙近中低密度影像接近髓腔，



根尖周膜增宽，2|牙近中高密度影像远离发痛，遇冷热刺激疼痛加重，伴有夜间痛。

髓腔，根尖部无异常。左上后牙一年来食物嵌塞痛，冷热敏感。

对患者主诉疾病的诊断是检查：左下第一磨牙近中邻(牙合)面深龋洞，

A.1|牙牙髓炎 探入洞内疼痛，食物嵌塞，不松动，叩痛

B.2|牙牙髓炎 (+)。

C.1|牙根尖周炎 131.为明确诊断需要做的重要检查是

D.2|牙根尖周炎 A.牙周检查

E.1|牙深龋 B.温度检查

129.对患者非主诉疾病的诊断是 C.咬合关系检查

A.1|牙深龋 D.电活力测试

B.2|牙根尖周炎 E.X线片检查

C.1|牙牙周炎 132.最可能的诊断是

D.2|牙继发龋 A.可复性牙髓炎

E.2|牙牙周炎 B.急性牙髓炎

130.对于主诉牙的治疗方案正确的是 C.急性根尖周炎

A.充填治疗 D.慢性牙髓炎急性发作

B.安抚治疗 E.慢性根尖周炎治疗方案为

C.拔除患牙 133.治疗方案为

D.根管再治疗 A.根管治疗

E.根管治疗 B.间接盖髓术

(131~133题共用题干) C.直接盖髓术

患者，男，30岁。3天来自觉左下后牙自 D.根尖手术



E.树脂充填修复

D.中间普氏菌

(134~137 题共用题干)

患者，女，28岁，妊娠5个月。主诉近3个月来刷牙时牙龈出血严重。

134.如果诊断为妊娠期龈炎，这种疾病的发生与下列因素最密切相关的是

- A.年龄
- B.体重
- C.全身健康状况
- D.口腔卫生状况
- E.妊娠时间长短

135.下面不是该病临床表现的是

- A.妊娠8个月达高峰
- B.以下前牙区唇面龈乳头多见
- C.色鲜红光亮或暗紫色
- D.分娩后龈炎即可完全自愈
- E.极易出血

136.分离培养妊娠期龈炎患者的龈下菌斑

中的细菌，优势菌为

- A.变异链球菌
- B.伴放线放线杆菌
- C.牙龈卟啉单胞菌

E.金黄色葡萄球菌

137.关于妊娠期龈炎的治疗原则，说法不正确的是

- A.去除局部刺激因素是关键
- B.妊娠8个月时，对于过度增生的牙龈可以行手术切除
- C.局部可应用1%过氧化氢液冲洗
- D.治疗完成后定期复查
- E.自我口腔卫生维护很重要

(138~139 题共用题干)

患儿，男，1岁2个月。仍未见第一颗乳牙萌出，已排除“无牙畸形”。

138.最可能的诊断是

- A.乳牙萌出过迟
- B.先天性个别牙缺失
- C.仍属牙齿的正常萌出范围

D.乳牙阻生

E.牙胚移动不足

139.该发育异常不可能的病因是

- A.佝偻病
- B.甲状腺功能低下

更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院



C.营养缺乏 A.血常规及分类

D.全身性骨硬化症 B.血沉

E.种族特异性迟萌 C.出凝血时间

(140~143 题共用题干) D.嗜酸性粒细胞直接计数

患者，女，36岁。因咽痛服磺胺药后，舌背起疱，破溃后疼痛难忍，进食受限。以往曾有类似病史。检查：舌背黏膜表面可见 $0.8\text{cm} \times 1.2\text{cm}$ 界线清楚的糜烂面，表面有黄色假膜，渗出较多。

140.本病例最可能的诊断为

A.急性疱疹性龈口炎

B.黏膜血疱

C.药物过敏性口炎

D.白塞病

E.接触性口炎

141.在询问病史时，应特别注意患者的

A.健康状况

B.吸烟史

C.家庭发病情况

D.既往用药史

E.局部有无创伤史

142.下列实验室检查对确诊最有帮助的是

E.血清钙

143.下列治疗措施中最重要的是

A.寻找并及时停用可疑药物

B.嘱患者多饮水或输液

C.口服大量的维生素 C 及维生素 B

D.保持口腔清洁，防止继发感染

E.口腔局部涂布溃疡膏

(144~146 题共用题干)

患者，女，60岁。舌痛1年就诊。检查：

舌质红，舌背光滑，舌乳头萎缩。血常规

检查：红细胞计数、血红蛋白量以及血细

胞比容均低于正常值，MCV 及 MCHC 均

高于正常值。

144.口腔最可能的诊断是

A.地图舌

B.萎缩性舌炎

C.叶状乳头炎

D.念珠菌口炎



E.灼口综合征

D.红霉素

145.该患者可能罹患的系统性疾病是

E.卡巴克洛

A.白血病

148.治疗2周后，患者临床症状明显改善，

B.缺铁性贫血

胸片见空腔缩小，抗生素总疗程一般宜持

C.巨幼细胞贫血

续

D.再生障碍性贫血

A.2周

E.粒细胞缺乏症 r

B.3周

146.治疗该病需补充

C.4周

A.维生素B12、叶酸

D.6周

B.硫酸亚铁

E.8周

C.维生素C

(149~150题共用题干)

D.锌

患者，男，24岁。冬春季节上腹痛发作已

E.维生素A

有4年。近半个月来上腹痛加重，伴反酸

(147~148题共用题干)

及饥饿痛，并有半夜痛，痛醒后进食使疼

患者，女，45岁。发热、咳脓痰1周，胸

痛缓解。1小时前突然发作上腹部刀割样

片示右下背段浸润阴影。用青霉素治疗体

剧痛，大汗淋漓，面色苍白，腹痛迅速蔓

温稍下降，但痰量增多，为脓血痰，有臭

延至全腹而来院急诊。

味。胸片示大片浸润阴影中出现空腔。

149.该患者在体检时最可能出现的体征是

147.治疗中需加用

A.肠鸣音亢进

A.祛痰药

B.振水音阳性

B.甲硝唑

C.腹部板状强直

C.阿米卡星

D.皮肤、巩膜黄染



- E.移动性浊音阳性
- 150.协助作出诊断首选的检查是
- A.血白细胞分类、计数
- B.血清淀粉酶
- C.B 超
- D.腹部X线片
- E.急诊胃镜检查
- 第三单元**
- A1型题◆每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。
- 1.局部麻醉术后麻木症状仍未恢复的可能原因是
- A.注射区有血肿
- B.注射区有感染
- C.注射区有神经损伤
- D.注射针折断
- E.注射区有水肿
- 2.超声检查在口腔颌面部不适用于
- A.确定有无占位性病变
- B.确定囊性或实性肿物
- C.为评价肿瘤性质提供信息
- D.确定肿物与邻近重要血管的关系
- E.确定肿物的解剖结构
- 3.腮腺扪诊的正确方法为
- A.双手合诊
- B.以示、中、无名指三指提拉式扪诊为宜
- C.以示、中、无名指三指平触为宜
- D.以示、中指挤压
- E.以拇指、示指挤压
- 4.两段式两次法种植术第1次和第2次手术间隔时间为
- A.1个月
- B.2个月
- C.2~3个月
- D.4~6个月
- E.7~9个月
- 5.用于皮肤消毒的氯己定溶液浓度为
- A.0.1%
- B.0.3%
- C.0.4%
- D.0.5%
- E.1%
- 6.关于成釉细胞瘤的X线表现，下列选项错误的是

更多医师考试资料
微信搜一搜

金英杰口腔学院

- A.可呈单囊 D.牙周膜注射浸润麻醉
- B.可呈分房状，伴有钙化灶 E.针刺麻醉
- C.可呈多房性囊肿样阴影 10.脓肿切开引流操作错误的是
- D.囊壁边缘常不整齐，呈半月形切迹 A.切口的位置在脓肿的低位
- E.囊内根尖不规则吸收 B.切口的位置选择在愈合后瘢痕隐蔽自位
置
- 7.牙周膜注射浸润麻醉适用于血友病患者
的原因是 C.最好选择在口内切开引流
- A.注射时不痛 D.切开至黏膜下或皮下，可钝性分离扩
创口
- B.注射所致的损伤很小 E.颜面危险三角区的脓肿切开后只能：度
挤压，以保证引流通畅
- C.注射用药量较大故止血好
- D.麻醉效能强度高
- E.麻醉作用时间长
- 8.唾液腺的主要感染途径是
- A.血源性感染 11.化脓性颌骨骨髓炎急性期的 X 线片表现
- B.淋巴源性感染 A.骨小梁有斑点状吸收
- C.逆行性感染 B.有骨膜反应
- D.损伤性感染 C.有死骨形成
- E.医源性感染 D.破坏区周围有骨质增生
- 9.阻滞麻醉镇痛效果不全时加用
- A.冷冻麻醉 E.颌骨未见明显改变
- B.表面麻醉
- C.骨膜上浸润麻醉
- 10.脓肿切开引流操作错误的是
- A.切口的位置在脓肿的低位
- B.切口的位置选择在愈合后瘢痕隐蔽自位
置
- C.最好选择在口内切开引流
- D.切开至黏膜下或皮下，可钝性分离扩
创口
- E.颜面危险三角区的脓肿切开后只能：度
挤压，以保证引流通畅
- 11.化脓性颌骨骨髓炎急性期的 X 线片表现
- A.骨小梁有斑点状吸收
- B.有骨膜反应
- C.有死骨形成
- D.破坏区周围有骨质增生
- E.颌骨未见明显改变
- 12.颌面部复合伤伴有鼻腔、外耳道出血时，
考虑有
- A.鼻腔、外耳道软组织挫伤
- B.鼻黏膜撕裂伤
- C.口腔出血反流至鼻腔



更多医师考试资料
微信搜一搜

金英杰口腔学院

D.颅底骨折脑脊液漏

B.潴留囊肿

E.鼻、耳道骨折

C.牙源性囊肿

13.不符合舌损伤缝合要求的是

D.面裂囊肿

A.保持舌的长度

E.血外渗性囊肿

B.小针细线缝合

17.关于腮腺多形性腺瘤手术的叙述，错误

C.边距稍大

的是

D.缝得深些，多带些组织

A.单纯肿瘤摘除术

E.最好加褥式缝合

B.将肿瘤连同周围腮腺组织一并切除术

14.下颌骨骨折的好发部位中不包括

C.肿瘤在浅叶时，将肿瘤和腮腺浅叶一并

A.正中联合部

切除术

B.颏孔区

D.肿瘤在深叶时，将肿瘤连同全腮腺切除

C.下颌角部

术

D.喙突

E.各种术式均要保留面神经

E.髁突颈部

18.免疫组织化学染色中淀粉酶阳性的唾液

15.颌骨骨折最重要的临床体征是

腺肿瘤是

A.咬合错乱

A.多形性腺瘤

B.张口受限

B.嗜酸性腺瘤

C.骨折段异常活动

C.腺样囊性癌

D.局部肿痛

D.腺泡细胞癌

E.骨摩擦音

E.黏液表皮样癌

16.始基囊肿属于

19.不属于牙源性颌骨囊肿的是

A.胚胎性软组织囊肿

A.含牙囊肿



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- | | |
|-----------|----------------------|
| B.根尖周囊肿 | C.术中可行冰冻活组织检查以明确肿瘤性质 |
| C.角化囊肿 | D.术中应保证面神经不受损伤 |
| D.始基囊肿 | E.禁忌作简单的、顺包膜剥离的剜出术 |
| E.动脉瘤样骨囊肿 | |

20.关于沃辛瘤临床特点，下列描述错误的

是

- A.多见于男性，男女比例约 6 : 1
- B.好发于 40~70 岁中老年人
- C.发病可能与吸烟有关
- D.有消长史
- E.易发生血行转移

21.肿瘤化疗的主要不良反应是

- A.口腔溃疡
- B.胃肠道反应
- C.骨髓抑制
- D.脱发
- E.肝损害

22.以下关于腮腺良性肿瘤的诊断与治疗，

错误的是

- A.可采用“细针吸取活检”做穿刺细胞学检查
- B.术前行活组织检查以明确诊断

23.治疗中线致死性肉芽肿应首选

- A.手术
- B.放疗
- C.化疗
- D.激素
- E.冷冻

24.可扪到静脉石的血管病变是

- A.葡萄酒斑状毛细血管瘤
- B.杨梅样毛细血管瘤
- C.血管痣
- D.海绵状血管瘤
- E.蔓状血管瘤

25.带蒂皮瓣断蒂一般在第一次手术后

- A.7 天进行
- B.7~14 天进行
- C.14~21 天进行
- D.21~30 天进行
- E.30~40 天进行



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院

- 26.游离皮片移植失败的主要原因是
- A.皮下有血肿
 - B.患者贫血
 - C.皮片取得太薄
 - D.加压包扎压力
 - E.缝合过紧
- 27.形成瘢痕是因表皮损伤超过
- A.基底层
 - B.棘层
 - C.颗粒层
 - D.透明层
 - E.角质层
- 28.面神经的分支有
- A.眼神经、上颌神经、下颌神经、颊神经、颈神经
 - B.眼神经、耳颞神经、颊神经、下颌神经、颈神经
 - C.眼支、上颌支、下颌支、下颌缘支、颈支
 - D.颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支
 - E.颞支、颧支、颊支、下颌下支、舌下支
- 29.面部的运动神经是
- A.三叉神经
 - B.舌神经
 - C.面神经
 - D.耳大神经
 - E.眼神经
- 30.以下有关皮瓣的叙述中，错误的是
- A.皮瓣感觉的恢复首先为温度觉，最后是痛觉
 - B.术后 72 小时内是游离皮瓣最容易发生血管危象的时候
 - C.皮瓣设计应比缺损处稍大，以预防皮瓣转移后发生收缩
 - D.原则上组织畸形和缺损能用带蒂皮瓣修复就不用游离皮瓣，能用游离皮瓣就不用管状皮瓣
 - E.轴型皮瓣只要在血管的长轴内设计，一般可不受长宽比例的限制
- 31.关于三叉神经痛的临床表现，下列描述错误的是
- A.发作多在白天
 - B.疼痛如电击、针刺或撕裂样剧痛
 - C.多可自行痊愈



D.两次发作之间无任何疼痛症状 35.以下不属于中央性颌骨骨髓炎慢性期症

E.患者常有拔牙史 状的是

32.三叉神经上颌支支配的区域不包括 A.体温可达 40°C , 病变区牙疼痛剧烈

A.下眼睑 B.脓肿切开部位或瘘孔反复有脓液溢出

B.鼻翼

C.瘘孔排出死骨片

C.口角

D.脓液进入消化道 , 有时胃肠道反应明显

D.鼻唇沟

E.发生病理性骨折

E.前额

36.下列选项属于唾液腺造影术禁忌证的是

33.根尖片长焦距平行投照技术的优点是

A.舍格伦综合征

A.不需附加其他特殊设备 , 操作简便

B.唾液腺慢性炎症期问

B.X 线中心线平行于牙长轴 , 避免失真

C.唾液腺阳性结石

C.X 线中心线垂直于牙长轴 , 避伤失真

D.涎瘘

D.X 线中心线平行于牙长轴与胶片的分角

E.唾液腺良性肥大

线 , 避免影像失真

37.以下不是流行性腮腺炎特点的是

E.X 线中心线垂直于牙长轴与胶片线 , 避免

A.常双侧同时或先后发病

影像失真

B.腮腺肿痛、分泌物浑浊

34.根尖片上的骨硬板是

C.可终身免疫

A.牙槽间隔的影像

D.有传染性

B.牙周膜的影像

E.儿童多发

C.牙骨质的影像

38.关于舌下囊肿的处理 , 目前常用的治疗

D.牙槽嵴顶的影像

是

E.牙槽窝内壁的影像

A.袋形缝合



B.尽可能摘除囊肿

D.腺样囊性癌

C.完全摘除囊肿

E.腺泡细胞癌

D.摘除舌下腺

42.多形性腺瘤的临床表现，正确的是

E.引流囊液

A.最常见于腮腺

39.易侵犯面神经，并引起疼痛、面瘫等神经症状的唾液腺肿瘤是

B.发病年龄以 50 岁以上为多见，女性多于

A.多形性腺瘤

男性

B.沃辛瘤

C.应根据生长速度来判断有无恶变

C.腺样囊性癌

D.肿瘤长大后除表现畸形外，一般还可引起功能障碍

D.黏液表皮样癌

E.肿瘤界限清楚，质地中等，扪诊呈结节状

E.未分化癌

43.舌下腺囊肿的内容物的特点是

40.外渗性黏液囊肿常见的致病原因为

A.白色凝乳状物质

A.外伤

B.灰白色角化物质

B.炎症

C.黏稠略带黄色或蛋清样液体

C.过敏

D.豆腐渣样物质

D.感染

E.淡黄色含胆固醇结晶液体

E.化学刺激

41.99mTc 核素显像对以下肿瘤有特殊诊断

44.多形性腺瘤发生最多的部位是

意义的是

A.唇腺

A.多形性腺瘤

B.下颌下腺

B.沃辛瘤

C.舌下腺

C.黏液表皮样癌

D.腮腺



E.腮腺 48.唇裂术后使用唇弓减张的时间至少是

45.味觉出汗综合征是下列唾液腺手术常见 A.7 天

并发症的是 B.10 天

A.舌下腺手术后并发症 C.14 天

B.下颌下腺手术后并发症 D.3 周

C.小唾液腺手术后并发症 E.3 个月

D.腮腺手术后并发症 49.一般认为，进行单侧唇裂整复术最合适

E.与唾液腺手术无关 的年龄为

46.在下颌下腺肿瘤的诊断中，以下准确率 A.新生儿期

较高的定性诊断方法是 B.1~3 个月

A.B 超 C.3~6 个月

B.CT D.6~12 个月

C.术前活检 E.1 岁以后

50.下颌运动异常、疼痛、弹响和杂音是以

E.MRI 下哪类疾病的主要症状

47.以下关于口腔颌面部感染中，最易引起 A.颞下窝肿瘤

全身并发症的是 B.颞下颌关节紊乱病

A.颊间隙感染 C.颞下颌关节炎

B.急性化脓性颌骨骨髓炎 D.颞下颌关节强直

C.急性化脓性颌下淋巴结炎 E.髁突肿瘤

D.急性智齿冠周炎 51.为发现颞下颌关节紊乱病的一些早期变，

E.面部疖痈 如关节盘糜烂、滑膜充血、关节腔内状物

更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- 等，可应用的检查方法是
- A.X 线平片
 - B.关节造影
 - C.颞下颌关节内镜
 - D.CT
 - E.MRI
- 52.以下不是颞下颌关节强直病因的是
- A.感染
 - B.损伤
 - C.类风湿关节炎
 - D.上下颌间瘢痕挛缩
 - E.髁突肿瘤
- 53.下列症状中，颞下颌关节双侧急性前牙区特有的症状是
- A.呈开口状，不能闭合
 - B.双侧耳屏前触诊有凹陷
 - C.咀嚼及吞咽困难
 - D.X 线显示髁突位于关节凹外
 - E.完全不能张口
- 54.听诊有吹风样杂音的是
- A.血管瘤
 - B.淋巴管畸形大囊型
 - C.淋巴管畸形微囊型
 - D.静脉畸形
 - E.动静脉畸形
- 55.低钾血症患者，经补钾治疗后，病情改善时，应考虑有
- A.高钠血症
 - B.低镁血症
 - C.低钠血症
 - D.高钙血症
 - E.代谢性酸中毒
- 56.诊断代谢性酸中毒的主要依据是
- A.呼吸浅而慢，血浆二氧化碳结合力下降
 - B.呼吸深而快，血浆二氧化碳结合力上升
 - C.呼吸深而快，有酮味，血浆碳酸氢根值下降
 - D.呼吸困难，血浆碳酸氢根值上升
 - E.呼吸慢，心率慢，血压高，神志不清
- 57.休克失代偿期的微循环变化主要为
- A.微循环扩张期
 - B.微循环收缩期
 - C.微循环衰竭期
 - D.动静脉短路开放



- E.直接信道开放 61.浅Ⅱ度烧伤的局部损害深度达
- 58.创伤感染后的营养代谢变化，下列描述 A.表浅层，生发层健在
- 错误的是 B.真皮深层，有皮肤附属器残留
- A.能量代谢增大 C.真皮浅层，部分生发层存在
- B.能量需求增加 D.皮肤全层
- C.可导致水、电解质及酸碱失衡 E.皮肤下脂肪
- D.蛋白质分解与合成代谢减少 62.急性化脓性骨髓炎的病原菌最主要为
- E.脂肪分解加大 A.肺炎链球菌
- 59.破伤风患者的治疗原则是 B.铜绿假单胞菌
- A.预防和抢救休克 C.金黄色葡萄球菌
- B.早期行气管切开术 D.溶血性链球菌
- C.高压氧治疗 E.大肠埃希菌
- D.应用破伤风类毒素 63.甲状腺手术后导致呼吸困难的原因不包
- E.清除毒素来源，中和毒素，控制和解除 括
- 痉挛 A.伤口内出血、压迫气管
- 60.甲状腺功能亢进时发生腹泻的主要机制 B.双侧喉上神经损伤
- 是 C.双侧喉返神经损伤
- A.肠内容物渗透压增高 D.急性喉头水肿
- B.肠液分泌增多 E.气管软化、塌陷
- C.肠蠕动增强 64.以下不是输血禁忌证的是
- D.VIP 的作用 A.充血性心力衰竭
- E.肠腔内渗出物增多 B.急性肺水肿



- C.恶性高血压 A.载有本人姓名、性别和年龄的标牌
- D.严重感染 B.载有本人姓名、年龄和专业的标牌
- E.肾衰竭 C.载有本人姓名、专业和职务的标牌
- 65.具有高等学校医学专业本科学历，参加 D.载有本人姓名、职务或者职称的标牌
- 执业医师资格考试的条件是 E.载有本人姓名、职称及科室的标牌
- A.在执业医师的指导下，在医疗机构中工作满1年
- B.在执业医师的指导下，在医疗机构中试用期满1年
- C.在医疗机构中试用期满2年
- D.在医疗机构中工作满2年
- E.在执业医师的指导下，在医疗机构中工作满5年
- 66.医师进行实验性临床医疗，应当 E.病历资料不包括会诊意见
- A.经医院批准或患者本人同意
- B.经医院批准或患者家属同意
- C.征得患者本人或其家属同意
- D.经医院批准并征得患者本人或者其家属同意
- E.经医院批准或征得患者本人及其家属同意
- 67.医疗机构工作人员上岗工作，必须佩戴 A.胎儿性别鉴定的
- B.实施终止妊娠手术的
- C.产前检查的
- D.医学技术鉴定的
- E.婚前医学检查的



70.传染病暴发、流行时，所在地县级以上

地方人民政府应当

A.立即组织力量，按照预防、控制预案进

行防治，切断传染病的传播途径

B.限制或者停止集市

C.停工、停业、停课

D.封闭或者封存被传染病病原体污染的公

共饮用水源

E.控制或者捕杀染疫野生动物、家畜家禽

71.受血者配血试验的血标本必须是输血前

A.2天之内的

B.3天之内的

C.4天之内的

D.5天之内的

E.6天之内的

72.直接影响活动效果，使活动顺利完成的性

特征是

A.气质

B.性格

C.兴趣

D.能力

E.需要

73.以下不属于慢性脑综合征表现的是

A.缓慢发病，不伴意识障碍

B.智能减退

C.记忆障碍

D.人格特征明显偏离常模

E.情绪低落、思维迟缓和意志活动减退

74.在心理应激中起关键作用的因素是

A.认知评价

B.社会支持

C.应对方式

D.事件发生的可预测性

E.事件发生的可控制性

75.提出应对分为情绪关注应对和问题关对

的学者是

A.拉扎勒斯

B.弗洛伊德

C.塞里

D.洛采

E.华生

76.心理治疗奏效的重要前提条件是

A.综合治疗

B.治疗方法的选择



C.来访者的人格特点 A.如果患者拒绝医生的治疗方案，医生只能听之任之

D.良好的治疗关系 B.家属可以代替患者行使知情同意权，因此，如果患者拒绝而家属同意，医生也可

E.治疗家的理论水平

77.医德与医术的关系是

A.医术是最重要的，有了精湛医术必然有

高尚医德 C.患者知情同意的前提是不影响医患关系

B.医德是最重要的，有了高尚医德必然有

精湛医术 D.患者知情同意的前提是不影响医生治疗

C.医德与医术密不可分，医学道德以医学

技术为依托，医学技术以医学道德为指导

D.医德与医术没有关系，医德高尚的不一定

是医术精湛的 E.只要患者有知情同意的能力，就要首先

考虑患者自己的意志

80.在自己独处、无人监督的情况下，仍能

按照医学道德规范的要求行事是指

A.内省

B.反省

C.省悟

D.慎独

E.自律

78.以下不属于公共卫生的功能是

A.预防疾病的发生和传播

B.保护环境免受破坏

C.预防意外伤害

D.解释患者及其家庭有关的健康和医学问

题

E.保证卫生服务的有效性和可及性

79.关于患者的知情同意权，正确的是

81.在人体试验中，下列做法合乎伦理的是

A.受试者有权知道自己是试验组还是对照

组

B.受试者有权获知有关试验目的、性质、



方法、预期好处、潜在危险等的详细信息

E.口服抗菌药

C.试验者必须引导患者及其家属知情同意

84.患者，女，55岁。因口底癌术后行放

D.受试者只要参加试验，就不得退出

射治疗，预防放射性骨髓炎的措施中不包

E.以无行为能力的人作为受试者，不需要

括

贯彻知情同意原则

A.放疗前应行牙周治疗

82.关于临终关怀，正确的是

B.放疗前应去除口内金属物

A.仍以延长患者生命的积极治疗为主

C.残根、残冠应于放疗前拔除

B.临终关怀是24小时的全程服务

D.放疗前避免局部使用氟化物

C.临终关怀注重的是对临终患者的照护

E.暂停戴活动义齿

D.临终患者死亡，临终关怀即可结束

85.患者，女，56岁。右上第二磨牙疼痛

E.临终患者已脱离社会，因此，他们没有

半个月，糖尿病6年，眼药控制血糖在

社会需求

5.96mmol/L。要求拔牙，此时最合适的治

《《《A2型题◆每一道考试题都是以一个小

疗方案是

案例出现的，其下面有A、B、C、D、E

A.局部冲洗上药

五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

B.口服抗生素

83.患者，男，30岁。因上颌第三恒磨牙

C.拔牙+抗生素

拔除，立即出现患侧面部肿胀，下列处理

D.暂缓拔牙

错误的是

E.抗生素+上药

A.立即局部冰敷

86.患者，男，35岁。右下颌骨急性中央

B.立即绷带加压

性骨髓炎，松动牙周溢脓。下列治疗方法

C.立即热敷理疗

错误的是

D.口服止血药

A.全身使用足量有效的抗生素



- B.尽量保留患牙及其余松动牙 翼下颌皱襞处黏膜水肿，下颌支后缘稍内侧有深压痛。拟诊断为
- C.形成骨膜下脓肿后应尽早切开 A.眶下间隙感染
- D.引流不畅时可去除部分骨外板 B.颞间隙感染
- E.营养支持 C.颞下间隙感染
- 87.患者下颌后牙肿痛 1 周后自觉吞咽时疼痛，进食困难，张口困难，并出现声音嘶哑，进食呛咳。检查可见咽侧壁红肿，腭扁桃体突出，腭垂被推向健侧。诊断为
- A.下颌第二磨牙急性冠周炎引起的颊间隙感染 D.颊间隙感染
- B.下颌第三磨牙急性冠周炎引起的翼下到达翼突 E.翼下颌间隙感染
- C.下颌第三磨牙急性冠周炎弓 I 起的舌下间隙感染 89.患者，男，46 岁。口底多间隙感染，肿胀明显，可及捻发音及波动感，主诉呼吸困难。下列处理正确的是
- D.下颌第三磨牙急性冠周炎弓 I 起的咽旁间隙感染 A.加大抗生素剂量
- E.下颌第三磨牙急性冠周炎引起的下颌下间隙感染 B.局部冷敷
- 88.患者，男，51 岁。诉右下颌后牙肿痛溢脓 1 周余，张口困难 4 天。口腔检查：右下第三磨牙近中中位阻生，远中牙龈红肿，探诊出血，远中牙周袋内有脓液溢出。
- 90.一患者因车祸致 LeFort I 型骨折，关于其临床表现正确的是
- A.尽量保留患牙及其余松动牙 A.多伴有颅脑损伤
- C.形成骨膜下脓肿后应尽早切开 B.骨折线由鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶下达到翼突
- D.引流不畅时可去除部分骨外板 C.咬合异常，可发生前牙开(牙合)
- E.营养支持 D.颜面分离，面中份凹陷变长



E.出现眶下区麻木 检查：结节 $1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 大小，表面

91.一患者被硬物击伤面部，拍片证实部牙有破溃，深棕色，周围皮肤出现多个黑色

槽骨骨折，并伴有牙龈撕裂伤处理方法正点状小结节。最可能的临床诊断为

确的是 A.皮内痣恶变

A.颌间结扎固定 B.复合痣恶变

B.去除活动的牙槽骨，缝合软组织 C.交界痣恶变

C.复位牙槽骨，单颌固定，缝合软组织 D.毛痣恶变

D.将牙及牙槽骨复位，缝合软组织 E.雀斑样色素痣恶变

94.患者，男，19岁。左颈上部淋巴结结核。下列药物对此患者治疗无效的是

A.链霉素

B.青霉素

C.异烟肼

D.利福平

E.乙胺丁醇

95.一患者因烧伤后遗留颏颈部纵向条索状瘢痕，患者仰头等活动受限。对该患者的

治疗，下列方案中最合适的是

A. “V-Y”成形术

B.沿瘢痕长轴切除后拉拢缝合

C.切除瘢痕后表层皮片移植术

D. “Z”字成形术

93.患者，男，60岁。右侧鼻翼有1个深棕色结节7年。近2周出现疼痛并长大。

更多医师考试资料 微信搜一搜 金英杰口腔学院



E.瘢痕打磨术

96.患者，45岁。右耳垂下肿物5年，生长缓慢，无痛。检查：肿物以耳垂为中心，界限清楚，活动，呈椭圆形，表面呈结节状，硬度中等。最可能的诊断是右侧腮腺

- A.混合瘤
- B.腺淋巴瘤
- C.血管瘤
- D.黏液表皮样癌
- E.淋巴结炎

97.患者，男，45岁。因右上颌肿物行右上颌骨切除加植皮术。术后所植皮片大部分坏死，遗留较大肉芽创面，准备再行皮

- A.中厚皮片
- B.刃厚皮片
- C.全厚皮片
- D.皮瓣
- E.带真皮下血管网的全厚皮片

98.患儿，男，6岁。双侧腮腺反复肿大2年，临床检查怀疑为儿童复发性腮腺炎。

关于儿童复发性腮腺炎的唾液腺造影表现，

下列说法错误的是

- A.多数主导管无改变
- B.副腺体末梢导管扩张
- C.临床痊愈后仍可有末梢导管扩张
- D.主导管可有扩张
- E.病变可累及下颌下腺

99.一患者颈部被钝器打击后，出现双侧后牙早接触，前牙开(牙合)，双侧颞下颌关节区肿胀疼痛。最合适的诊断应是

- A.双侧颞下颌关节急性前脱位
- B.双侧髁突颈骨折
- C.双侧升颌肌群痉挛
- D.双侧关节盘穿孔破裂
- E.双侧翼外肌痉挛

100.某患者因腮腺良性肿瘤将于次日行腮腺浅叶切除术加面神经解剖术，今日术前家属签字时，谈话中不必要的项目是

- A.术后可能出现面瘫
- B.耳垂麻木
- C.涎瘘
- D.Frey综合征
- E.可能出现半侧下颌骨麻木



- 101 患儿，女，9岁。因上唇外伤性缺损，行下唇组织瓣转移修复上唇缺损，其组织瓣成活后断蒂的时间为
- A.术后1周
 - B.术后3周
 - C.术后10天
 - D.术后1个月
 - E.术后2个月
- 102.患者，男，40岁。因右腮腺混合瘤行右腮腺浅叶切除术+肿物切除术+面神经解剖术，术后1周复诊发现右侧口角偏斜，右鼻唇沟变浅，余无异常。这可能是术中损伤了
- A.面神经颞支和颧支
 - B.面神经颧支和上颌支
 - C.面神经总干
 - D.面神经颊支和下颌缘支
 - E.面神经颈支
- 103.患者，男，32岁。右侧下颌下区进食时肿痛1个月，口内右舌下腺触及黄豆大小之硬结。对该患者应首先选择的检查是
- A.曲面体层片
 - B.右下颌下腺造影
 - C.下颌骨正位片
 - D.舌下区活检
 - E.右下颌下腺造影+右侧口底横断(牙合)片
- 104.患者，男，27岁。在某医院被确诊为慢性腮腺炎，并进行腮腺导管扩张术。进行这种手术的原因主要是由于
- A.导管有涎石
 - B.导管或管口狭窄
 - C.腮腺肿大不明显
 - D.腺体有萎缩
 - E.腺体有感染
- 105.患者，女，36岁。腹痛伴频繁呕吐2天。查体：脉搏120次/min，呼吸32次/min、血压90/60mmHg，呼吸深，似可闻及烂苹果气味。最好应进行的检查是
- A.血清钙测定
 - B.血清钾测定
 - C.血气分析
 - D.血清钠测定
 - E.血CO₂CP测定
- 106.患者，男，46岁。因急性肠梗阻3天



- 人移患者诉口渴，全身乏力，不能坐起。 A.菌血症
- 检 圣 脉 搏 120 次 /min ， 血 压 B.败血症
- 75/60mmHg，眼凹陷，皮肤弹性差，尿 C.毒血症
- 比重 1.025，血清 Na^+ 134mmol/L。最可 D.脓毒血症
- 能的诊断是 E.冷脓肿
- A.高渗性缺水 109.李某出国回到某医疗机构进行身体
- B.等渗性缺水 检查时被确诊患有麻疹，按照《传染病防
- C.低渗性缺水 治法》的规定，对李某该医疗机构应
- D.缺钠性休克 A.强制隔离治疗
- E.继发性缺水 B.在指定的场所进行隔离治疗
- 107.患者，男，60岁。外伤后测得中心静 C.在指定场所进行医学观察
- 脉为 0.29kPa(3cmH₂O)，外周动脉血压 D.根据病情采取必要的治疗和控制传播措
- 在常范围。该患者可能的情况是 施
- A.心功能不全 E.在指定场所采取必要的预防控制措施
- B.血容量不足 110.“食之无味，弃之可惜”属于动机冲
- C.血容量过多 突中的
- D.容量血管过度收缩 A.双趋冲突
- E.容量血管过度扩张 B.双避冲突
- 108.患儿，男，8岁。额部多发性疖肿， C.趋避冲突
- 不慎伤额部，致使局部红肿扩大，弛张性 D.双重趋避冲突
- 高热。4天后臀部皮下又发现一肿块，疼 E.多重趋避冲突
- 痛、压明显，且有波动感。诊断应考虑为 111.研究心理社会应激源事件和影响程度



- 时，适宜量表是 有破坏
- A.90项症状检核表 D.下颌角见骨质疏松脱钙，并有骨质增生
- B.Hamilton 抑郁量表 E.下颌骨体有骨质破坏，并有死骨形成
- C.Zung 自主自评抑郁量表 115.成釉细胞瘤的X线表现为
- D.主题统觉测验 116.颌骨囊肿的X线表现为
- E.生活事件量表 (117~119题共用备选答案)
- 《《《《B1型题
- (112~114题共用备选答案)
- A.下颌角下2cm 绕下颌角弧形切口 A.髁突硬化
- B.口内翼下颌皱襞内侧纵行切口 B.髁突前斜面模糊不清
- C.下颌骨下缘下2cm 平行切口 C.髁突骨质增生
- D.口内翼下颌皱襞处横行切口 D.髁突小凹陷缺损
- E.下颌骨下缘下1~1.5cm 平行切口 E.髁突囊样变
- 112.咬肌间隙脓肿应做 117.表现为髁突密质骨板下有较大的低密度影，周围有硬化边缘
- 113.下颌下间隙脓肿应做 118.表现为髁突边缘呈唇样或骨赘形成
- 114.翼下颌间隙脓肿应做 119.表现为髁突前斜面骨质不规则增厚、密度增高
- (115~116题共用备选答案) (120~122题共用备选答案)
- A.下颌骨体有大小不等的多房阴影 A.舌下腺
- B.下颌骨内有单房透明阴影，四周有白色 B.下颌下腺
- 骨质线 C.腮腺
- D.腮腺
- E.磨牙后腺
- C.颌骨内虫蚀状骨质破坏区，四周骨质可



120. 黏液表皮样癌最常见的发生部位是
A. 停工、停业、停课
B. 涎石病最容易发生于
C. 宣布为疫区
D. 腺泡细胞癌主要发生在
E. 实施封锁
(123~124 题共用备选答案)
F. 对出入疫区的人员、物资和交通工具实施卫生检疫
G. 急性肠梗阻
H. 感染性休克
I. 肺炎高热
J. 慢性十二指肠炎
K. 挤压综合征
L. 低渗性脱水的常见病因是
M. 对已经发生甲类传染病病例的场所，所在地县级以上地方人民政府可
N. 代谢性酸中毒最易发生于
O. 对本行政区域内的甲类传染病疫区，省人民政府可
P. 传染病暴发、流行时县级以上人民政府上一级人民政府决定可
Q. (125~126 题共用各选答案)
R. 《《《《A3/A4 型题》》》》
S. 以下提供若干组考试题，每组考试题共用在考试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
T. 肌内注射破伤风抗毒素 1500U
U. 肌内注射破伤风抗毒素 3000U
V. 肌内注射破伤风抗毒素 1000U
W. 肌内注射破伤风抗毒素 1ml
X. 肌内注射破伤风抗毒素 750U
Y. 125. 5岁儿童下肢皮肤撕裂伤后应
Z. 126. 伤口污染严重者，受伤已超过 12 小时
AA. 应
BB. (127~129 题共用备选答案)
CC. A. 实施隔离措施
DD. (130~132 题共用题干)
EE. 患者，女，24 岁。左下第二磨牙低位阻生。注射麻药后出现头晕、胸闷、面色苍白，脉快而弱，恶心、呼吸困难，血压下降，并有短暂意识丧失。



130.根据上述症状可诊断为
每一支考试题下面的 A、B、C、D、E 五

- A.癔症
- B.肾上腺素反应
- C.中毒
- D.晕厥
- E.超敏反应

(133~135 题共用题干)患者，女，31岁。

131.针对上述情况采取的措施中错误的是

- A.输氧
- B.迅速放平椅位
- C.氨水刺激呼吸
- D.针刺人中穴
- E.多巴胺 20mg 静脉注射

132.为了避免类似情况发生，无需采用方

- 法是
- A.做好术前思想工作
- B.消除紧张情绪
- C.避免空腹手术
- D.必要时术前口服镇静药
- E.术前口服升压药

个备选答案中选择一个最佳答案。

左下后牙、左下颌角复肿胀 3 个月，开口

困难。检查开口度一指半，阻生牙牙龈充血糜烂，挤压有少量脓液溢出，咬肌区膨隆明显，质硬，轻度压痛。

133.此患者最可能的诊断为

- A.急性智齿冠周炎
- B.左咬肌间隙脓肿
- C.左下颌骨骨结核
- D.左咬肌区放线菌病
- E.左下颌骨边缘性骨髓炎

134.此时最简单有效的 X 线检查方法为

- A.左下颌升支切线位片+左下颌骨侧位片
- B.下颌体腔片+左下颌骨侧位片
- C.左下颌后部横断咬合片+左下颌骨侧位片
- D.CT
- E.MRI

135.应选择的措施是

- A.观察
- B.局部理疗

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考试题。请根据案例所提供的信息，在



C.大剂量抗生素的使用 疑局部脓肿形成，此时最有效的检查方法

D.切开引流 为

E.病灶刮治术 A.触诊

(136~139 题共用题干) B.X 线检查

患者，男，32岁。6天前感冒后出现左下后牙区胀痛，进食、吞咽时加重。昨日起出现局部自发性跳痛，张口受限，低热，头痛。检查可见：左下颌角区颊部稍肿胀，无压痛，张口度两指，左下第三磨牙近中阻生牙龈红肿充血，挤压可见远中盲袋内少量脓液溢出，颊侧前庭沟丰满、充血，压痛明显、叩诊(-)，无松动，咽侧壁稍充血，无压痛。

136.如患者出现重度张口受限，以下颌角

为中心的肿胀，皮肤潮红、压痛，此时应怀疑存在

A.颞下间隙感染

B.颞间隙感染

C.下颌下间隙感染

D.翼下颌间隙感染

E.咬肌间隙感染

137.如下颌角区存在广泛凹陷性水肿，怀

C.化验

D.粗针头穿刺

E.观察体温变化

138.如果下颌升支区脓肿形成而未得到及

时引流，将造成骨质破坏的时间约为

A.7~10 天

B.1~2 周

C.2~4 周

D.4~6 周

E.6 周以上

139.此患者经治疗后，病情好转，仅有远

中牙龈轻度压痛，此时应

A.龈切消除盲袋

B.局部冲洗上药

C.拔除患牙

D.口服抗生素继续消炎

E.锻炼身体提高抵抗力

(140~141 题共用题干)患者，男，34岁。



- 右下颌下区无痛性质软肿物 3 个月，表面
皮肤正常，口内检查亦未见异常。行下颌
下手术时见肿物呈囊性，术中囊壁破裂，
流出黏稠而略带黄色蛋清样液体，遂将囊
壁及下颌下腺一并摘除，但术后不久囊肿
复发。
- 140.该病最可能的诊断是
- A.下颌下腺囊肿
 - B.潜突型舌下腺囊肿
 - C.下颌下区软组织囊肿
 - D.囊性水瘤
 - E.鳃裂囊肿
- 141.该病的最佳治疗方案是
- A.切除下颌下腺，吸尽囊液，加压包扎
 - B.完整摘除囊壁，加压包扎
 - C.切除下颌下腺及摘除囊壁
 - D.切除舌下腺及摘除囊壁
 - E.切除舌下腺，吸尽囊液，加压包扎
- (142~146 题共用题干)患者，女，30 岁。
开口受限 1 年，既往有关节弹响史。临床
检查见开口度 1 指半，开口型左偏。
- 142.首先应进行的检查是
- A.许勒位及下颌开口后前位
B.许勒位及经咽侧位
C.许勒位及升支侧位
D.曲面体层及下颌开口后前位
E.曲面体层及经咽侧位
- 143 下列表现中，不是颞下颌关节紊乱病
表现的是
- A.关节间隙改变
 - B.髁突运动度改变
 - C.两侧关节形态不对称
 - D.髁突骨质硬化
 - E.关节结构为“T”形致密团块代替
- 144.X 线片及体层摄影检查发现颞下颌关
节前间隙增宽，髁突骨质未见异常。应进
一步进行的检查是
- A.许勒位开口位
 - B.颞下颌关节侧位体层
 - C.颞下颌关节正位体层
 - D.颞下颌关节 CT 检查
 - E.颞下颌关节造影
- 145.左侧颞下颌关节造影侧位体层闭口位
见关节盘后带位于髁突横嵴前方，开口位



见髁突前方的关节盘变形，似一肿块压迫 E.唇裂

造影剂的影像。应诊断为 148. 需优先采取的治疗措施是

- A.不可复性盘前移位 A.语音治疗
- B.关节肿瘤 B.心理治疗
- C.关节盘附着松弛 C.咽成形手术
- D.关节盘内移位 D.正畸治疗
- E.关节盘可复性前移位 E.修复治疗

146. 颞下颌关节上腔造影侧位体层闭口位 (149~150题共用题干)一患者车祸后2小时送至医院，诉咳嗽、胸部疼痛。查体：T

- 方的正常影像应当是 36.5°C，P 130 次/min，R 30 次/min，
- A.关节盘后带恰位于髁突横嵴之上 BP 9V 60mmHg。神志清，右胸部压痛明
- B.关节盘中带恰位于髁突横嵴 显，右肺呼吸音低，右下肢骨折征。胸片
- C.关节盘前带恰位于髁突横嵴 示右侧液气胸。
- D.关节盘后带恰位于髁突横嵴前方
- E.关节盘后带恰位于髁突横嵴后方

149. 拟诊为

(147~148题共用题干)患儿，8岁。鼻音 A.联合伤

浓重、发音不清数年，磨有唇腭裂手术史， B.混合伤

口腔检查见咽腔宽大。

C.多发伤

D.多处伤

147. 最恰当的诊断应是 E.复合伤

- A.唇裂术后畸形
- B.腭咽闭合不全
- C.鼻畸形
- D.腭裂

150. 首先应采取的处理是

- A.止痛
- B.骨折固定



- C.镇静
- D.是否使用过抗惊厥药
- D.胸腔闭式引流
- E.是否有传染性疾病
- E.吸氧
- 4.口腔专科病史中的修复治疗史不包括

第四单元

A1型题每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 1.口腔专科病史不包括
 - A.发病的时间
 - B.病情发展的进程
 - C.曾经接受过的检查和治疗
 - D.患者家庭成员有关类似疾病
 - E.缺失的原因和时间(对牙缺失的患者)

2.口腔专科病史不包括

- A.牙体牙髓病史
- B.修复治疗史
- C.放射影像资料
- D.颞下颌关节病史
- E.家族史

3.系统病史的内容不包括

- A.有无药物过敏史
- B.修复治疗情况

- A.是否曾做过牙体修复
- B.是否曾做过牙列缺损修复
- C.曾采用何种修复方式
- D.现有修复体的使用情况
- E.患者希望的修复方式
- C.镇静
- D.胸腔闭式引流
- E.吸氧

5.牙周病易受到以下系统疾病影响的是

- A.糖尿病
- B.心脏病
- C.高血压
- D.吸烟
- E.胃病

6.面部检查不包括

- A.面部畸形
- B.系带附着
- C.面部皮肤颜色
- D.笑线位置



- E.侧面轮廓 B.内聚结合
- 7.人正常开口度为 C.机械嵌合
- A.3.0~3.5cm D.分子间结合
- B.3.3~4.0cm E.氢键结合
- C.3.5~4.3cm 11.以下对全冠龈边缘位置设计无影响的是
- D.3.7~4.5cm A.固位力大小
- E.4.0~4.7cm B.美观因素
- 8.下面关于暂时冠桥的说法，不正确的是 C.牙龈的保护
- A.可保护剩余牙体组织 D.边缘密合
- B.不利于自洁 E.牙体预备操作的难易
- C.可恢复部分咀嚼功能 12.在以下关于沟固位形的说法中，错误的是
- D.美观 是
- E.防止患牙伸长 A.深度一般为 1mm
- 9.下列有关嵌体的说法，不正确的是 B.可抗水平脱位和龈向脱位
- A.在口外的模型上制作完成 C.分有肩台式和无肩台式
- B.颌面形态均应与对颌牙协调 D.对修复体有加固作用
- C.预备牙体洞形时，应制备倒凹以加强固 E.与就位道方向一致
- 位 13.以下关于上前牙金瓷冠牙体预备的描述，
- D.强度及耐久性能好 错误的是
- E.可高度抛光 A.切缘预备成与牙体长轴唇成 45°角
- 10.粘接力的形成不包括 B.唇面分两个平面磨除
- A.化学结合 C.保留舌隆突外形
- 



- D.唇侧形成龈下肩台 确的是
- E.形态圆钝 A.不破坏根尖封闭的情况下应该尽量长
- 14.贵金属冠的金属基底冠有瓷覆盖部位的厚度最少为 B.至少达根长的 4/5
- A.0.3mm C.越长固位越好
- B.0.5mm D.至少等于冠长
- C.0.7mm E.根尖部保留至少 3~5mm 根充物
- D.0.8mm 18.桩冠中冠桩末端的要求为
- E.1.0mm A.至少距根尖部 0.5~1mm
- 15.金瓷冠唇面肩台一般为 B.至少距根尖部 1~2mm
- A.0.5mm 肩台 C.至少距根尖部 2~3mm
- B.1.0mm 肩台 D.至少距根尖部 3~5mm
- C.1.2mm 肩台 E.至少距根尖部 5~8mm
- 16.以下关于金瓷冠的描述，错误的是 19.上后牙 3/4 冠邻沟的方向
- A.瓷层越厚越好 A.与颊面(牙合)2/3 平行
- B.镍铬合金基底冠较金合金强度好 B.与颊面龈 1/3 平行
- C.多次烧结可提高瓷的热膨胀系数 C.与轴壁平行
- D.体瓷要在真空中烧结 D.与舌侧壁平行
- E.上釉在空气中完成 E.与颊面(牙合)1/3 平行
- 17.以下关于桩冠冠桩长度的说法中，不正 20.有关后牙 3/4 冠的牙体预备，正确的是
- A.正常(牙合)关系时，冠的(牙合)边缘要覆盖颊、舌尖
- B.舌面预备可不去除倒凹



- C. 邻面轴沟可预备在邻面舌侧 1/3 与中 1/3 交界处 D.(牙合)面沟预备是为了防止修复体(牙合)向脱位 E. 必要时可在邻面增加邻面轴沟数目，或在(牙合)面增加钉洞固位形
21. 有中间基牙的多单位固定桥，近中末端无基牙，其称为
 A. 双端固定桥
 B. 种植体固定桥
 C. 半固定桥
 D. 复合固定桥
 E. 粘接固定桥
22. 倾斜基牙固定桥取得共同就位道的方法，错误的是
 A. 正畸
 B. 各牙
 C. 改变固位体设计
 D. 双套冠
 E. 拔除倾斜牙
23. 缺隙两端各有一基牙，一侧为可动连接体、一侧为不动连接体的固定桥称为
- A. 双端固定桥
 B. 种植体固定桥
 C. 半固定桥
 D. 复合固定桥
 E. 粘接固定桥
24. 固定桥使用一段时间后，出现冷热刺激痛、自发痛、夜间痛，其可能的原因是
 A. 基牙产生继发龋
 B. 牙龈退缩
 C. 牙周创伤
 D. 粘固剂溶解
 E. 基牙发生牙髓炎
25. 固定桥戴用后出现基牙松动，正确的处理方法是
 A. 先采取保守治疗，调(牙合)以减轻基牙负担
 B. 牙周洁治
 C. 在同位体上钻孔，对松动基牙行根管治疗
 D. 拆除固定桥
 E. 调磨天然牙以减轻咬合接触
26. 以下对于连接体的设计，错误的是



- A.连接体的设计应考虑功能、强度、美观 B.邻接丧失
- B.应适当增加连接体磨牙(牙合)龈方向的高
度，以提高强度 C.牙周袋
- C.前牙桥的连接体应适当向舌侧加厚，以
增进唇侧的立体感 D.早接触
- D.后牙同定桥的邻间隙应适当加大，以利
于清洁 E.对(牙合)牙伸长
- E.半固定桥的两端都是活动连接体

- 27.对于固定桥破损后的处理，错误的是
- A.检查咬合，是否存在(牙合)干扰等咬合不
平衡 B.与牙体的接触面积大，固位力强

- B.对于树脂变色、磨损等，可以在口内用
光固化树脂直接修补 C.外形、厚度与邻接状况均可调整
- C.对于瓷少量缺损而未暴露金属底冠者，
可在口内用专用树脂修补 D.不能用于固定桥

- D.对于瓷裂和崩瓷者，必要时可拆除后重
新制作 E.对剩余牙体有保护作用
- E.对于咬合力较大导致破损需重做时，可
以适当增加桥体的颊舌径

- 28.缺牙后长期未修复可能导致的牙周组织
改变，除了
- A.继发龋

29.下列关于铸造金属全冠特点的说法，错

误的是

- A.主要用于后牙 B.与牙体的接触面积大，固位力强
- B.与牙体的接触面积大，固位力强 C.外形、厚度与邻接状况均可调整
- C.外形、厚度与邻接状况均可调整 D.不能用于固定桥
- D.不能用于固定桥 E.对剩余牙体有保护作用

30.固定桥修复前的口腔准备是

A.治疗龋病

B.治疗牙周疾患

C.外科处理

D.余留牙的调(牙合)

E.以上都是

31.对牙槽嵴损伤最大的人工牙是

A.解剖式瓷牙

B.半解剖式瓷牙

C.解剖式塑料牙

D.半解剖式塑料牙





E.非解剖式塑料牙 D.侧腭杆用以连接前后缺牙区或前后腭杆

32.可摘局部义齿基托伸展范围，错误的是 E.侧腭杆距腭侧龈缘应有3~4mm

A.基托的唇颊侧边缘伸展至黏膜转折处， 35.下列关于铸造卡环的叙述，正确的是

不妨碍唇颊的正常活动

A.铸造卡环较适合于Ⅲ型观测线

B.下颌基托的舌侧边缘伸展至舌侧黏膜转 折处，不妨碍舌的正常活动

B.铸造卡环固位臂一般需要0.75mm的水 平倒凹

C.上颌基托的后缘伸展至翼上颌切迹，远 中颊侧盖过上颌结节

C.铸造卡环臂一般设计为I杆

D.上颌基托后缘中部伸展至腭小凹

D.铸造卡环较锻丝卡环弹性、韧性好，不 易折断

E.下颌基托后缘应覆盖磨牙后垫1/3~1/2

E.铸造卡环与基牙的接触面积较锻丝卡环 大

33.为减少发音影响，做薄上颌基托时，应 在 A.前腭2/3部分

36.可摘局部义齿修复前口内检查的内容不 包括

B.前腭1/2部分

A.缺牙区的部位和数目

C.前腭1/3部分

B.缺牙区牙槽嵴的骨表面状态

D.后腭2/3部分

C.余留牙的情况

E.后腭1/3部分

D.口内软组织的情况

34.有关腭杆的描述错误的是

E.唾液的黏度和分泌量

A.前腭杆位于腭隆突之前，腭皱襞的后份

37.混合支持式义齿受力后，牙合力由

B.后腭杆过后容易引起恶心

A.基牙承载

C.后腭杆位于腭隆突之后，两端微弯向前 至第一、二磨牙之间

B.(牙合)支托承载
C.基牙和基托下黏膜、牙槽骨承载





微信搜一搜

金英杰口腔学院

D.基托承载

D.前后牙同时缺失

E.基托下的黏膜、牙槽骨承载

E.缺牙间隙多，倒凹大

38.上颌两侧多个后牙缺失，混合支持式可

41.支点线是指

摘局部义齿设计时连接两侧鞍基的大连接

A.两个基牙的连线

体一般不考虑

B.两个卡环的连线

A.后腭杆

C.两个固位体的连线

B.前腭杆

D.两个支托的连线

C.变异腭板

E.两个主要基牙上直接同位体上(牙合)支托

D.全腭板

的连线

E.关闭马蹄状腭板

42.选择人工前牙时不必考虑的因素是

39.下颌单侧游离端缺失，选择局部可摘义

A.余留牙的颜色、形状和大小

齿修复，错误的设计是

B.患者过去是否戴过义齿

A.在近缺隙侧的基牙上设置直接同位体

C.患者的面型

B.大连接体设计为舌杆

D.患者的肤色

C.在对侧前牙上设置间接固位体

E.患者的年龄

D.在对侧牙弓后面部分设置两个间接固位

43.可摘局部义齿戴用后出现基牙疼痛的原

体

因可能不是

E.间接固位体与鞍基连接

A.基牙有龋坏或牙周病

40.不适用调节倒凹法确定就位道的是

B.(牙合)支托断裂

A.后牙游离缺失

C.基牙与卡环接触过紧

B.前牙缺失

D.基托与基牙接触过紧

C.一侧后牙非游离缺失

E.咬合高



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- 44.RPI 卡环邻面板的作用不包括
- A.防止食物嵌塞
 - B.防止义齿脱位
 - C.有利于美观
 - D.增强义齿的固位
 - E.防止基托下沉
- 45.上前牙缺隙过窄时，排牙错误的做法是
- A.将人工牙做不同程度的扭转
 - B.使人工牙与邻牙重叠
 - C.加大人工牙的近远中向倾斜度
 - D.将人工牙减径
 - E.将人工牙减数
- 46.影响牙槽嵴吸收速率的局部因素是
- A.失牙原因
 - B.失牙时间
 - C.局部骨质密度
 - D.是否经过牙槽嵴修整
 - E.以上都是
- 47.全口义齿修复与固位有关的因素，下列错误的是
- A.牙槽骨致密程度
 - B.口腔黏膜的性质
- 48.牙列缺失后牙槽嵴吸收较快的部位是
- A.前磨牙区
 - B.磨牙区
 - C.腭穹隆
 - D.上颌结节
 - E.上下前牙区
- 49.全口义齿修复中，作用于唾液与唾液之间的力应称为
- A.粘固力
 - B.吸引力
 - C.黏着力
 - D.黏附力
 - E.附着力
- 50.对提高全口义齿固位和稳定意义最小的是
- A.准确印模
 - B.有利的磨光面形态
 - C.合理的排牙
 - D.尽量扩大基托面积



- E.指导患者正确使用义齿 自凝塑料直接在口内修复
- 51.全口义齿基托需缓冲的区域是 53.WHO 推荐的用于成人口腔健康状况
 A.后堤区 的指数年龄组是
 B.远中颊角区 A.30~40 岁
 C.上颌牙槽嵴顶 B.35~44 岁
 D.下颌牙槽嵴顶 C.40~50 岁
 E.下颌舌骨嵴 D.45~54 岁
 52.全口义齿唇、颊侧基托折断的修理方法 E.50~60 岁
 中，错误的是 54.WHO 评价龋病流行程度的标准年龄是
 A.将折断的基托在口内复位后，取模，灌 A.10 岁
 注石膏模型，在模型上进行义齿修理 B.12 岁
 B.如折断的基托断端丢失或呈碎块，不能 C.15 岁
 对合时，可用蜡或印模膏放在基托折断的 D.16 岁
 部位，在口内修整外形后，灌模型，装盒， E.18 岁
 用自凝塑料或热凝塑料恢复 55.影响龋病流行的相关因素不包括
 C.如折断的唇、颊侧基托断端较小，可用 A.氟的摄入量
 粘结剂(如 502 胶)将断端粘住，然后灌石 B.糖的摄入量
 膏模型，口外修补 C.钙的摄入量
 D.如折断的唇、颊侧基托断端较小，对义 D.糖的摄入频率
 齿的使用情况无影响时，可以不做任何处 E.饮食习惯
 理 56.龋病流行特征不包括
 E.如折断的唇、颊侧基托断端较小，可用 A.地区分布





微信搜一搜



金英杰口腔学院

B.时间分布

60.自来水加氟的不足之处是

C.人群分布

A.不具各公共卫生的特点

D.氟化物分布

B.可能产生氟骨症

E.城乡分布

C.不具备突出的社会性

57.wHo 龋病流行程度评价标准是

D.社区居民因龋治疗费用减少

A.龋齿发病率

E.易造成氟浪费

B.患龋率

61.Knutson 使用局部涂氟所用氟化钠溶液

C.龋均

的浓度为

D.龋面均

A.2%

E.无龋率

B.1.23%

58.菌斑指数与软垢指数的相同点是

C.5%

A.只考虑龈缘处菌斑的厚度

D.8%

B.不估计牙面菌斑的面积

E.0.5%

C.检查前先漱口

62.下面不是窝沟封闭适应证的是

D.吹干牙面后检查

A.萌出 5 年后无龋的牙

E.使用镰形探针

B.窝沟深，可以插入探针的牙

59.由尿排出的氟占机体总排泄量的

C.对侧同名牙有患龋倾向的牙

A.15%左右

D.窝沟深，可以卡住探针的牙

B.35%左右

E.对侧同名牙有龋的牙

C.55%左右

63.WHO 口腔健康标准中，下面错误的是

D.75%左右

A.牙齿无龋洞

E.95%左右

B.无疼痛感



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- | | |
|----------|---------------|
| C.牙无松动 | A.手机头消毒较困难 |
| D.牙龈颜色正常 | B.对消毒灭菌原理知之不多 |
| E.无出血现象 | C.对制度执行不严 |
- 64.口腔科医师操作中最易感染的是
- | | |
|-------|------------------|
| A.真菌 | E.对控制感染的正确估价 |
| B.病毒 | 68.乙肝经皮肤传播的途径不包括 |
| C.细菌 | A.血液 |
| D.支原体 | B.污染的针头 |
| E.放线菌 | C.性接触 |
- 65.对口腔科医生最危险的是
- | | |
|------|-----------------|
| A.疱疹 | D.针灸 |
| B.结核 | E.手术 |
| C.流感 | 69.目前广泛使用的糖代用品是 |
| D.乙肝 | A.糖精 |
| E.梅毒 | B.山梨醇 |
- 66.口腔科医生最易受染的途径是
- | | |
|-------------|---------------------|
| A.被污染器械刺伤皮肤 | C.木糖醇 |
| B.操作后不洗手 | D.甘露醇 |
| C.空气消毒不严 | E.蛋白糖 |
| D.食物消毒不严 | 70.龋病二级预防的内容包括 |
| E.接触患者血液和唾液 | A.早期诊断、定期口腔检查、X线辅助检 |
- 67.口腔科感染控制的最突出问题是
- | | |
|---------------|-----------------------|
| A.手机头消毒较困难 | 查、早期充填 |
| B.对消毒灭菌原理知之不多 | B.早期诊断、定期口腔检查、X线辅助检查、 |
| C.对制度执行不严 | 窝沟封闭 |
| D.消毒灭菌缺少严格分类 | |



- C.早期诊断、X线辅助检查、早期充填、
D.遗传因素
氟防龋
E.先天性免疫缺损
D.口腔健康教育、定期口腔检查、X线辅
助检查、窝沟封闭
74.衡量人群中短时间内新发病例的频率，
采用的指标为
E.早期诊断、口腔健康教育、早期充填、
氟防龋
71.牙周病发生的始动因素是
A.牙菌斑
B.牙石
C.白垢
D.盒物嵌塞
E.内分泌紊乱
75.可使人群易感性升高的因素除外
A.新生儿增加
B.免疫人口免疫力的自然消退
C.易感人口的迁入
D.隐性感染发生后
72.与牙周组织破坏关系最为密切的是
A.光滑面菌斑
B.(牙合)面点隙裂沟菌斑
C.邻面菌斑
D.颈缘菌斑
E.龈下菌斑
76.在恶性肿瘤的主要危险因素中最主要的
是
73.以下属于牙周病先天性危险因素，除外
A.种族
B.性别
C.年龄
D.生物因素
E.物理因素
F.化学因素
G.体力活动



- E.社会心理因素 A.龋坏
- A2◆每一道考试题都是以一个小案例出现的，其下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。
- 77.患者，73岁。上、下无牙颌，全口义齿修复3年余，自觉义齿固位不佳，首先应采取的措施为
- A.全面检查
 - B.调(牙合)
 - C.修整基托
 - D.组织面重衬
 - E.重新制作全口义齿
- 78.患者，男，56岁。自述在化工厂工作。口腔卫生良好，几乎没有牙垢，自称每天刷3次牙齿，每次4分钟。因工厂停工，患者没有上班。爱吃甜食，爱喝碳酸饮料：口腔局部检查无异常，无充填物，除了 $\overline{4|}$ 和 $\overline{3|}$ 有牙尖半圆形缺损外。缺损表面光滑、牙本质已露出，但无冷热刺激痛和叩痛，牙体颜色无异常。咬合基本正常，双侧组牙平衡(牙合)。牙龈轻度萎缩。X线片无异常：患者可 $\overline{4|}$ 和 $\overline{3|}$ 缺损的主要原因是
- A.龋坏
 - B.酸蚀
 - C.刷牙损伤
 - D.自然磨耗
 - E.外伤
- 79.患者，女，43岁。主述左下颌食物嵌塞，经检查发现，左下颌第一磨牙远中颊(牙合)面银汞充填，X线片显示已行根管治疗。此时应做的牙体修复是
- A.暂时冠
 - B.金属全冠
 - C.塑料全冠
 - D.重新银汞充填
 - E.不需修复
- 80.患者，男，32岁。左上颌中切牙冠1/2缺损，已露髓，应选择的治疗方案为
- A.银汞充填
 - B.树脂充填
 - C.玻璃离子充填
 - D.根管治疗后桩冠修复
 - E.建议拔除
- 81.患者 $6|$ 死髓，牙体大部缺损，4个壁尚



- 完好，已行根管治疗，临床牙冠短，要求修复。最佳治疗方案是
- A.复合树脂充填治疗
 - B.银汞充填治疗
 - C.铸造嵌体修复
 - D.高嵌体修复
 - E.银粉玻璃离子充填
- 82.患者 5|舌尖部分折断，牙髓活力正常，牙无松动，但咬合较紧。拟行 3/4 冠修复，其牙体预备正确的是
- A.冠的胎边缘终止于(牙合)缘嵴下方
 - B.冠的(牙合)边缘一定要覆盖颊尖以保护牙尖
 - C.(牙合)面应至少预备大于 1.0mm 的间隙
 - D.沿中央沟预备成宽深各 1mm 的(牙合)面沟
 - E.邻轴沟位于邻面舌侧 1/3 与中 1/3 交界处
- 83.患者 7|铸造全冠修复后 2 个月松动脱落。检查：预备体良好，咬合检查发现全冠近中舌尖有明显早接触点。正确的处理是
- A.调磨对(牙合)牙牙尖
 - B.调磨对(牙合)牙早接触点
 - C.使用更优质的粘接剂
 - D.调磨全冠上的早接触点，抛光后重新粘固
 - E.重做全冠
- 84.患者，25 岁。4|拔牙 3 个月余，在设计桥体时，选择的龈端类型最合理的是
- A.鞍式
 - B.卫生桥
 - C.球形
 - D.改良盖嵴式
 - E.盖嵴式
- 85.患者 6|缺失，间隙较大，如果行双端固定桥修复，为了减轻桥体所受的(牙合)力，以下方法不正确的是
- A.减少(牙合)面颊舌径
 - B.扩大(牙合)面舌外展隙
 - C.加深(牙合)面颊舌沟
 - D.增加牙合面副沟
 - E.脱离(牙合)接触
- 86.患者 6|缺失，行 5|、7|双端固定桥修复，戴牙后 2 天复诊诉咬合时疼痛，最可能的



- 原因是欲修复其缺失前牙，关于分类，正确的是
- A. 牙龈炎 A. 为 Kennedy 第一类第一亚类牙列缺损
 - B. 根尖炎 B. 为 Kennedy 第二类第一亚类牙列缺损
 - C. 咬合早接触 C. 为 Kennedy 第三类第一亚类牙列缺损
 - D. 固位体边缘过长 D. 为 Kennedy 第四类牙列缺损
 - E. 牙髓充血 E. 为 Kennedy 第二类第二亚类牙列缺损
87. 患者， $|2$ 缺失，间隙小， $|3$ 切角缺损
 1/3，X 线片检查根长大，牙周膜健康， $\overline{|2}$
 为局部义齿。最好的设计是
- A. 双端固定桥 A. 上颌为 Kennedy 第三类牙列缺损
 - B. 单端固定桥 B. 常规选择 $|5$ 、 $|7$ 为基牙
 - C. 局部义齿 C. 应设计金属网加强、金属(牙合)面
 - D. 种植义齿 D. 颊舌侧应为弯制卡环
 - E. 暂不修复 E. 牙合支托、卡环应整体铸造
88. 患者 $\overline{|6}$ 缺失， $\overline{|5}$ 颊向倾斜，要求固定修复，可行的对策是
- A. 单端桥 A. 下颌为 Kennedy 第三类第二亚类牙列缺损
 - B. 半固定桥 B. 可在 $\overline{|6}$ 上设置圈卡
 - C. 3/4 冠修复 $\overline{|5}$ 再同定桥修复 C. T 上设置舌隆突支托
 - D. $\overline{|5}$ 根管治疗后桩冠固位体固定桥修复 D. 31 了上设置切支托
 - E. 拔除 $\overline{|5}$ 后固定桥修复
89. 患者，男，49 岁。 $81-\overline{|2}$ 缺失，患者
90. 患者，女，38 岁。 $\overline{|6}$ 缺失 10 年余，间隙小 $|5$ 、 $|7$ 无倾斜无松动， $\overline{|6}$ 伸长。不正确的说法是



E.应设计为牙与黏膜共同支持式

92.患者，女，28岁。74|2因为龋坏而拔

除1年余，缺牙间隙及(牙合)龈距离正常，

邻牙无倾斜，遗留牙健康，牙周情况良好。

不正确的说法是

A.上颌为 Kennedy 第三类第二亚类牙列缺损

B.缺失牙可行同定桥修复

C.缺失牙可行种植义齿修复

D.若为活动设计，可用前腭板相连

E.上述说法都不对

93.患者，男，53岁。1|1缺失，重度深覆

(牙合)3 - | - 3咬至上腭黏膜。不正确的说

法是

A.下前牙去髓作大量磨改

B.可采用矫治性可摘局部义齿修复

C.腭侧采用铸造金属基托

D.下前牙不做磨改，腭侧采用树脂基托

E.采用矫治性可摘局部义齿修复，要定期

复查以免个别下前牙发生疼痛、松动

94.患者，女，25岁。2-|2因外伤缺失半

年余，余留牙健康，牙周情况好，唇侧牙

槽嵴丰满。下列说法不正确的是

A.上颌为 Kennedy 第一类牙列缺损

B.唇侧可不放基托以利美观

C.可采用前斜方就位，使人工牙与天然牙

间龈乳头部位的间隙减小

D.人工牙排列避免深覆牙合

E.可在四上 6 上放(牙合)支托

95.患儿，女，7岁。第一恒磨牙窝沟着色

且能卡住探针，疑有龋坏。该儿童应选用

的预防治疗措施是

A.ART

B.预防性充填

C.充填治疗

D.局部用氟

E.口腔健康教育

96.某山区人群氟牙症流行，经调查饮水氟

浓度为 0.1~0.3mg/kg，造成该地区氟牙

症流行的最可能的原因是

A.饮酒和吸烟

B.个体易感

C.水氟浓度过高

D.燃煤污染

- E.口腔卫生行为不良 D.牙列不齐
- 97.口腔系实习生到临床工作的第一天，开始对患者进行检查，需选择的手套是
- A.乳胶手套 E.口臭
- B.消毒乳胶手套 100.关于在学校为期 2 年的含氟牙膏防龋
- C.外科手套 临床试验中用哪种龋病指数，课题组的正
- D.乙烯基手套 确意见是
- E.一般公用手套 A.dmft
- 98.我国是乙肝高发国，很多患者担心在口腔科就诊时被感染乙肝，这样的顾虑有道理吗？因为乙肝是经
- A.呼吸道传播的 B.dmfs
- B.消化道传播的 C.DMFT
- C.皮肤途径传播的 D.DMFS
- D.飞沫传播的 E.Deft
- 101.为了解小学生龋病的自然变化情况，研究人员制订了一项为期 3 年的研究计划，每年对学生进行一次口腔健康检查。该研究方法属于
- A.现况调查 99.口腔预防教研室集体备课时，李老师指出老年人随着年龄的增长，口腔疾病主要
- B.群组研究 增加的是
- C.常规资料分析 A.根面龋
- D.纵向研究 B.牙髓炎
- E.现场试验- C.口干
- 《《《《B1 型题 以下提供若干组考试题，每组考试题共用在考试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问



- 题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
- (102~104 题共用备选答案)
- A.骨质疏松
 - B.疏松牙槽嵴
 - C.松软牙槽嵴
 - D.增生黏膜组织
 - E.可动黏膜组织
- 102.由于牙槽骨吸收，基托与牙槽骨不密合或固位不好，上颌义齿可向前推动，长期慢性刺激形成的组织炎症性增生，称为
- 103.由于下颌前部天然牙(牙合)力过大，造成上颌前部牙槽嵴压迫性吸收，形成移动性较大的纤维性组织，称为
- 104.由于糖尿病或妇女更年期等疾病致使机体大量脱钙，造成骨密度降低，牙槽嵴快速萎缩吸收，称为
- (105~108 题共用备选答案)
- A.4mm
 - B.2mm
 - C.1.5mm
 - D.1mm
- E.3mm
- 105.牙本质肩领高度应尽量不小于
- 106.桩核冠的根尖封闭不少于
- 107.沟固位形的深度一般为
- 108.洞固位形的深度一般不小于
- (109~112 题共用备选答案)
- A.盖嵴式桥体
 - B.悬空式桥体
 - C.船底式桥体
 - D.接触式桥体
 - E.改良盖嵴式
- 109.与牙槽嵴黏膜不接触以自洁的桥体类型是
- 110.上颌牙固定桥修复而牙槽嵴吸收较多者选择
- 111.对牙槽嵴黏膜有按摩作用的桥体类型是
- 112.可以防止食物进入龈端，自洁作用好，感觉舒适的桥体设计类型是
- (113~115 题共用备选答案)
- A.近缺牙区的倒凹区小，非倒凹区大，而远缺牙区的倒凹区大，非倒凹区小



B.近缺牙区的倒凹区大，非倒凹区小

神经内科转诊。患者诉头部疼痛 1 年余。

C.倒凹区与非倒凹区均大

口外检查见张口度 1 指；口内检查见

D.倒凹区均大，非倒凹区均小

$\frac{764|4567}{7651|24567}$ 缺失，长期戴用活动义齿。

E.倒凹区均小，非倒凹区均大

119. 对诊断最有帮助的检查是

113.I 型观测线

A.唇外形检查

114.II 型观测线

B.颞下颌关节弹响检查

115.III 型观测线

C.咀嚼肌检查

(116~118 题共用备选答案)

D.义齿检查

A.成正比关系

E.牙槽嵴检查

B.成反比关系

120. 分析产生头痛症状的原因，最可能的

C.无关系

是

D.无线性关系

A.神经性头痛

E.既成正比又成反比

B.义齿基托不密合

116. 氟化物的吸收率与胃 pH 的关系是

C.义齿人工牙排列位置不对

117. 骨氟含量实际沉淀率与年龄的关系是

D.精神问题

118. 肾的氟清除率与尿 pH 的关系是

E.义齿(牙合)位关系不正常

《《《A3/A4 型题以下提供若干个案例，每

121. 除以上症状外，可能还伴有的症状是

个案例下设若干道考试题。请根据案例所

A.咀嚼效率低下

提供的信息，在每一道考试题下面的 A、B、

B.咬颊

C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答

C.发音障碍

案。

D.食物嵌塞

(119~122 题共用题干)患者，女，75 岁。

E.唾液增多



更多医师考试资料

微信搜一搜

金英杰口腔学院

- 122.最佳的治疗方案为
 A.镇痛药
 B.调(牙合)
 C.义齿重衬
 D.增加固位体
 E.重新制作义齿
- (123~130题共用题干)患者，男，46岁。
 |6了可见大面积银汞充填，远中食物嵌塞，
 冷热诊(-)。X线片显示已行完善的根管治
 疗。
- 123.修复问诊要了解的问题，除外
 A.此牙以前的治疗情况
 B.治疗的效果如何
 C.牙体缺损的原因
 D.患者的要求
 E.为什么用银汞合金充填
- 124.为确定修复方案，要检查的主要内容，
 除外
 A.缺损情况
 B.口腔黏膜情况
 C.咬合情况
 D.牙髓治疗情况
- E.邻接接触情况
- 125.食物嵌塞的可能原因是
 A.邻接接触不良
 B.(牙合)平面与邻牙不一致
 C.(牙合)面外形不良
 D.邻间乳头萎缩
 E.包括以上各项
- 126.决定此牙修复设计的因素，除外
 A.缺损大小
 B.牙髓情况
 C.患者要求
 D.患者性别
 E.患者经济情况
- 127.如果此牙为死髓牙，牙冠缺损3/4.未
 行根管治疗，根长、粗大，牙槽骨良好。
 最佳的治疗方案为
 A.根管治疗后全冠修复
 B.根管治疗后铸造桩核加全冠修复
 C.根管治疗后银汞充填加全冠修复
 D.根管治疗后嵌体修复
 E.高嵌体修复
- 128.如果此牙需要桩冠修复，则最可能利



用的根管是 牙根长、粗大，牙槽骨轻度吸收，牙龈红

A.近中颊根管 肿，探易出血。

B.远中根管 131.在患者不愿意正畸治疗的情况下，以

C.近中舌根管 下最佳的治疗方案是

D.A+C A.拔除后可摘局部义齿修复

E.远颊根管 B.拔除后同定桥修复

129.与铸造桩核相比，纤维桩加树脂核的 C.根管治疗后桩冠修复

主要优点是 D.根管治疗后覆盖义齿修复

A.强度好 E.拔除后种植义齿修复

B.残冠应力分布好 132.如果选择桩冠修复，则根管治疗后开

C.操作简单 始桩冠修复的最早时间是

D.固位好 A.根充后 2 天

E.生物相容性好 B.根充后 3 天

130.为防止冠戴入后仍食物嵌塞，应采取 C.根充后 1 周

的措施除外 D.根充后 2 周

A.恢复正确的邻接关系 E.根充后任何时间

B.(牙合)平面与邻牙一致 133.修复开始前要做的准备下作，不必要

C.去除对颌充填式牙尖 是

D.去除该牙的(牙合)接触 A.牙周洁治

E.加深颊舌沟 B.X 线牙片

(131~135 题共用题干)患者右上中切牙扭

转近 90°角，且伴有唇侧倾斜，牙髓正常， D.与患者讲明治疗方案



- E.曲面体层片 B.拔除|8，牙周洁治剩余牙
- 134.如果选择桩核和金瓷冠修复，对此牙
牙冠的错误处理是 C.充填|8(牙合)面龋坏，牙周洁治剩余牙
- A.按照金瓷冠牙体预备的要求磨除牙冠硬
组织 D.拔除|8，牙周洁治剩余牙，手术去除左
侧下颌隆凸
- B.去除薄壁 E.充填|8(牙合)面龋坏，牙周洁治余留牙，
手术去除左侧下颌隆凸
- C.去除无基釉 137.可摘局部义齿的支持类型为
- D.齐龈磨除牙冠 A.牙支持式
- E.去除腐质 B.牙槽骨支持式
- 135.桩核切端应为金瓷冠留出的间隙为
A.1.0mm C.黏膜支持式
- B.2.0mm D.混合支持式
- C.1.5mm E.游离端支持式
- D.2.5mm 138. |8了如果设计铸造圈形卡环时，卡臂
尖应位于
- E.3.0mm A.颊面远中
- (136~138题共用题干)患者，女，69岁。
8765|567缺失，|8(牙合)面浅龋、近中舌
向倾斜、不松动，余留牙牙石II度，左侧
下颌隆凸明显、倒凹大，上颌牙基本正常。
- 136.患者在开始修复治疗前需进行的口腔
处理是 B.颊面近中
- A.拔除|8 C.远中面
- D.舌面远中
- E.舌面近中
- (139~141题共用题干)患者，男，57岁。
糖尿病病史，上颌牙列缺失，8765|45678
缺失。上颌全口义齿修复2年，下颌可摘



- 局部义齿修复 3 年余。因上颌义齿戴用不
适就诊，要求重新制作。检查见上前牙区
松软牙槽嵴，义齿固位、稳定差，下颌余
留牙舌侧见牙结石， $\overline{21}$ 松动Ⅲ度，下颌义
齿固位稳定尚可。
139. 上颌松软牙槽嵴形成的原因是
- A. 上前牙缺失后牙槽嵴自然吸收形成
 - B. 上颌义齿长期刺激所致
 - C. 下前牙较大的(牙合)力造成上前牙区牙槽
嵴压迫性吸收
 - D. 牙槽嵴吸收与软组织萎缩速度不一致造
成
 - E. 以上原因皆有可能
140. 对该患者松软牙槽嵴的处理应该是
- A. 手术切除，待伤口愈合后重新制作义齿
 - B. 用有孔托盘取模后重新制作义齿
 - C. 缓冲松软牙槽嵴相对应的旧义齿组织面
 - D. 重衬旧义齿组织面
 - E. 暂不处理
141. 患者口腔内不可能出现的情况是
- A. 唾液分泌过多
 - B. 黏膜变性
 - C. 软组织易受损伤
 - D. 黏膜容易破溃
 - E. 易感染
- (142~145 题共用题干)全国口腔健康调查
技术组专家对某省调查人员进行了调查前
培训，纠正了一些容易影响调查质量的不
足之处。
142. 根据 WHO 龋病诊断标准，下面不应
诊断为龋齿的是
- A. 病损有底部发软
 - B. 牙釉质有潜在的损害
 - C. 牙釉质上有硬的白斑
 - D. 窝沟壁软化
 - E. 着色区软化凹陷
143. 临床检查不应该计入 DMFT 的牙是
- A. 已充填有龋
 - B. 已充填无龋
 - C. 龋失牙
 - D. 桥基牙
 - E. 有继发龋
144. 经标准一致性检验不合格的检查者不
能参加调查，不合格者的 K 值在





A.0.1 以下 A.3、7、10、13 岁各一疗程，每周 1 次，

B.0.2 以下 共 4 次

C.0.3 以下 B.1~13 岁。每月 1 次

D.0.4 以下 C.1~13 岁。每 3 个月 1 次

E.0.5 以下 D.1~13 岁。每半年 1 次

145. 用牙周 CPITN 指数只检查 6 颗指数牙 E.1~13 岁。每年 1 次

的年龄应在 148. 局部涂氟操作时错误的步骤是

A.30 岁以下 A. 清洁牙面

B.20 岁以下 B. 邻面使用牙线清洁

C.18 岁以下 C. 局部涂氟时应隔湿干燥

D.15 岁以下 D. 涂后必须保持湿润 3~4 分钟

E.12 岁以下 E. 半小时内不漱口，但可以进食

(146~148 题共用题干)患儿，5 岁。口腔

健康检查时医生推荐使用局部涂氟的方法

防龋，选择的氟化液为酸性磷酸氟。

龋坏牙后推荐专业应用含氟凝胶防龋。

146. 每次使用的药量最多不超过

因多数乳牙龋坏去口腔科就诊，医师治疗

A.1.0ml

龋坏牙后推荐专业应用含氟凝胶防龋。

B.2.0ml

149. 供专业人员常用的 APF 凝胶的浓度是

C.3.0ml

A.500mg/L

D.4.0ml

B.1000 mg/L

E.5.0ml

C.5000 mg/L

147. 对于儿童，使用的频率一般为

D.12300mg/L

E.20000mg/L

150. 医师叮嘱患者下次复诊时间是



更多医师考试资料
微信搜一搜

金英杰口腔学院

A.1 周后

B.1 个月后

C.3 个月后

D.半年后

E.1 年后



金英杰口腔学院

