



口腔执业医师综合笔试历年真题汇总

1. 关于牙体缺损的描述, 错误的是
- A. 影响咀嚼、发音和美观
 - B. 牙体硬组织外形成和结构的缺损
 - C. 造成牙形态、颜色和数目异常
 - D. 影响牙髓、牙周组织健康
 - E. 影响牙邻接和咬合

正确答案: C

2. 以下关于修复体粘接力的描述, 正确的是
- A. 修复体组织面抛光提高粘接力
 - B. 粘接面积越大粘接力越强
 - C. 水门汀过稠提高粘接力
 - D. 水门汀过稀提高粘接力
 - E. 水门汀厚度越厚粘接力越强

正确答案: B

3. 对附着龈宽度描述正确的是
- A. 龈缘到膜龈联合的距离
 - B. 龈沟底到膜龈联合的距离
 - C. 龈缘至龈沟底的距离
 - D. 龈沟底至釉质牙骨质界的距离
 - E. 保障牙周健康的附着龈宽度至少是 3mm



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



正确答案：B

4. 容易早期发生肺部转移的口腔恶性肿瘤是

- A. 牙龈癌
- B. 舌癌
- C. 黏液表皮样癌
- D. 颊癌
- E. 腺样囊性癌

正确答案：E

5. 固有层有密集淋巴淋巴细胞呈带状浸润的疾病

- A. 寻常天疱疮
- B. 类天疱疮
- C. 白斑
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 扁平苔藓

正确答案：E

6. 具有应力中断作用的卡环是

- A. I 型卡环
- B. 倒钩卡环
- C. 圈型卡环
- D. 反回力卡环
- E. 对半卡环



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



正确答案：D

7. 癌变可能性最大的口腔黏膜疾病是

- A. 创伤性溃疡
- B. 黏膜下纤维性变
- C. 白斑
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 扁平苔藓

正确答案：C

8. 容易产生无基底的冠修复体边缘设计形式是

- A. 刃状
- B. 斜面
- C. 凹槽
- D. 带斜坡肩台
- E. 直角肩台

正确答案：C

9. 固定桥受力时，桥体弯曲的变形量与桥体

- A. 宽度的立方成正比
- B. 宽度的立方成反比
- C. 长度的立方成正比
- D. 长度的立方成反比



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E. 厚度的立方成正比

正确答案:C

10. 下列固定修复印模材料中, 精度最差的是

- A. 聚醚橡胶
- B. 加成型硅橡胶
- C. 藻酸盐
- D. 缩合型硅橡胶
- E. 琼脂

正确答案: C

11. 颌骨骨折最重要的治疗原则是

- A. 张口运动不受限
- B. 消除感觉异常症状
- C. 恢复正常咬合关系
- D. 局部骨骼无异常动度
- E. 恢复正常面部外形

正确答案: C

12. 儿童 4-5 岁时龋病好发于

- A. 乳磨牙的 殆面
- B. 乳磨牙的邻面
- C. 上颌乳前牙的邻面





D. 上颌乳前牙的唇面

E. 乳磨牙的颊面

正确答案: B

13. 急性化脓性腮腺炎最常见的病原菌是

A. 肺炎双球菌

B. 大肠埃希菌

C. 金黄色葡萄球菌

D. 链球菌

E. 变形杆菌

正确答案: C

14. 口腔颌面外科手术全身麻醉的特点是

A. 麻醉恢复期较长

B. 麻醉深度较浅

C. 麻醉与手术互相干扰

D. 容易维持气道畅通

E. 手术失血较少

正确答案: C

15. 牙周炎的早期 X 线表现是

A. 牙槽骨硬化

B. 牙槽嵴顶骨硬板消失



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- C. 牙根外吸收
- D. 牙槽骨楔状吸收
- E. 牙周膜影像对称性增宽

正确答案: B

16. 眶下神经阻滞, 按最口外注射法进针的方向是

- A. 下后外
- B. 上后内
- C. 上后外
- D. 上外
- E. 下后内

正确答案: C

17. 颌骨成釉细胞瘤的特征性 X 线表现是

- A. 局部呈蜂窝样改变
- B. 多房低密度病变
- C. 病变内含牙
- D. 牙根吸收
- E. 边界清楚

正确答案: B

18. 沃辛瘤的临床特点不包括

- A. 好发于中老年人
- B. 好发腮腺后下极





- C. ^{99m}Tc 核素显像呈现为冷结节
- D. 发病可能与吸烟有关
- E. 好发于男性患者

正确答案：C

19. 口腔颌面部恶性肿瘤手术的“无瘤”原则不包括

- A. 肿瘤应整体切除。不宜分块挖出
- B. 肿瘤表面有溃疡者，可采用电灼或化学药物处理
- C. 如果肿瘤未被切除，缝合时可不用更换手套
- D. 尽量避免挤压瘤体
- E. 切除手术需在正常组织内进行

正确答案 C

20. 牙菌斑生物膜最早可用显示剂显色的时间

- A. 菌斑形成 12 小时后
- B. 菌斑形成 9 天后
- C. 菌斑形成 10-30 天
- D. 菌斑形成 2 小时
- E. 获得性膜形成后数分钟

正确答案：A

21. 具有中等证据的牙周可疑致病菌的是

- A. 牙龈卟啉单胞菌



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- B. 齿垢密螺旋体
- C. 伴放线聚集杆菌
- D. 福赛坦氏菌
- E. 血链球菌

正确答案：B

22. 在妊娠期龈炎患者的龈下菌斑中，优势菌的是

- A. 具核梭杆菌
- B. 齿垢密螺旋体
- C. 牙龈卟啉单胞菌
- D. 福赛坦氏菌
- E. 中间普氏菌

正确答案：E

23. 下颌第一磨牙冠修复体正确的邻接关系是

- A. 接触区呈正方形
- B. 近中接触区在颊 1/3 与中 1/3 交界处
- C. 近中接触区在舌 1/3 与中 1/3 交界处
- D. 接触区 殆龈径大于颊舌径
- E. 远中接触区多在龈 1/3 处

正确答案：B

24. 牙周基础治疗后，牙周袋深度还在 5mm 以上，行牙周手术的时间最早在



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- A. 1 年
- B. 1 周
- C. 2 周
- D. 6 周
- E. 6 个月

正确答案:D

25. 龈下边缘全冠修复体适用于

- A. 邻接区达龈缘以上者
- B. 临床冠过长的磨牙
- C. 牙周病夹板固位体
- D. 龋坏、楔状缺损达龈下者
- E. 牙根部敏感者

正确答案:

26. 用于可摘局部义齿设计的模型观测器，主要组成部分包括

- A. 观测台、垂直测量臂、分析测量工具
- B. 观测台、分析杆、分析测量工具
- C. 观测台、观测架、分析测量工具
- D. 观测台、分析杆、成型蜡刀
- E. 观测台、观测台架、垂直测量臂

正确答案: C





27. 判断第一磨牙是否患早期牙周炎的最常用辅助检查是

- A. 曲面体层片
- B. X线片数字减影技术
- C. 插诊断丝拍摄根尖片
- D. 分角线投照的根尖片
- E. 骀翼片

正确答案:E

28. 发生首过消除的给药途径

- A. 舌下给药
- B. 静脉给药
- C. 皮下给药
- D. 吸入给药
- E. 口服给药

正确答案:E

29. 吸入性窒息急救方法哪项是正确的

- A. 及早清除口、鼻腔及咽喉部异物
- B. 将后坠的舌牵出
- C. 立即行气管切开术
- D. 吊起下坠的上颌骨块
- E. 插入通气导管使呼吸通畅

正确答案:C



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



30. 国际记录法左上第二磨牙的表示

- A. 17
- B. 27
- C. 47
- D. 15
- E. 14

正确答案：B

31. 手术控制降压麻醉是指术中收缩压降到

- A. 70
- B. 80
- C. 90
- D. 60
- E. 100

正确答案：B

32. 乳牙在口内留存最短时间：

- A. 6 个月
- B. 2-3 年
- C. 5-6 年
- D.
- E.

正确答案：C



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



33. 氯己定的副作用不包括

- A. 致畸
- B. 味苦
- C. 牙面着色
- D. 舌背着色
- E. 黏膜刺激

正确答案: A

34.

- (1) 有切支托的卡环是
- (2) 用于二型观测线的卡环

- A. 回力卡环
- B. RPA 卡环
- C. 尖牙卡环
- D. 长臂卡环
- E. 圈形卡环

正确答案:C

35.

- (1) 固有层有密集的淋巴细胞带状浸润的疾病是
- (2) 免疫荧光网状沉积出现在上皮层内的疾病是

- A. 口腔扁平苔藓
- B. 黏膜类天疱疮





- C. 口腔白斑病
- D. 寻常型天疱疮
- E. 盘状红斑狼疮

正确答案: A D

36.

- (1) 哪个牙有近中舌沟
- (2) 哪个牙有远中舌沟
- A. 上颌第一前磨牙
- B. 上颌第一磨牙
- C. 下颌第一磨牙
- D. 下颌第二磨牙
- E. 下颌第一前磨牙

正确答案: E B

- 37. 获得性膜的主要成分: 唾液糖蛋白
- 38. 种植体的周围炎: 菌斑
- 39. 嵌体的适应症: 大面积邻 殆 缺损
- 40. 种植体的成功标准不符合的: 骨吸收小于 0.5mm
- 41. 骨纤维结构不良: 磨砂玻璃
- 42. 变异链球菌的定植: 19-31 个月
- 43. 调拌碗、扩挫、口镜属于高中低危的那一种
- 44. **爆裂骨折** , 颅面分离
- 45. 取无牙合中初印模上颌哪出要多刮



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



46. 皮瓣移植后皮下发暗
47. 化脓性指头炎：指尖鱼口形
48. 张口有磨擦音的
49. 化脓性指头炎：指尖鱼口形
50. 张口有磨擦音的那个
51. 下颌骨好发骨折的几个部位
52. 透明质酸钠治疗是治疗不客服关节盘移位
53. 从牙尖交错位向前滑动 1mm 后是什么合位
54. 是治疗不客服关节盘移位
55. 扩至根尖狭窄的最后一个号称
56. 烧瓶样牙髓牙周联合病变
57. 根管漏管用断丝定位的
58. 黑色素点， 皮脂腺内容物
59. 分析性流行病学就是验证病因的
60. 它包括病例对照研究和群组研究
61. 口腔医生去山区补牙，非创伤性充填
62. 检测菌斑产酸能力的 那个英文 C 开头的
63. 牙龈指数和龈沟出血指数、CIS
64. 不属于三叉神经上颌扳机点的是
65. 上颌结节 眶下裂 鼻唇沟 颊脂垫尖 磨牙厚垫
66. 溃疡的首选治疗是曲安奈德，
67. 牙体缺损固位力不包括 吸附力
68. 全冠修复的错误的是： 烤瓷合金小于烤瓷
69. 改良的 QH： 先用菌斑染色剂
70. 牙内吸收，根尖切除，结石及菌斑英文缩写，及计分牙髓钙化
71. 有效去除菌班的刷牙方法： 改良 Bass（水平颤动拂刷）





72. 儿童刷牙方法：圆弧形刷牙（foness）
73. 口腔癌发病单位用什么计量：十万分之
74. 急性牙髓炎：无肉芽组织形成
75. 殆平面与谁平行：鼻翼耳屏线
76. Bonwill 三角：
77. 上颌与地面多少度
78. 五个选项。balkwill 角。bonwill 等边三角形。鼻翼耳屏线。矿耳平面。wilson 园什么
79. 根尖切除的长度：3mm
80. 非创伤性修复治疗
81. 窝沟封闭
82. 预防性树脂充填
83. 手足口病什么病毒
84. 由果后因，由因后果
85. 固定义齿固定桥龈端瓷的厚度是多少：
86. 1, 1.5, 2, 2.5, 3,
87. 自酸蚀优点：减少操作步骤、除去玷污层
88. 下颌纵 殆 曲线：下 6 的远颊尖最低
89. 往前上 1mm 的是牙尖交错位
90. 面神经颊支受损：鼓腮无力
91. 血管瘤的点：杨梅
92. 翼下颌间隙感染不会影响哪个：框下
93. 角质栓：慢盘
94. 牙槽骨特性错误的：只新生不吸收
95. 腺泡细胞癌：酶原颗粒
96. Albright：纤维结构不良





微信搜一搜



金英杰口腔学院

排泄管： 穿行小叶间

腭的发育：前颞突和侧鼻突

抗原呈递细胞： 朗格汉斯细胞

保持两牙位置： 越隔组

只在唇颊面： 牙骨膜组

成牙本质细胞

下 1 髓室形态： 最小

上 6 髓室顶最凹处：颈缘平行

牙釉质龋里最先脱矿： 透明层

泡沫细胞片装样聚集： 根尖周肉芽肿

上淋浆结节聚集： 肉芽肿性唇炎

成釉细胞瘤囊性变哪一型： 丛状

限制下颌过渡前伸：茎突下颌韧带

悬吊下颌并保护进入下颌孔的血管、神经的是：蝶下颌韧带

用扭转力拔出的牙：没有上 1，给了上 3

萌出：到咬合接触

感受酸的是舌侧，苦的舌根，触压觉敏感？

有黏液软骨样组织，异常增生，增生的上皮细胞浸润包膜外 1.2 毫米。诊

多形性腺瘤？多行癌变伴异常增

生？ 多行伴微浸润癌 ？ 多行伴非浸润癌？

殆 力大小排序：67854312

咽后壁、悬雍垂出现成簇小水泡诊断：疱疹性咽峡炎？

单纯疱疹？

主要病毒是： 柯萨奇病毒 A 组

治疗不对的是：多休息？多饮水？服用乙 XXXX？

能够下降软腭的肌肉：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



122. 治疗不对的是：多休息？多饮水？服用乙 XXXX？
123. 能够下降软腭的肌肉：**腭舌肌**？鄂帆提肌？鄂帆张肌
124. 排泄管是：最小的终末分支？**穿行小叶间**？又叫纹管？
125. 一个刚实习的男生，导师打电话给机会上手术台，女朋友同时约他看电影，他两个都想去，问是什么：双趋？双避？
126. 突然爆发了一个中毒事情，问村里还是县里还是市里的机构上报上级机构时间。**2 小时**？4 小时？6 小时
127. 急性牙髓炎的病理特征没有什么：牙髓充血？中性粒细胞？**肉芽组织形成**？纤维蛋白渗出？
128. 鼻唇沟变浅、上唇不正常、下唇正常、鼓腮无力，是哪个支出了问题？**颊支**
129. 单纯疱疹病毒是：**HSV1**
130. 一患者被动张口大于自然开口度、疼、偏左，问哪个肌肉出问题了：**左侧翼外肌**
131. 手动洁治器用什么消毒：**高压蒸汽**
132. 与翼下颌间隙不相通的是：眶下间隙、颞间隙？颞下间隙？咽旁间隙？
133. 用于治疗恶性肿瘤的药物是：环磷酰胺？
134. 遗传性牙发育髓腔变大的壳牙是几型？**三型**
135. 根折最理想的愈合方式：硬组织愈合
136. 牙膏中常用的洁净剂：**月桂醇硫酸钠**
- 137. 显微细小血管的外径：0.6-1mm**
138. Γ DE 缺失， Γ 6 完全萌出， Γ 45 牙根发育 1/3：舌弓保持器
139. 双侧关节内强直，两次手术间隔时间：**2 周**
140. 初戴全口，正确指导内容
- 141. 牙槽突裂植骨术最佳时间:9-11 岁，尖牙未萌，牙根形成 2/3 或 3/4**
142. 全口垂直距离过低表现为：





143. 局限型侵袭性牙周炎好发牙位
144. 取模时，上颌 殆平面与水平面夹角
145. 肯式 1 类设计要点考虑
146. 腭的发生
147. 左上下 1 正中早接触，前伸也早接触，磨正中正常，前伸早接触，调：
148. 上 1 唇侧，下 1 唇侧。上 1 腭侧。下 1 切缘
149. Ramfjord 指数
150. 恶性龋： 头颈部恶性肿瘤放疗
151. 窝沟封闭临床效果评价
152. 不宜做根管治疗的情况
153. 有个男性 患者 舌部 有 4 有个男性 患者 舌部 有 4 ✕ 3 溃疡 一个月吧
最近疼痛剧烈 下颌 下有 2 个淋巴结肿大 淋巴结右侧一个 颈中一个。肿瘤 34
大小，颈部一个 22
154. 无远处转移 n2bm0
155. 卡环体错误的是： 进入倒凹区，调卡环
156. 闭口做咬合运动整塑： 远中颊角
157. 上颌覆盖义齿： 上颌种植体 4 个

金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1. 面部疖痈病原菌：金黄色葡萄球菌
2. 根管预备器械旋转运动易折断：H 锉
3. 拔牙后出血多久是明显出血：30 分钟
4. 出现脑脊液鼻耳漏是哪个三型
5. 不能用于表面麻醉的药物普鲁卡因
6. Howship 陷窝是破骨细胞
7. 成釉细胞瘤角化珠形成棘皮瘤型
8. 舌下腺囊肿残留囊壁不致复发，口外型根治摘除舌下腺，吸净囊液
9. 9 考口腔癌的发病率：十万分之一
10. 中老年人楔缺原因刷牙方式不对，应力疲劳，
11. 上 6，3 条发育沟
12. 伴发脑脊液漏的是 LEFORTIII 型骨折
13. 梨状孔水平、牙槽突上方是 LEFORTI 型骨折
14. 降低相对有效率=对照组龋齿数-试验组龋齿数/对照组
15. 预防性树脂充填 B 型：流动树脂材料
16. 根尖周囊肿穿刺-褐色胆固醇晶体皮脂腺囊肿穿刺 - 白色凝乳状
17. 牙源性角化囊性瘤 - 黄白色角蛋白黄白液体
18. 缺牙多于两个乳磨牙、两侧缺失多于一个乳磨牙，或伴有前牙缺失-可摘式功能性保持器
19. 单侧或双侧单个乳磨牙早失 - 带环(全冠)丝圈保持器
20. 听诊吹风样杂音 - 动静脉畸形
21. 隐形唇裂 - 皮肤黏膜无裂开，肌层未联合或错位联合
22. 糖尿病血糖 8.8mmol/L 以内且无酸中毒可以拔牙
23. 三叉神经痛的性质是阵发性痛
24. 摩擦剂(去除色素沉着、菌斑碳酸钙、二氧化硅)
25. 洁净剂(降低表面张力月桂醇硫酸钠，十二烷基)





26. 胶黏剂(防止固体液体分离, 羧甲基纤维素钠)
27. 牙石覆盖 2/3 以上, 计分为 CI-S3
28. 以下哪项是接触传染: 病毒性肝炎
29. I 型单纯疱疹病毒引起: 原发性疱疹性口炎
30. 窝沟封闭酸蚀面积: 牙尖斜度 2/3

1. 牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 6 个月
- E. 1~3 个月

正确答案: E

2. 某氟病区的病人, 其症状可见牙微黄, 并有部分人牙缺损, 骨关节疼痛感, 四肢僵直, 进而行动困难。化验: 尿氟、发氟均增高, 该地氟中毒流行类型最有可能是

- A. 食源性
- B. 饮水型
- C. 饮茶型
- D. 煤烟型
- E. 空气型

正确答案: B



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



3. 氟中毒的机理主要在于

- A. 氟磷灰石被取代
- B. 破坏了钙磷代谢
- C. 碱性磷酸酶活性被抑制
- D. 钙质在骨内过多沉积
- E. 骨钙被取代

正确答案：B

4. 施舌系带矫正术的合适年龄是(C)

- A. 6 个月
- B. 1 岁
- C. 1.5 岁
- D. 2 岁后
- E. 5 岁后

正确答案：C

5. 义齿修复前对口腔软组织的处理不包括

- A. 粘膜病的治疗
- B. 粘膜瘢痕组织的修整
- C. 松软牙槽嵴的修整
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇、舌系带的修整

正确答案：D



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



6. 女, 45 岁, 幽门梗阻行持续胃肠减压半月余, 每日补 10%葡萄糖 2500ml, 5%葡萄糖盐水 1000ml, 10%氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀, 无压痛及反跳痛, 肠鸣音消失, 每日尿量 1500ml 左右, 最可能的原因是

- A. 低钾血症
- B. 低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 高钠血症
- E. 低钙血症

正确答案: A

7. 继承恒牙迟迟不萌出, 乳牙保留在恒牙列内, X 线片上未见恒牙胚, 应诊断为

- A. 恒牙迟萌
- B. 牙齿固连
- C. 乳牙滞留
- D. 异位萌出
- E. 恒牙阻生

正确答案: C

8. 裂隙的定义

- A. 龋病的好发部位
- B. 副沟相交而成凹陷部位
- C. 牙冠上不规则的凹陷部位
- D. 三条或三条以上发育沟相交处的凹陷



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E. 钙化不良而形成的凹陷

正确答案：E

9. 咀嚼效率是指

- A. 在一定时间内咀嚼磨细食物的数量
- B. 咀嚼磨细一定量食物所需的时间
- C. 在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度
- D. 在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度
- E. 咀嚼磨细食物的能力

正确答案：D

10. 髓腔增龄性变化的描述，错误的是

- A. 髓腔体积随年龄增大而不断缩小
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
- C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
- E. 随着磨耗，髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

正确答案：E

11. 纤维囊壁内出现腺体的是

- A. 含牙囊肿
- B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿
- D. 根尖周囊肿



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E. 甲状舌管囊肿

正确答案：E

12. 转移发生较迟且少见的口腔癌是

- A. 唇癌
- B. 舌癌
- C. 口底癌
- D. 颊癌
- E. 牙龈癌

正确答案：A

13. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前颌突过度生长，出生后应尽早行

- A. 咽成形术
- B. 正畸治疗
- C. 唇裂整复术
- D. 牙槽突裂植骨术
- E. 腭裂整复术

正确答案：

14. 单侧下颌角骨折的最佳固定方法是

- A. 单颌结扎
- B. 颅颌绷带固定
- C. 坚固内固定



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D. 钢丝内固定

E. 颌间结扎

正确答案：C

15. 男，50岁。左上颌后牙肿瘤1周，开口困难3天。检查： $\overline{L7}$ 残冠，叩诊(++)。

颊侧前庭沟稍肿，有深压痛，开口受限(一横指)。最可能的诊断是

A. 颊间隙感染

B. 颞下间隙感染

C. 眶下间隙感染

D. 颞间隙感染

E. 翼下颌间隙感染

正确答案：A

16. 关于正中联合部双发骨折，描述不正确的是

A. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，下颌牙弓变窄

B. 骨折线两侧肌群牵引力量相等，常无明显移位

C. 正中骨折段可因降颌肌群的作用而向下后方移位

D. 两侧骨折段受下颌舌骨肌的牵引可向中线移位

E. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，可使舌后坠甚至窒息

正确答案：

17. 急性浆液性根尖周炎的病理变化时

A. 少量中性粒细胞浸润



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- B. 根尖部牙槽骨增生
- C. 病变内间增生的鳞状上皮条索
- D. 病变中大量肉芽组织形成
- E. 根尖部牙骨质吸收

正确答案：A

18. 男，2岁。患有唇裂。行修补手术时，需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为

- A. 眶下缘中点下 1.5cm，鼻翼至耳屏连线的中点
- B. 眶下缘中点下 0.5cm，鼻尖至耳屏连线的中点
- C. 眶下缘中点下 1.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点
- D. 眶下缘中点下 0.5cm，鼻尖至睑外侧连线的中点
- E. 眶下缘中点下 0.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点

正确答案：D

19. 双侧平衡的咬合接触是指

- A. 前牙和后均没有接触
- B. 非工作侧多个后牙接触
- C. 工作侧多个后牙接触
- D. 工作侧和非工作侧均没有接触
- E. 工作侧和非工作侧均有接触

正确答案：E



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



20. 组牙功能的咬合接触是指正确答案：C

- A. 福代斯斑
- B. 牙源性囊肿
- C. 上皮剩余
- D. 侧支根管余
- E. 牙颈部牙本质敏感症

正确答案：C

20. 上皮根鞘在牙本质形成后让不断裂会引起

正确答案：E

21. 上皮根鞘残留在牙周膜中称为

正确答案：C

22. 上皮根鞘连续性破坏形成

正确答案：D

24. 变性蛋白质的主要特点是

- A. 不易被蛋白酶水解
- B. 分子量降低
- C. 溶解增加
- D. 生物学活性降低
- E. 共价键被破坏

正确答案：D





25. 以下属于医务人员个人防护

- A. 手套
- B. 口罩
- C. 防护镜
- D. 保护性工作服
- E 以上均是

正确答案：E

26. 女 36 岁开口困难伴疼痛一个月，检查：自然开口 30mm，被动开口 30mm，开口偏向患侧，诊断为

- A 关节盘附着松弛
- B 关节盘后区损伤
- C 不可复性盘前移位
- D 翼外肌功能亢进
- E 可复性盘前移位

正确答案：C

金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1. 垂下神经阻滞麻醉的方向
2. Angle II 类的特点
3. 瘢痕切除植皮术，术后植皮区拆线及更换敷料的时间
4. 很少发生骨膜成骨的颌骨病变
5. 呈微细小血管的外径
6. 无牙颌印模，初印模需多刮除的部位
7. 影响种植体达到骨结合的最重要的因素是
8. 无牙颌压槽嵴顶的黏膜属于
9. 口腔颌面外科手术控制性降压麻醉师指术中可收缩压降至
10. 舌下腺囊肿，全麻下手术治疗，暂缓手术的指征是
 - A. 囊外肌功能 π 组
 - B. 囊外肌功能痉挛
 - C. 肌筋膜痛
 - D. 可复性
 - E. 不可复性
11. 利多卡因封闭不适用于
12. 具有中等证据的牙周可疑致病菌是
13. 男，62 岁，右下后牙拟行园中邻面嵌体修复，最适合的材料
 - A. IV 型金合金
 - B. II 型金合金
 - C. III 型金合金
 - D. 镍铬合金
 - E. I 型金合金
14. 舌体后缩对全口义齿修复效果的影响
15. 口腔修复前进行的牙周手术是
16. 可摘模型观测器组成





17. 精度最差的印模材料
18. 组织蛋白酶（基因突变）
19. 首关消除主要发生在（给药/注射）
20. 上颌第一磨牙髓室顶嘴凹处约平齐
21. 翼下颌间隙感染一般不累及
22. 病例表现为血管周围上皮样细胞、淋巴细胞及浆细胞呈结节样聚集的是
23. DiGeorge 综合征的免疫学表现什么缺陷
24. 什么是劣药
25. NADPH+H 的主要功能
26. 下降软腭的肌肉
27. 苯妥英钠造成的牙龈增生，主要增生的组织是
28. 对人致病性最强的放线菌
29. McCune-Albright 综合征包含的疾病
30. Spee 曲线最低点
31. 成釉细胞瘤中，囊性边长发生于肿瘤间质内的是
32. 女，25 岁，刷牙出血，牙龈肿胀，牙松动，皮肤有瘀斑
缺乏： A. VA B. VC C. VD D. 叶酸 E. VB1
应多摄入： A. 粮谷类 B. 乳类 C. 蛋类 D. 内脏 E. 蔬菜
33. 引起细菌性痢疾的病原体是
 - A. 人格
 - B. 社会化
 - C. 自我意识
 - D. 能力
 - E. 气质
34. 直接影响活动效率，使活动顺利完成的个性心理特征称为
35. 与人的生物学素质有关的典型的稳定的心理特征称为





36. 分解后生成乙酰 CoA 物质的是
37. 慢性硬化性下颌下腺炎中，较多的浆细胞表达
38. 对诊断腺泡细胞癌有意义的是肿瘤细胞中含有
39. 通过病畜或带菌动物传染给人的病原体不包括
- A. 结核分枝杆菌
- B. 布鲁菌
- C. 梅毒螺旋体
- D. 鼠疫耶尔森菌
- E. 炭疽芽孢杆菌
40. 已发责令违反技术规范造成严重后果的医师暂停职业活动的期限
41. 恒牙力的大小顺序
42. 牙接触向前上方滑动的 1mm 能够到达牙尖交错为可颌为是
43. 上颌第一磨牙最高的髓角
44. 治疗高血压的基础药物
45. 腭的发生来自于
46. 成牙本质小分化过程中出现的变化是
- A. 细胞体积增大
- B. 占据牙乳头中心
- C. 细胞核靠近内釉上皮
- D. 细胞未发生极化
- E. 蛋白质合成的细胞器减少
47. 大多数传染病中最常见的感染表现形式
48. 根尖手术根尖切除的长度
49. 窝沟封闭临床效果评价的计算公式
50. 破伤风时最后受影响的肌群
51. 最常表现为吸气性呼吸困难的是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- 52. 甲肝主要通过什么传播
- 53. 牙膏中常用的洁净剂
- 54. 口腔癌患病率的计数单位
- 55. 为提高脓毒症血培养的阳性，抽血的最佳时间
- 56. 严重低钾血症可导致
- 57. 根尖周表肿内的胆固醇结晶来源于
- 58. 感染性休克手术治疗的时机
- 59. 常引起低渗性缺水的原因



金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1. 口腔健康教育常用方法不包括

- A. 问卷调查
- B. 小型讨论会
- C. 大众传媒
- D. 个别交谈
- E. 社区活动

正确答案：A

2. 口腔健康促进的领域中没有

- A. 制定健康的公共政策
- B. 创造支持性环境
- C. 强化社区行动
- D. 调整卫生服务方向
- E. 制定口腔保健项目预算

正确答案：E

3. 在两位数标记法的牙位纪录中，84 代表

- A. 右上第一前磨牙
- B. 右上第一乳磨牙
- C. 左下第一双尖牙
- D. 右下第一乳磨牙
- E. 左上第一前磨牙

正确答案：D



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



4. 某氟病区的病人，其症状可见牙微黄，并有部分人牙缺损，骨关节疼痛感，四肢僵直，进而行动困难。化验：尿氟、发氟均增高，该地氟中毒流行类型最有可能是

- A. 食源性
- B. 饮水型
- C. 饮茶型
- D. 空气型
- E. 煤烟型
- F. 空气型

正确答案：B

5. 氟中毒的机理主要在于

- A. 氟磷灰石被取代
- B. 破坏了钙磷代谢
- C. 碱性磷酸酶活性被抑制
- D. 钙质在骨内过多沉积
- E. 骨钙被取代

正确答案：B

6. 口角的正常位置相当于

- A. 第二前磨牙与第一磨牙之间
- B. 第一前磨牙与第二前磨牙之间
- C. 第一磨牙与第二磨牙之间



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- D. 尖牙与第一前磨牙之间
- E. 侧切牙与尖牙之间

正确答案：D

7. 施舌系带矫正术的合适年龄是

- A. A .6 个月
- B. 1 岁
- C. 1.5 岁
- D. 2 岁后
- E. 5 岁后

正确答案：C

8. 义齿修复前对口腔软组织的处理不包括

- A. 粘膜病的治疗
- B. 粘膜瘢痕组织的修整
- C. 松软牙槽嵴的修整
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇、舌系带的修整

正确答案：D

9. 女，45 岁，幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补 10%葡萄糖 2500ml，5%葡萄糖盐水 1000 ml，10%氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量 1500ml 左右，最可能的原因是

- A. 低钾血症



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- B. 低钠血症
- C. 高钠血症
- D. 低钙血症

正确答案：A

10. 继承恒牙迟迟不萌出，乳牙保留在恒牙列内，X线片上未见恒牙胚，应诊断为

- A. 恒牙迟萌
- B. 牙齿固连
- C. 乳牙滞留
- D. 异位萌出
- E. 恒牙阻生

正确答案：C

11. 裂隙的定义 E

如果是点隙是 D

- A. 龋病的好发部位
- B. 副沟相交而成凹陷部位
- C. 牙冠上不规则的凹陷部位
- D. 三条或三条以上发育沟相交处的凹陷
- E. 钙化不良而形成的凹陷

正确答案： E D

12. 咀嚼效率是指



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



- A. 在一定时间内咀嚼磨细食物的数量
- B. 咀嚼磨细一定量食物所需的时间
- C. 在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度
- D. 在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度
- E. 咀嚼磨细食物的能力

正确答案：D

13. 一次局部麻醉应用利多卡因的最大剂量是

- A. 3.3mg/kg
- B. 2.2mg/kg
- C. 4.4mg/kg
- D. 8.8mg/kg
- E. 7.7mg/kg

正确答案：C

14. 髓腔增龄性变化的描述，错误的是

- A. 髓腔体积随年龄增大而不断缩小
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
- C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
- E. 随着磨耗，髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

正确答案：E



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



15. 纤维囊壁内出现腺体的是

- A. 含牙囊肿
- B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿
- D. 根尖周囊肿
- E. 甲状舌管囊肿(有甲状腺和粘液腺组织)

正确答案： E

16. 转移发生较迟且少见的口腔癌是

- A. 唇癌 上比下早 但少见
- B. 舌癌
- C. 口底癌
- D. 颊癌
- E. 牙龈癌

正确答案： A

17. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前颌突过度生长，出生后应尽早行

- A. 咽成形术
- B. 正畸治疗
- C. 唇裂整复术
- D. 牙槽突裂植骨术
- E. 腭裂整复术

正确答案： B





18. 单侧下颌角骨折的最佳固定方法是

- A. 单颌结扎
- B. 颅颌绷带固定
- C. 坚固内固定(下颌骨骨折)
- D. 钢丝内固定
- E. 颌间结扎

正确答案: C

19. 男, 50 岁。左上颌后牙肿瘤 1 周, 开口困难 3 天。检查: 一 L7 残冠, 叩诊(++).

颊侧前庭沟稍肿, 有深压痛, 开口受限(一横指)。最可能的诊断是

- A. 颊间隙感染
- B. 颞下间隙感染
- C. 眶下间隙感染
- D. 颞间隙感染
- E. 翼下颌间隙感染

正确答案: E

20. 急性浆液性根尖周炎的病理变化时

- A. 少量中性粒细胞浸润
- B. 根尖部牙槽骨增生
- C. 病变内见增生的鳞状上皮条索
- D. 病变中大量肉芽组织形成
- E. 根尖部牙骨质吸收



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



正确答案：A

21. 男，2岁。患有唇裂。行修补手术时，需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为

- A. 眶下缘中点下 1.5cm, 鼻翼至耳屏连线的中点
- B. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻尖至耳屏连线的中点
- C. 眶下缘中点下 1.5cm, 鼻翼至睑外侧连线的中点
- D. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻尖至睑外侧连线的中点
- E. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻翼至睑外侧连线的中点

正确答案：D

22.

(1) 双侧平衡 HE 的咬合接触是指

(2) 组牙功能 HE 的咬合接触是指

- A. 前牙和后均没有接触
- B. 非工作侧多个后牙接触
- C. 工作侧多个后牙接触
- D. 工作侧和非工作侧均没有接触
- E. 工作侧和非工作侧均有接触

正确答案：E C

23.

(1) 上皮根鞘在牙本质形成后让不断裂会引起



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



(2) 上皮根鞘残留在牙周膜中称为

(3) 上皮根鞘连续性破坏形成

- A. 福代斯斑
- B. 牙源性囊肿
- C. 上皮剩余
- D. 侧支根管余
- E. 牙颈部牙本质敏感症

正确答案：ECD

24. 以下属于医务人员个人防护

- A. 手套
- B. 口罩
- C. 防护镜
- D. 保护性工作服
- E. 以上均是

正确答案：E

25. 女 36 岁 开口困难伴疼痛一个月，检查：自然开口 30mm，被动开口 30mm，开口偏向患侧，诊断为

- A 关节盘附着松弛
- B 关节盘后区损伤
- C 不可复性盘前移位
- D 翼外肌功能亢进
- E 可复性盘前移位





正确答案：C

26. 面部疖痈病原菌:金黄色葡萄球菌
27. 根管预备器械旋转运动易折断:H 锉
28. 拔牙后出血多久是明显出血: 30 分钟
29. 出现脑脊液鼻耳漏是哪个: 三型
30. 不能用于表面麻醉的药物: 普鲁卡因
31. Howship 陷窝 是破骨细胞
32. 成釉细胞瘤角化珠形成: 棘皮瘤型
33. 舌下腺囊肿残留囊壁不致复发, 口外型根治摘除舌下腺, 吸净囊液
34. 考口腔癌的发病率:十万分之一
35. 上 6, 3 条发育沟
36. 福代斯斑 - 颊部
37. 伴发脑脊液漏的是 LE FORT III 型骨折
38. 梨状孔水平、牙槽突上方是 LE FORT I 型骨折
39. 降低相对有效率=对照组龋齿数-试验组龋齿数/对照组
40. 预防性树脂充填 B 型:流动树脂材料
41. 根尖周囊肿 穿刺 - 褐色 胆固醇晶体
42. 皮脂腺囊肿 穿刺 - 白色凝乳状
43. 牙源性角化囊性瘤 - 黄白色角蛋白黄白液体
44. 缺牙多于两个乳磨牙、两侧缺失多于一个乳磨牙, 或伴有前牙缺失 - 可摘式功能性保持器
45. 单侧或双侧单个乳磨牙早失 - 带环(全冠)丝圈保持器
46. 听诊吹风样杂音 - 动静脉畸形
47. 隐形唇裂 - 皮肤黏膜无裂开, 肌层未联合或错位联合



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



48. 糖尿病血糖 8.88mmol/L 以内且无酸中毒可以拔牙
49. 三叉神经痛的性质是阵发性痛
50. 摩擦剂(去除色素沉着、菌斑、碳酸钙、二氧化硅)
51. 洁净剂(降低表面张力 月桂醇硫酸钠, 十二烷基)
52. 胶黏剂(防止固体液体分离, 羧甲基纤维素钠)
53. 牙石覆盖 2/3 以上, 计分为 CI-S 3
54. 以下哪项是接触传染:病毒性肝炎
55. I 型单纯疱疹病毒引起:原发性疱疹性口炎
56. 窝沟封闭酸蚀面积:牙尖斜度 2/3
57. 牙龈炎患者基础治疗后采取的菌斑控制措施中, 错误的是 (D)
- A. 使用电动牙刷刷牙
 - B. 一使用牙间隙刷
 - C. 用软毛牙刷刷牙
 - D. 用冲牙器清除软垢
 - E. 使用牙线
58. 主要通过接触性传播的疾病是 (B)
- A. 风疹
 - B. 疱疹
 - C. 结核
 - D. 水痘
 - E. 麻疹
59. 排在我国口腔癌之首的是 (E)
- A. 牙槽粘膜癌
 - B. 颊粘膜癌
 - C. 唇癌一
 - D. 牙龈癌





E. 舌癌

60. 复发性阿弗他溃疡常用的临床分型是 6

- A. 糜烂型、非糜烂型
- B. 轻型、重型、疱疹样型
- C. 均质型、非均质型
- D. 速发型、迟发型
- E. 假膜型、红斑型、萎缩型

61. 弹性模量与牙本质接近的桩是 (A)

- A. 纤维桩
- B. 镍铬合金铸造桩
- C. 金合金铸造桩
- D. 氧化锆桩
- E. 预成钛合金桩

62. 用于弯制磨牙卡环的钢丝直径是 (A)

- A. 0.9-1.0 mm
- B. 0.3-1.5mm
- C. 0.6-0.8mm
- D. 0.3-0.5mm
- E. 1.1-1.2mm

63.

(1) 男, 8 岁, 左下后牙表面发黑就诊。一年前右下后牙因浅龋在口腔诊所接受过充填治疗。检查: 左下 6 合面深窝沟, 可以卡住探针, 窝沟内有黑色沉着, 质地硬, 无软化, 右下 6 合面银汞充填物完好, 牙龈正常, 叩诊(一), 无松动, 右上 6 合面深窝沟, 可以插入探针, 釉质脱矿呈白垩色。

(2) 右下 6 接受龋齿充填治疗属于龋病的

A. 病因预防



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B 一级预防

C. 临床预防

D. 三级预防

E. 二级预防

正确答案： E

64.

(1) 有防止义齿翘动、摆动、旋转、下沉作用的可摘局部义齿组成部分是 (C)

(2) 可摘局部义齿起主要固位作用的部分是 (E)

(3) 可摘局部义齿主要起支持作用，传导合力至基牙的是 (A)

A 合支托.

B. 连接体

C. 间接固位体

D. 基托

E. 直接固位体

正确答案：CEA

65.

(1) 慢性牙周炎约占牙周炎患者的比例是 (E)

(2) 侧支根管以根尖 1/3 处最多，占总牙数的比例是 (D)

(3) 根分叉区有副根管的比例是 (B)

A. 80%

B. 20%-60%

C. 10%-60%



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D. 17%

E. 95%

正确答案: EDB

- 66. 首过消除的给药途径:口服
- 67. 皮瓣移植术后变暗紫色, 静脉淤血; 灰白 动脉
- 68. 初戴全口义齿 定期使用清洁剂
- 69. 种植上颌牙最少几个种植体: 4 个
- 70. 种植体周围炎: 菌斑
- 71. 口腔修复前: 冠延长术
- 72. 下6近中接触区: 颊 1/3 - 中 1/3
- 73. 种植体成功标准 - 骨吸收小于 0.5
- 74. 早起牙周炎 - 颌翼片
- 75. 就位困难 - 人工牙无关
- 76. 容易产生无基底的冠修复体边缘形式: 凹槽
- 77. 印模材料精准度差的是: 藻酸盐
- 78. 桥体弯曲的变形量与桥体长度立方成正比
- 79. 牙体缺损的描述错误的是: 颜色的改变
- 80. 溃疡的首选治疗是: 曲安奈德
- 81. 粘结力的描述正确是: 接触面积大
- 82. 附着龈的宽度正确是: 沟底到膜龈联合
- 83. 牙体缺损固位力不包括吸附力
- 84. 舌外伤止血:缝合
- 85. 颧弓骨折的主要表现: 张口受限
- 86. 下颌下间隙, 颊间隙, 咬肌间隙感染切口
- 87. 上颌窦拔牙 7mm 伤口: 邻位组织瓣



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



88. 头皮撕脱 6 小时 怎么消灭创面
89. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面
90. 牙内吸收 根管治疗难点 根管侧穿
91. 若伤后时间超过 6 小时，撕脱组织瓣损伤过重，组织已不能利用，应进行：
- A. 松解创缘，减少张力尽盘拉拢缝合
 - B. 撕脱的皮肤清创后，切削成全厚或中厚皮片再植
 - C. 立刻作血管吻合组织再植术
 - D. 采用局部皮瓣关闭创面
 - E. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面

正确答案:E

92. 透光实验阳性是什么：淋巴管大囊
93. 成釉细胞瘤 X 线见：多房型
94. 关节囊松弛 5%鱼肝油酸钠
95. 颌骨骨折最重要的治疗原则是 (C)

- A. 张闭口运动不受限
- B. 消除感觉异常症状
- C. 恢复正常咬合关系
- D. 局部骨骼无异常动度
- E. 恢复正常面部外形

96. 儿童 4-5 岁时龋病好发于 (B)

- A. 乳磨牙的(牙合)面
- B. 乳磨牙的邻面
- C. 上颌乳前牙的邻面
- D. 上颌乳前牙的唇面



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E. 乳磨牙的颊面

97. 口腔颌面外科手术全身麻醉的特点是 (C)

- A. 麻醉恢复期较长
- B. 麻醉深度较浅
- C. 麻醉与手术互相干扰
- D. 容易维持气道畅通
- E. 手术失血较少

98. 牙周炎的早期 X 线表现是 (B)

- A. 牙槽骨硬化
- B. 牙槽峰顶骨硬板消失
- C. 牙根外吸收
- D. 牙槽骨模状吸收
- E. 牙周膜影像对称性增宽

99. 眶下神经阻滞麻醉口外注射法进针的方向是 (C)

- A. 下后外
- B. 上后内
- C. 上后外
- D. 上外
- E. 下后内

100. 颌骨成釉细胞瘤的特征性 X 线表现是 (B)

- A. 局部呈蜂窝样改变
- B. 多房低密度病变
- C. 病变内含牙
- D. 牙根吸收
- E. 边界清楚

101. 沃辛瘤的临床特点不包括 (C)





- A. 好发于中老年人
- B. 好发于腮腺后下极
- C. 99MTC 核素显像早现为冷结节。
- D. 发病可能与吸烟有关
- E. 好发于男性患者
102. 口腔颌面部恶性肿瘤手术的“无瘤”原则不包括 (C)
- A. 肿瘤应整体切除，不宜分块挖出
- B. 肿瘤表面有溃疡者，可采用电灼后或化学药物处理
- C. 如肿瘤未被切坡，缝合时可不用更换手套
- D. 尽且避免挤压瘤体、
- E. 切除手术需在正常组织内进行
103. 牙菌斑生物膜最早可用显示剂显色的时间 (A)
- A. 菌斑形成 12 小时后
- B. 菌斑形成 9 天后
- C. 菌斑形成 10-30 天
- D. 菌斑形成 2 小时
- E. 获得性膜形成数分钟
104. 具有中等证据的牙周可疑致病菌的是 6
- A. 牙龈叶琳单细胞
- B. 齿垢密螺旋体
- C. 伴放线聚集杆菌?
- D. 福赛坦氏菌
- E. 血链球菌
105. 在妊娠期龈炎患者的龈下菌斑中，优势菌的是 (E)
- A. 聚核梭杆菌
- B. 齿垢密螺旋体





- C. 牙龈叶琳单细胞
- D. 福赛坦氏菌
- E. 中间普氏菌

106. 癌变可能性最大的口腔黏膜疾病是 (C)

- A. 创伤性溃疡
- B. 黏膜下纤维性变
- C. 白斑
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 扁平苔鲜

107. 关于牙体缺损的描述, 错误的是 (B)

- A. 影响咀嚼、发音和美观
- B. 造成牙形态、颜色和数目异常
- C. 影响牙邻接和咬合
- D. 影响牙髓、牙周组织健康
- E. 牙体硬组织外形和结构的缺损

108. 以下关于修复体粘接力的描述, 正确的是 (B)

- A 修复体组织面抛光提高粘接力
- B 粘接面积越大粘接力越强
- C 水门汀过稠提高粘接力
- D 水门汀过稀提高粘接力
- E 水门汀厚度越厚粘接力越强

109. 下列固定修复印模材料中, 精度最差的是 (C)

- A. 聚醚橡胶
- B. 加成型硅橡胶
- C. 藻酸盐
- D. 缩聚型硅橡胶





E. 琼脂

110. 具有应力中断作用的卡环是 (D)

A. I 型卡环

B. 倒钩卡环

C. 圈型卡环

D. 反回力卡

E. 对半卡环

111.

(1) 有切支托的卡环是 (C)

(2) 婆里于二型观测线的卡环是 (A)

A. 回力卡环

B. RPA 卡环

C. 尖牙卡环

D. 长臂卡环

E. 圈行卡环

112. 用于可摘局部义齿设计的模星观测器, 主要组成部分包括 (B)

A 观测台、垂直测量臂、分析测量工具

B 观测台、观测架、分析测量工具

C 观测台、分析杆、成型蜡刀

D 观测台、观测台架、垂直测量臂

113. 判断第一磨牙是否为早期牙周炎的最常用辅助检查是 (E)

A 曲面体层面

B 线片数字减影技术

C 插诊断丝拍摄根尖片

D 分角线投照的根尖片

E he 翼片



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



114.

- (1) 固有层由密集的淋巴细胞带状浸润的疾病是 (A)
- (2) 免疫荧光检查时，病变上皮细胞之间呈现网状的荧光图形，提示为 (D)
- A. 口腔扁平苔藓
 - B. 黏膜类天疱疮
 - C. 口腔白斑病
 - D. 寻常型天疱疮
 - E. 盘状红斑狼疮

115. 女 21 岁近日来全身乏力有低热牙龈极易出血，检查口腔卫生尚可少量牙石
牙龈明显肿胀，龈乳头呈线带状，颜色苍白易出血

明确诊断首要的辅助检查是：血液检查

该病最可能的诊断是：白血病

116. 根折最理想的愈合方式：硬组织愈合

117. 遗传性牙髓腔变大的壳状牙 III 型



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院