

# 主管护师备考测评第三天

## 答案与解析（内科三）

1、答案：C

解析：考察慢性呼衰的临床表现。呼吸困难；发绀；精神-神经症状：慢性呼吸衰竭伴 CO<sub>2</sub> 潴留时，随 PaCO<sub>2</sub> 升高可表现为先兴奋后抑制现象；循环系统：CO<sub>2</sub> 潴留使外周体表静脉充盈、皮肤充血、温暖多汗、血压升高、心排出量增多而致脉搏洪大；多数病人有心率加快；因脑血管扩张产生搏动性头痛；消化和泌尿系统表现：损害肝、肾功能，部分病人可引起应激性溃疡而发生上消化道出血。

2、答案：D

解析：呼吸衰竭治疗的基本原则是在保持呼吸道通畅的前提下，迅速改善缺氧、改善通气，纠正酸碱失衡和代谢紊乱，积极治疗原发病，消除诱因，加强一般治疗和其他重要脏器功能的监测与支持，维护心、脑、肾等重要脏器的功能，预防和治疗并发症。

3、答案：E

解析：自发性气胸病情的轻重与气胸发生的缓急、肺萎缩程度、肺部基础病变及有无并发症有关。

4、答案：A

解析：自发性气胸典型的症状是胸痛、干咳和呼吸困难。

5、答案：C

解析：手术治疗：慢性气胸（病程超过 3 个月）、反复发作的气胸和肺大泡应考虑手术治疗。

6、答案：B

解析：单纯性气胸少量积气（肺萎陷小于 20%）可继续观察，不必抽气，一般气体可自行吸收（每日吸收量约为气胸量的 1.25%）。

7、答案：D

解析：一般认为 I 期、II 期和部分 III 期非小细胞肺癌病人首选手术，术后视情况进行放疗及化疗。

8、答案：B

解析：腺癌：女性多见，占肺癌的 1/4，多为周围型，出现症状相对较晚，恶性度介于鳞癌与小细胞癌之间，对化疗、放疗敏感性较差。。

9、答案：B

解析：中央型肺癌：指发生在段支气管以上至主支气管的癌肿，约占肺癌的 3/4，多为鳞状上皮癌和小细胞未分化癌。

10、答案：C

解析：Horner 综合征，由于颈交感神经受压引起，多见于肺尖癌。表现为患侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，球结膜充血及额部少汗等。

11、答案：A

解析：约 3/4 支气管肺癌病人有咳嗽，常为阵发性刺激性干咳或少量黏痰，当肿瘤阻塞支气管引起管腔狭窄时，咳嗽加重，多为持续性，且呈高音调金属音。继发感染时痰量增多，呈黏液脓性。

12、答案：A

解析：该题考查原发性支气管肺癌的临床表现。原发性支气管肺癌的临床表现主要包括呼吸系统症状、全身症状、癌肿压迫和转移的症状等，其中咳嗽是最常见的早期症状，常以阵发性刺激性呛咳为首发症状。故 A 选项正确。

13、答案：A

解析：抗菌和痰液引流：这是肺脓肿的关键性治疗。可选用青霉素、林可霉素、甲硝唑等敏感药物。

14、答案：D

解析：杀菌剂有异烟肼、利福平、链霉素和吡嗪酰胺；抑菌剂有对氨基水杨酸、乙胺丁醇、氨硫脲、卡那霉素等。

15、答案：E

解析：肺结核的起病方式有低热、盗汗、乏力、食欲不振、体重下降等。呼吸系统症状为咳嗽，干咳为主、咯血、胸痛及呼吸困难结核性胸膜炎。女性病人可有月经失调、闭经等功能紊乱症状。

16、答案：C

解析：短程化疗：指联合用两种或两种以上杀菌剂，总疗程为 6~9 个月。

17、答案：D

解析：军团菌肺炎治疗首选红霉素，每天 1~2g，分 4 次口服，重症以静脉给药，用药 2~3 周。

18、答案：B

解析：支原体肺炎患者治疗首选大环内脂类抗生素，如红霉素、阿奇霉素。红霉素静滴速度不宜过快，浓度不宜过高，以免引起疼痛及静脉炎。

19、答案：D

解析：对青霉素过敏者，可用红霉素、头孢菌素类抗生素。必要时根据痰培养和药物过敏试验，选择有效抗生素。

20、答案：B

解析：肺炎支原体肺炎起病缓慢，有咽痛、咳嗽、畏寒、发热、头痛、乏力、肌痛等症状。咳嗽逐渐加剧，呈阵发性刺激性呛咳，咳黏液痰，偶有血丝。