

初级备考测评第十天答案与解析

妇科

1. 答案: D

解析: 妊娠 18~20 周经孕妇腹部可听到胎儿心音, 呈双音, 似钟表“滴答”声。正常胎心音应为每分钟 120~160 次, 超过 160 次应当警惕缺氧等, 低于 120 次更危险, 因为如果胎儿缺氧, 先是心跳加快, 后慢慢变慢, 所以胎心监护很重要。可见, 本题的正确答案是 D。

2. 答案: A

解析: 黏膜下肌瘤患者的黏膜表面经常溃烂、坏死, 导致慢性子宫内膜炎而引起淋漓不断出血, 最易发生阴道多量出血及肌瘤坏死; 当黏膜下肌瘤发生溃疡、感染、出血、坏死时, 则产生血性白带或脓臭性白带, 量可很多。故本题选 A。

3. 答案: B

解析: 内胚窦瘤多见于儿童及青少年, C 是正确答案。黏液性囊腺瘤多发生于生育年龄, 故 A 错误。颗粒细胞瘤 45~53 岁为发病高峰, 故 C 错误。浆液性囊腺瘤常见于 30~40 岁病人, 故 D 错误。纤维瘤多见于中老年妇女, 因此 E 错误。

4. 答案: D

解析: 最常见的子宫移位是子宫后移位, 此时子宫的纵轴与阴道纵轴相一致, 再受增加腹压的影响, 子宫便沿阴道下降, 宫颈外口达坐骨棘水平以下, 甚至子宫全部脱出于阴道口外, 称为子宫脱垂。故本题选 D。

5. 答案: D

解析: 子宫脱垂为子宫沿阴道向下移位, 根据脱垂的程度可分为 3 度, 其中 II 度重型的临床表现是宫颈与部分宫体以及阴道前壁大部或全部均翻脱出阴道口外。故本题选 D。

6. 答案: E

解析: 具有生长功能的子宫内膜出现在子宫腔以外的身体其他部位时称为子宫内膜异位症。异位子宫内膜可出现在身体不同部位, 但绝大多数位于盆腔内的器官, 如卵巢, 宫骶韧带, 子宫下部后壁浆膜面以及覆盖直肠子宫陷凹, 其中以侵犯卵巢者最常见, 约占 80%。故本题选 E。

7. 答案: B

解析：子宫内膜不规则脱落是由于下丘脑-垂体-卵巢轴调节功能紊乱引起黄体萎缩不全，内膜持续受孕激素影响，以致不能如期完整脱落。故排除 A、C、D、E 答案，选 B。

8. 答案：B

解析：产后 1 周后宫颈内口关闭，宫颈管形成，很难通过 1 指，产后 4 周宫颈完全恢复至正常状态。

9. 答案：C

解析：宫颈癌的临床表现有阴道出血，最早出现，性交后或双合诊后有少量出血或阴道排液增多者，即接触性出血，尤其在绝经前后少量断续不规则，晚期流血增多，甚至因较大血管被侵蚀而引起致命的大出血。故本题选 C。

10. 答案：A

解析：其确切的发病因素尚不清楚，一般认为其发生和生长与雌激素长期刺激有关，因此 A 是正确答案。与饮食、高血压、肥胖、婚育时间、环境等无必然联系，因此 B、C、D、E 错误。

11. 答案：C

解析：临床将妊娠分为 3 个周期：妊娠 12 周末以前称为早期妊娠；第 13~28 周末称为中期妊娠；第 28 周及以后称为晚期妊娠。可见，本题选 C。

12. 答案：B

解析：一般正常胎盘附着于子宫体部的前壁、后壁或侧壁。妊娠 28 周后，胎盘附着于子宫下段，甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口，成为前置胎盘。因此 ACE 不对，胎盘附着于子宫底部也属于正常。故选 B

13. 答案：B

解析：前后径为耻骨联合上缘至骶岬前缘中点距离，又称骶耻内径，平均长约 11cm，B 正确。

14. 答案：D

解析：宫缩进宫腔内压力增加，宫腔内压力增到一定程度时胎膜破裂，称破膜。多发生在宫口近开全时。正常羊水清，色淡黄，有时混有少量白色脂肪颗粒（胎脂）。因此，本题选 D。

15. 答案：C

解析：胎头下降过程中，遇到盆壁及盆底阻力时，胎头即发生俯屈，使下颏接近前胸，由原来的枕额径变为枕下前凶径，以最小径线适应产道继续下降。因此，本题选 C。

16. 答案：C

解析：产褥期指从胎盘娩出至产妇全身器官（除乳房外）恢复到非孕时状态的一段时间，一般为 6 周。产褥期以生殖器官和乳房变化最明显。前者为复旧，而后者在妊娠变化的基础上进一步发展为泌乳阶段。可见，本题选 C。

17. 答案：B

解析：葡萄胎有以下三个特点：①绒毛因间质高度水肿而增大；②绒毛间质内血管消失，或见少量无功能的毛细血管，内无红细胞；③滋养层细胞有不同程度增生，增生的细胞包括合体细胞滋养层细胞和细胞滋养层细胞，两者以不同比例混合存在，并有轻度异型性。滋养层细胞增生为葡萄胎的最重要特征。

18. 答案：B

解析：小阴唇与阴道粘连多见儿童畸形，A 错误，真菌性阴道炎患者，外阴及阴道可见白色膜状物，因此 B 是正确答案。滴虫性阴道可见阴道黏膜充血，严重者有散在出血斑点，因此 C 错误，外阴阴道假丝酵母菌病可见豆腐渣样分泌物，所以 D 错误。老年性阴道炎一般会有不规则溃疡，因此 E 错误。

19. 答案：A

解析：念珠菌性阴道炎典型白带呈豆腐渣样或干酪样。故本题选 A。老年性阴道炎白带特点呈黄色水样或是脓性，偶尔有血性分泌物，故排除了 B、C、E。滴虫性阴道炎白带特点呈泡沫状，故不选 D。

20. 答案：A

解析：乳头皲裂是哺乳期常见病之一，轻者仅乳头表面出现裂口，甚者局部渗液渗血，日久不愈反复发作易形成小溃疡，处理不当又极易引起乳痈。哺喂不正确，婴儿吸吮姿势不正确，未把乳头及大部分乳晕送入婴儿口中是造成乳头痛和乳头裂口的主要原因。B、C、D、E 不是造成乳头皲裂的原因，故不选。