

妇科护理学

题号	预测题干	预测答案	星级
妇科	1 绝经后阴道流血	子宫内膜癌	☆☆☆
	2 接触性出血	宫颈癌	☆☆☆
护理学	3 (妊娠期) 高血压基本病理生理改变	全身小动脉痉挛	☆☆☆
	4 不同类型流产表现及处理	主要看宫口有没有闭、妊娠产物是否已经完全排出	☆☆☆
	5 产后出血最常见的原因	子宫收缩乏力(最常见)、胎盘胎膜残留、软产道损伤、凝血功能障碍	☆☆☆
	6 女性外生殖器	阴蒂、阴阜、小阴唇、大阴唇、阴道前庭	☆☆☆
	7 女性青春期开始的标志	月经初潮	☆☆☆
	8 胎儿脐静脉及脐动脉	胎儿脐静脉 1 条及脐动脉 2 条	☆☆☆
	9 妊娠最早的临床表现	停经	☆☆☆
	10 孕妇自我监测胎儿宫内情况方法	胎动计数	☆☆☆
	11 产前检查	妊娠 6~13+6 周、14~19+6 周、20~23+6 周、24~27+6 周、28~31+6 周、32~36+6 周各一次, 37~41 周则每周检查 1 次	☆☆☆
	12 预产期推算	末次月经第 1 日起, 月份减 3 或加 9, 日期加 7. 如为阴历, 月份减 3 或加 9, 但日期加 15	☆☆☆
	13 临产后主要产力	子宫收缩力	☆☆☆
	14 产程分期	第一产程(宫颈扩张期)从规律宫缩到宫口开全, 初产妇需 11~12 小时, 经产妇需 6~8h; 第二产程(胎儿娩出期)从宫颈口开全到胎儿娩出, 初产妇需 1~2 小时, 经产妇需几分钟至 1 小时; 第三产程(胎盘娩出期)从胎儿娩出到胎盘娩出, 需 5~15 分钟, 一般不超过 30 分钟。	☆☆☆

15	新生儿娩出后处理	首先清理呼吸道，防止窒息	☆☆☆
16	新生儿 Apgar 评分五项依据时	心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射	☆☆☆
17	乳汁变化	初乳指产后 7 天乳汁，浑浊淡黄色液体，含丰富蛋白质；产后 7 天，乳房开始分泌过渡乳，蛋白质含量逐渐减少；产后 14 天以后乳房开始分泌成熟乳，呈白色	☆☆
18	新生儿为什么发生溢奶？	新生儿胃部呈水平状，且贲门括约肌发育不全，新生儿在喂奶后常出现溢奶现象	☆☆☆
19	目前治疗中、重度妊高征的首选解痉药物	硫酸镁	☆☆☆
20	前置胎盘主要临床特点	无诱因、无痛性反复阴道流血	☆☆☆
21	诊断前置胎盘最可靠而安全的方法是	B 超检查	☆☆☆
22	处理胎盘早剥原则	纠正休克、及时终止妊娠	☆☆☆
23	患心脏病孕妇最危险的时期	妊娠 32~34 周、分娩期及产后最初 3 天内是患有心脏病孕妇最危险的时期	☆☆☆
24	不协调性子宫收缩乏力处 理原则	恢复子宫收缩的协调性，酌情给镇静剂，禁用缩宫素	☆☆☆
25	滴虫性阴道炎分泌物表现	稀薄泡沫状白带增多及外阴瘙痒	☆☆☆
26	外阴阴道假丝酵母菌性阴道炎分泌物表现	豆渣样，黏膜红肿	☆☆☆
27	宫颈炎治疗原则	急性宫颈炎抗生素治疗，同时禁止性生活；慢性宫颈炎治疗以物理治疗为主	☆☆☆
28	尖锐湿疣致病菌	人乳头瘤病毒感染引起性传播疾病	☆☆
29	确诊功血主要检查方法	诊断性刮宫	☆☆☆
30	确定有无排卵最简单方法	基础体温测定	☆☆☆
31	侵蚀性葡萄胎治疗原则	主要以化疗为主，手术和放疗为辅	☆☆☆
32	确诊宫颈癌最可靠方法	宫颈和宫颈管活组织检查	☆☆☆
33	筛查宫颈癌常用方法	宫颈脱落细胞学检查	☆☆☆
34	子宫内膜异位症典型症状	继发性渐进性痛经	☆☆☆
35	良性卵巢肿瘤最常见的并发症	蒂扭转	☆☆☆
36	子宫脱垂最主要发病因素	分娩损伤	☆☆☆
37	避孕药物副作用	类早孕反应、不规则阴道流血、月经过少或停经、色素沉着、体重增加	☆☆
38	宫内节育器放置时间	月经干净后 3~7 天；产后 3 个月，剖宫产术后半年；人流术后	☆☆
39	晚期产后出血原因	胎盘、胎膜残留是晚期产后出血最常见原因	☆☆☆
40	糖尿病孕妇治疗	不宜口服糖尿病、胰岛素是主要治疗药物	☆☆