

- 6 1. 中央性颌骨骨髓炎多在急性化脓性根尖周炎及根尖周脓肿的基础上发生
- 6 2. 边缘性颌骨骨髓炎常在颌周间隙感染基础上发生下颌骨为好发部位其中又以升支及下颌角部居多
- 6 3. 慢性中央性颌骨骨髓炎的病灶清除应以摘除死骨为主
- 6 4. 慢性中央性颌骨骨髓炎病变比较局限者死骨与周围组织分离的时间在发病后 3 ~ 4 周
- 6 5. 慢性边缘性颌骨骨髓炎在已明确骨质破坏的部位和范围一般在病程 2 ~ 4 周后即可施行病灶清除术
- 6 6. 新生儿颌骨骨髓炎主要发生在上颌骨
- 6 7. 新生儿颌骨骨髓炎的感染来源多为血源性但亦可因牙龈损伤或母亲患化脓性乳腺炎哺乳时病原菌侵入而引起
- 6 8. 如果已经确定为放射性颌骨坏死不必等待死骨完全分离应在健康骨质范围内施行死骨切除术可收到预防病变扩大的效果
- 6 9. 化脓性淋巴结炎与结核性淋巴结炎形成脓肿后还可借抽吸出的脓液进行鉴别诊断冷脓肿的脓液稀薄污浊暗灰色似米汤夹杂有干酪样坏死物
- 7 0. 脑挫裂伤是脑组织的实质性损伤意识障碍取决于脑损伤的程度神经系统体征取决于损伤部位如出现昏迷——清醒——再昏迷的情况则提示有颅内血肿的可能性
- 7 1. 颌面部外伤患者包扎的作用有:①压迫止血②暂时性固定减少骨折段活动防止进一步移位③保护并缩小创口减少污染或唾液外流
- 7 2. 在运送口腔颌面部创伤患者时应注意保持呼吸道通畅昏迷患者可采用俯卧位额部垫高使口鼻悬空有利于唾液外流和防止舌后坠
- 7 3. 唇、舌、耳、鼻及眼睑的断裂伤如离体组织尚完整伤后时间不超过 6 小时应尽量设法缝回原处
- 7 4. 颊部贯通伤的治疗原则是尽量关闭创口和消灭创面
- 7 5. 牙列的移位或咬合关系错乱是诊断颌骨骨折的重要体征
- 7 6. 恢复正常的咬合关系是治疗颌骨骨折的重要标准
- 7 7. 判断窒息最有力的依据是锁骨上窝、胸骨上窝及肋间隙明显凹陷

- 78.填塞止血法可用于开放性和洞穿性创口、鼻腔出血
- 79.牙槽突骨折的特征性表现是:摇动损伤区某一牙时可见邻近数牙及骨折片随之移动
- 80.下颌骨发生骨折的部位常与解剖结构有关如正中联合部、颞孔区、下颌角区、髁突颈部均属于薄弱区因此成为骨折好发部位
- 81.影响下颌骨骨折后骨折段移位的因素有:骨折的部位、外力的大小和方向、骨折线方向和倾斜度、骨折段是否有牙以及附着肌肉的牵拉作用等其中各咀嚼肌的牵拉作用又是主要因素
- 82.L e f o r t I型骨折的骨折线从犁状孔水平、牙槽突上方向两侧水平延伸至上颌翼突缝
- 83.L e f o r t II型骨折的骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底、颧上颌缝再沿上颌骨侧壁至翼突
- 84.L e F o r t III型骨折多伴有颅底骨折或颅脑损伤出现耳、鼻出血或脑脊液漏
- 85.上颌骨上无强大的咀嚼肌附着故骨折块多随外力的方向而发生移位或因重力而下垂一般常出现向后下方向移位
- 86.大多数髁突骨折可采用保守治疗即在手法复位并恢复咬合关系后行颌间固定
- 87.颧骨及颧弓骨折诊断中X 线片检查常用鼻颧位(华氏位)和颧弓切线位
- 88.癌与肉瘤的根本区别在于组织学来源
- 89.癌是指来自上皮组织的恶性肿瘤
- 90.肉瘤是指来源于间叶组织的恶性肿瘤
- 91.皮脂腺囊肿囊内为白色凝乳状皮脂腺分泌物
- 92.皮样囊肿的诊断除根据病史及临床表现外穿刺检查可抽出乳白色豆渣样分泌物有时大体标本可见毛发在镜下可见有脱落的上皮细胞、毛囊和皮脂腺等结构
- 93.牙源性颌骨囊肿根据其来源不同可分为根端囊肿、始基囊肿、含牙囊肿
- 94.始基囊肿发生于成釉器发育的早期阶段釉质和牙本质形成之前在炎症或损伤刺激后成釉器的星网状层发生变性并有液体渗出蓄积其中而形成囊肿
- 95.含牙囊肿又称滤泡囊肿发生于牙冠或牙根形成之后在缩余釉上皮与牙冠之间出现液体渗出而形成
- 96.色素痣来源于表皮基底层产生黑色素的色素细胞

- 9 7.牙龈瘤来源于牙周膜及颌骨牙槽突的结缔组织
- 9 8.成釉细胞瘤多发生于青壮年以下颌体及下颌角部为常见
- 9 9.我国口腔颌面部鳞状细胞癌多发生于 4 0 ~ 6 0 岁的成人男性多于女性部位以舌、颊、牙龈、腭、上颌窦为常见
- 1 0 0.急性化脓性腮腺炎的病原菌主要是金黄色葡萄球菌
- 1 0 1.复发性腮腺炎具有自愈性以增强抵抗力、防止继发感染减少发作为原则
- 1 0 2.慢性阻塞性腮腺炎造影片的典型特点是导管腊肠样改变
- 1 0 3.舍格伦综合征患者的主要症状有:眼干、口干、唾液腺及泪腺肿大、类风湿关节炎等结缔组织疾病
- 1 0 4.舌下腺囊肿最常见于青少年临床上可分为:单纯型、口外型 and 哑铃型
- 1 0 5.外渗性黏液囊肿占黏液囊肿的 8 0 %以上组织学表现为黏液性肉芽肿或充满黏液的假囊无上皮衬里
- 1 0 6.多形性腺瘤又名混合瘤是唾液腺肿瘤中最常见者
- 1 0 7.多形性腺瘤由肿瘤性上皮组织和黏液样或软骨样间质所组成根据其成分比例可分为细胞丰富型及间质丰富型
- 1 0 8.腺样囊性癌的临床病理特点包括:①肿瘤易沿神经扩散②肿瘤浸润性极强③肿瘤易侵入血管造成血行性转移转移率高达 4 0 %转移部位以肺为最多见④颈淋巴结转移率很低⑤肿瘤细胞沿着骨髓腔浸润
- 1 0 9.黏液表皮样癌是唾液恶性肿瘤中最常见者
- 1 1 0.颞下颌关节脱位按性质可分为急性脱位、复发性脱位和陈旧性脱位
- 1 1 1.炎症、关节损伤是颞下颌关节内强直的常见原因
- 1 1 2.X 线检查有助于诊断并鉴别纤维性强直和骨性强直
- 1 1 3.三叉神经痛是指在三叉神经分布区域内出现阵发性电击样剧烈疼痛历时数秒至数分钟间歇期无症状疼痛可由于口腔或颜面的任何刺激引起以中老年人多见多数为单侧性
- 1 1 4.卡马西平是目前治疗三叉神经痛的首选药物
- 1 1 5.贝尔麻痹系指临床上不能肯定病因的不伴有其他体征或症状的单纯性周围面神经麻痹

- 1 1 6.额纹消失不能皱眉是鉴别中枢性面瘫与周围性面瘫的主要依据
- 1 1 7.一般认为单侧唇裂整复术最合适的年龄为 3~6 个月体重达 5~6 k g 以上
- 1 1 8.双侧唇裂整复术比单侧整复术复杂术中出血相对较多手术时间也较长一般宜 6 ~ 1 2 个月时施行手术
- 1 1 9.腭裂修复多选择在患儿 1 2~1 8 个月时进行
- 1 2 0.上颌前部片可显示上颌前部的全貌包括前牙及牙槽突、切牙孔、鼻腔底、腭中缝、上颌窦、鼻泪管等
- 1 2 1.上颌后部片可显示被检查侧上颌骨后部的影像包括第一前磨牙至第二磨牙及其牙槽突和该侧上颌窦底部用于观察一侧上颌后部骨质改变
- 1 2 2.下颌骨侧斜位片又称为下颌骨侧位片为临床最常用的检查方法之一用于检查下颌骨体部、升支及髁突的病变
- 1 2 3.上颌骨骨折 X 线检查首选华特位
- 1 2 4.下颌骨发育不足一般是 A n g l e II 类
- 1 2 5.下颌发育过度、上颌发育不全一般是 A n g l e III 类
- 1 2 6.长面畸形一般是 A n g l e II 类
- 1 2 7.根据骨切开后的愈合过程及其生物力学特点术后的追踪观察至少应持续 6 个月
- 1 2 8.游离皮片移植时皮片越薄则越容易成活
- 1 2 9.各种皮片移植中抗感染力最强的是刃厚皮片
- 1 3 0.临床上为了增长或缩短某一组织的长度和宽度而常用“V”“Y”皮瓣成形术也是属于滑行皮瓣的一种
- 1 3 1.皮瓣移植的注意事项中需断蒂者一般在术后 1 4~2 1 天进行
- 1 3 2.游离皮瓣术后要保持室温在 2 5℃左右以防血管痉挛
- 1 3 3.术后 7 2 小时内是游离皮瓣最容易发生血管危象的时候
- 1 3 4.Y-V 成形术可以增加皮肤宽度缩小长度
- 1 3 5.轴形皮瓣的长宽比例为在血管长轴范围内不受长宽比例限制

