

1. 门静脉高压症的始动因素是

- A. 脾功能亢进
- B. 门静脉血流阻力增加
- C. 交通支扩张
- D. 肠系膜上、下静脉血液瘀滞
- E. 脾静脉血液瘀滞

2. 体内来自母体的抗体数量逐渐减少消失的时期应该是

- A. 胎儿期
- B. 新生儿期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

3. 关于胆囊结石的说法错误的是

- A. 体位改变可诱发胆绞痛
- B. 胆囊积液可呈无色透明
- C. 胆囊结石一般很少引起黄疸
- D. 胆绞痛可向右肩胛部和背部放射
- E. 大多数患者呈现典型的胆绞痛症状

4. 某幼儿园一男孩体检结果显示:身高 114cm, 体重 20kg, 尚未开始换牙, 左手腕部 X 线骨片示头状骨、钩骨、下桡骨骺、三角骨、月骨、大小多角骨、舟骨骨化中心已出现。其最可能的年龄是

- A. 8 岁
- B. 7 岁
- C. 6 岁
- D. 5 岁
- E. 4 岁

5. 对胆总管远端结石诊断最有价值的检查是

- A. X 线平片
- B. 内镜超声
- C. 经皮肝穿刺胆管造影
- D. 内镜逆行胰胆管造影
- E. 腹部超声

6. 下列指标中, 主要反映慢性长期营养不良的是

- A. 皮下脂肪层变薄
- B. 消瘦
- C. 血浆白蛋白水平降低
- D. 生长迟缓
- E. 体重低下

金英杰医学

JINGYINGJIE.COM



7. 女，45岁。胆囊结石病史12年。今日中午饱餐后突发上腹部剧痛10小时，向腰背部放射，呕吐后无缓解，弯腰抱膝位可减轻。查体：T37.7°C，上腹部腹肌紧张，压痛、反跳痛阳性。最具有诊断意义的检查是

- A. 血清淀粉酶
- B. B超
- C. 血清脂肪酶
- D. 立位腹部X线平片
- E. 胃镜

8. 维生素D缺乏性手足搐搦症患儿，突然出现面色青紫、呼吸困难，立即处置为

- A. 肌内注射安定
- B. 迅速静注葡萄糖酸钙
- C. 以10%水合氯醛保留灌肠
- D. 迅速补充维生素D
- E. 立即将舌头拉出口外

9. 关于克罗恩病的治疗，叙述正确的是

- A. 轻度患者首选糖皮质激素
- B. 中、重度患者首选免疫抑制
- C. 活动期首选柳氮磺吡啶
- D. 治疗目标为黏膜愈合
- E. 手术可获根治

10. 出生后即有且终生存在的神经反射是

- A. 拥抱反射
- B. 膝腱反射
- C. 握持反射
- D. 觅食反射
- E. 腹壁反射

11. COPD特征性的病理生理变化是持续气流受限（不完全可逆的气流受限）引起

- A. 生理无效腔气量减少
- B. 肺通气功能障碍
- C. 通气/血流比例降低
- D. 弥散面积增大
- E. 肺内功能性分流减少

12. 小儿结核病中最严重的类型是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 结核性心包炎
- D. 原发型肺结核
- E. 急性粟粒性肺结核



13. 男，19岁。支气管哮喘急性发作急诊入院。患者不宜进行下列哪项检查

- A. 动脉血气分析
- B. 痰嗜酸性粒细胞计数
- C. 支气管激发试验
- D. 支气管舒张试验
- E. X线胸片

14. 小儿胰酶最先出现的是

- A. 胰蛋白酶
- B. 糜蛋白酶
- C. 羧基肽酶
- D. 脂肪酶
- E. 淀粉酶

15. 下列关于肺炎链球菌肺炎的描述哪项不正确

- A. 未及时治疗可并发脓胸
- B. 毒素是细菌的主要致病因素
- C. 不易引起肺组织坏死或形成空洞
- D. 重症可并发发感染性休克
- E. 多见于健康青壮年或老年人

16. 患儿，女，2岁。因智力发育落后1年伴间断抽搐半年就诊。查体：皮肤色泽浅，头发呈黄色，肌张力较高。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 染色体核型分析
- B. 血钙、磷、镁、碱性磷酸酶
- C. 尿有机酸分析
- D. 血甲状旁腺素
- E. 血TSH、T<sub>4</sub>

17. 诊断肺结核常规首选、可发现早期轻微结核病变的检查方法是

- A. 痰涂片抗酸染色
- B. PPD 试验
- C. 痰结核分枝杆菌培养
- D. X线胸片
- E. 胸部CT

18. 引起水痘的病原体是

- A. 水痘病毒
- B. 带状疱疹病毒
- C. EB病毒
- D. 水痘-带状疱疹病毒
- E. 单纯疱疹病毒



19. 下列哪项是肺腺癌和肺小细胞癌的共同特点

- A. 多为中央型
- B. 多为周围型
- C. 血行转移早
- D. 淋巴转移早
- E. 生长缓慢转移晚

20. 患儿猩红热皮疹特点为

- A. 皮疹粗糙，鸡皮样疹
- B. 常有散在糠屑样脱皮
- C. 在腋窝、腹股沟等皮肤皱褶处皮疹密集
- D. 常在 24 小时内遍及全身
- E. 疹间皮肤亦呈红色

21. 参与支气管哮喘发作的主要细胞不包括

- A. CD<sub>4</sub>T 淋巴细胞
- B. CD<sub>8</sub>T 淋巴细胞
- C. 嗜酸性粒细胞
- D. 嗜碱性粒细胞
- E. 肥大细胞

22. 最有效预防麻疹的措施是

- A. 应用免疫球蛋白
- B. 采用麻疹减毒活疫苗
- C. 应用胎盘球蛋白
- D. 应用成人血浆
- E. 应用维生素 A

23. 慢性肺脓肿患者的临床表现不包括

- A. 口周单纯疱疹
- B. 咳脓臭痰
- C. 不同程度咯血
- D. 肺部听诊空瓮音
- E. 杵状指(趾)

24. 以血压计袖带包裹小儿上臂，使血压维持在收缩压与舒张压之间，5 分钟之内该手出现痉挛症状，此为

- A. 巴彬斯基征 典型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- B. 布鲁辛基征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- C. 面神经征 典型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- D. 凯尔尼格征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- E. 陶瑟征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症

25. 在我国，急性呼吸窘迫综合征最常见的原因是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 吸入性肺炎
- B. 大面积创伤
- C. 重症肺炎
- D. 重症胰腺炎
- E. 大面积烧伤

26. 下列不属于新生儿生理状态的是

- A. 马牙和螳螂嘴
- B. 生后 4~7 天出现乳腺肿大
- C. 生后 24 小时内出现黄疸
- D. 生后 1~2 天头部、躯干、四肢多形性斑丘疹.
- E. 女婴生后 5~7 天阴道流出少许血性分泌物

27. 关于“暖休克”的叙述正确的是

- A. 革兰阳性细菌感染引起的早期休克
- B. 低排高阻型
- C. 皮肤花斑样发绀
- D. 嗜睡
- E. 毛细血管充盈时间延长

28. 判断新生儿缺血缺氧性脑病严重程度的主要依据是

- A. 血清 CPK-BB
- B. 脑电图
- C. 颅脑超声
- D. 临床表现
- E. 头颅 CT

29. 深静脉血栓时进行溶栓治疗的“时间窗”是

- A. 6 小时以内
- B. 12 小时以内
- C. 7 天以内
- D. 72 小时以内
- E. 14 天以内

30. 女性, 30 岁, 已婚 3 年未孕, 月经规律, 4~5/(28~30) 天, 量中, 近 2 年痛经(+). 妇科检查: 子宫后倾, 正常大小, 活动度差。左侧附件可扪及 8cm×7cm×6cm 囊性肿块, 轻压痛, 右附件(-)。B 超检查: 左侧卵巢囊肿。诊断为左侧卵巢巧克力囊肿。该患者宜选用的治疗方法为

- A. 高效孕激素周期疗法
- B. 经期用消炎痛对症治疗
- C. 假孕疗法
- D. 假绝经疗法
- E. 行左侧巧克力囊肿切除术



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



31. 男, 56 岁。间断活动时憋喘 1 年余, 近期加重, 重体力活动即感喘憋, 有夜间憋醒。既往高血压病 8 余年, 糖尿病 4 余年, 查体: BP 150/100 mmHg, 双肺呼吸音清。心率 76 次/分, 律齐。患者经药物治疗症状好转, 为改善预后需要长期使用的药物是

- A. 洋地黄类药物
- B. 肾上腺素能受体激动剂
- C. 磷酸二酯酶抑制剂
- D. 利尿剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

32. 子宫肌瘤继发贫血最常见于

- A. 浆膜下子宫肌瘤
- B. 黏膜下子宫肌瘤
- C. 肌壁间子宫肌瘤
- D. 肌瘤红色变性
- E. 肌瘤玻璃样变

33. 对心肌梗死后伴有室性期前收缩的患者, 能够降低猝死发生率、再梗死率和总病死率的药物是

- A. 比索洛尔
- B. 普罗帕酮
- C. 利多卡因
- D. 奎尼丁
- E. 丙吡胺

34. 产褥妇, 产后 3 天, 出现急性腹痛伴发热 2 天, 腹部包块增大, 曾诊断患“子宫肌瘤”。本例应考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 子宫肌瘤囊性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤红色变
- E. 子宫肌瘤恶性变

35. 以下可导致急性二尖瓣关闭不全的疾病

- A. 风湿性心脏病
- B. 扩张型心肌病
- C. 感染性心内膜炎
- D. 肥厚性梗阻型心肌病
- E. 二尖瓣黏液样变性

36. 女, 23 岁。夜间排尿后突然右下腹剧痛, 随后恶心、呕吐。平时月经规律, 末次月经为 10 天前。妇科检查子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块, 触痛, 推移后疼痛加剧。首先考虑

- A. 输卵管妊娠破裂
- B. 急性阑尾炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- D. 急性附件炎
- E. 卵巢黄体破裂

37. 肥厚型梗阻性心肌病超声心动图的 SAM 现象是指

- A. 二尖瓣前叶在收缩期后移
- B. 二尖瓣后叶在舒张期前移
- C. 二尖瓣后叶在收缩期前移
- D. 二尖瓣前叶在舒张期前移
- E. 二尖瓣前叶在收缩期前移

38. 良性卵巢肿瘤伴右侧胸水形成可见于

- A. 浆液性囊腺瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 卵泡膜细胞瘤
- D. 纤维瘤
- E. 皮样囊肿

39. 以下哪种情况禁用药物 ACEI

- A. 高血压合并左心室肥厚
- B. 高血压合并糖尿病肾病
- C. 高血压合并心肌梗死
- D. 高血压合并高血钾
- E. 高血压患者测定血肌酐为 2mg/dl

40. 最易形成囊肿的部位是

- A. 阴阜
- B. 尿道旁腺
- C. 阴道前庭窝
- D. 前庭球
- E. 前庭大腺

41. 急性心肌梗死最易合并房室传导阻滞的是

- A. 广泛前壁心梗
- B. 局限前壁心梗
- C. 高侧壁心梗
- D. 下壁心梗
- E. 前间隔心梗

42. 卵巢动脉通过的韧带是

- A. 主韧带
- B. 阔韧带
- C. 圆韧带
- D. 卵巢悬韧带
- E. 卵巢固有韧带



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



43. 感染性心内膜炎患者，使用抗生素原则正确的是

- A. 经验治疗疗程 4~6 周
- B. 小剂量
- C. 短疗程
- D. 单药治疗
- E. 待分离出病原微生物后开始用药以减少耐药菌株形成

44. 女，30 岁。停经 60 天，腹痛伴有大量阴道流血 2 天，心率 109 次/分；妇科检查：宫口容纳一指尖，有组织物堵塞宫颈口；子宫如妊娠 8 周大小。该患者的处理不包括

- A. 查血  $\beta$ -hCG
- B. 肌注黄体酮
- C. 查血常规
- D. 给予输液及止血药物
- E. 及时行吸宫术

45. 不属于消化性溃疡所致腹痛特点的是

- A. 慢性
- B. 难治性
- C. 季节性
- D. 节律性
- E. 周期性

46. 女，29 岁，平素月经规律，现停经 55 天，右下腹胀痛难忍 2 天，肛门坠胀 1 天，BP90/60mmHg。下列哪项与诊断无关的体征

- A. 宫颈光滑
- B. 后穹隆饱满
- C. 宫颈举痛，摇摆痛
- D. 子宫增大变软
- E. 宫颈软并着色

47. 早期胃癌指的是

- A. 癌灶直径  $\leq 10\text{mm}$
- B. 癌灶面积  $\leq 5\text{cm}$
- C. 局限于黏膜或黏膜下层
- D. 局限于肌层
- E. 肝炎后性肝硬化

48. 下列哪项不是胎心率变异减速的特征

- A. 胎心率下降快
- B. 发生于宫缩没有固定关系
- C. 持续时间长短不一
- D. 胎心率恢复迅速
- E. 胎心率恢复缓慢





49. 女，50岁。间歇性右上腹痛伴皮肤巩膜黄染半年，再次发作2天。查体：T 36.5℃，P 80次/分，R 18次/分，BP 120/80mmHg，皮肤巩膜明显黄染，未见肝掌、蜘蛛痣。右上腹压痛，无明显肌紧张和反跳痛。B超检查示胆囊内多发泥沙样结石，胆总管略扩张。最恰当的手术方式是

- A. 胆肠吻合术
- B. 胆囊切除、胆总管探查术
- C. 胆囊造瘘、胆总管探查术
- D. 胆囊造瘘术
- E. 腹腔镜胆囊切除术

50. 有关子宫内膜癌的治疗，错误的是

- A. I期有浅肌层浸润，术后常规应辅助放疗
- B. 高分化、无肌层浸润、要求保留生育功能的患者可用大剂量孕激素保守治疗
- C. 首选手术治疗
- D. II期应行广泛子宫切除加盆腔淋巴结切除术及腹主动脉旁淋巴结取样
- E. 晚期或复发癌可考虑化学治疗

