

# 2022 年口腔执业实践技能教材**具体变动**

## 第一章 口腔疾病基本检查和诊断技术

### 第二节 口腔及颌面部基本检查

- 1.口腔一般检查-“无名指” **改为** “环指”。
- 2.社区牙周指数检查及记录-**增加** “现在，口腔健康流行病学调查工作更多地采用 2013 年 WHO 发布的改良 CPI。”

## 第三章 口腔疾病基本治疗技术

### 第一节 刷牙指导

- 1.刷牙方法-“水平颤动拂刷牙法” **改为** “水平颤动拂刷牙法（改良 Bass 刷牙法）”。
- 2.注意事项和指导方法-调换顺序。

### 第二节 牙线使用指导

牙线使用指导-整体变动。

### 第三节 窝沟封闭术

- 1.“在（牙合）面或颊舌面的点隙裂沟涂布一层粘接性树脂” **改为** “在（牙合）面、颊或舌面的深点隙窝裂沟涂布一层复合树脂材料”。
- 2.操作步骤-清洁牙面-“酸蚀前首先应对牙面” **改为** “首先须对牙面”。
- 3.操作步骤-清洁牙面-**增加** “不要使用含有油质的清洁剂或过细磨料”。

4.操作步骤-酸蚀-“放在将要被封闭的牙面上” **改为** “放在拟被封闭的牙面窝沟处”。

5.操作步骤-酸蚀-“酸蚀面积应为接受封闭的范围，一般为牙尖斜面 2/3” **改为** “酸蚀面积一般为牙尖斜面 2/3”。

6.操作步骤-冲洗和干燥-“用蒸馏水彻底冲洗酸蚀后的牙面” **改为** “用水枪彻底冲洗酸蚀后的牙面”。

7.操作步骤-检查-“在封闭剂固化后，术者应用探针进行全面检查” **改为** “在封闭剂固化后，用探针进行全面检查”。

## 第五节 橡皮障隔离术

1.材料和工具-橡皮布-**增加** “橡皮布为方形，边长有 150mm 和 125mm 两种尺寸，临床一般用较小尺寸的橡皮布即可；颜色”。

2.材料和工具-橡皮布-“橡皮布的厚度分为薄型、中型、厚型、超厚型和特厚型” **改为** “橡皮布的厚度分为薄型 (0.15mm)、中型 (0.20mm)、厚型 (0.25mm)、超厚型 (0.30mm) 和特厚型 (0.35mm)”。

3.材料和工具-橡皮障夹-“例如喙部呈锯齿状的橡皮障夹用于残冠的固位” **改为** “例如喙部呈锯齿状的橡皮障夹、或喙缘凹向根方的橡皮障夹，用于隔离残冠、残根的橡皮布固位”。

4.材料和工具-橡皮障支架-“用于固定橡皮布” **改为** “用于均匀撑开橡皮布”。

5.主要操作步骤-删除一段话“橡皮障隔离术的基本步骤为术区准备、选择橡皮布、打孔、选择橡皮障夹、放置橡皮障和拆卸橡皮障等。”。

6.主要操作步骤-选择橡皮障夹-“然后根据安装方式选择有翼或无翼的橡皮障夹”  
**改为**“然后根据安装方式选择有翼或无翼（有 W 或无 W）的橡皮障夹”。

7.主要操作步骤-放置橡皮障-橡皮布优先法-“按打孔部位套入牙齿并推向牙颈部，邻面不易滑入时，可用牙线帮助橡皮布通过接触点；若有两个以上的牙和孔，应逐一从远中向近中套入”**改为**“按打孔部位逐一从远中向近中套入牙并推向牙颈部，邻面不易滑入时，可用牙线帮助橡皮布通过接触点。”

8.主要操作步骤-放置橡皮障-橡皮布优先法-“并用橡皮障夹钳将橡皮障夹固定到牙颈部”**改为**“并用橡皮障夹钳将橡皮障夹固定在多颗隔离牙两侧最远端牙位的牙颈部”。

## 第六节 G.V.BlackⅡ类洞制备术

1.窝洞制备的基本原则-生物学原则-删除一句话“用完整离体牙制备标准洞形的过程中，更注重对后者的考察”。

2.窝洞制备中易出现的问题和错误-窝洞质量-“点线角不清楚或未做出，也有过锐者”**改为**“点线角不清楚或过锐”。

## 第七节 磨牙开髓术

1.操作步骤-术前准备-删除“于患者头部正后方或右后方”。

2.操作步骤-术前准备-**增加**“治疗上磨牙时，术者位于患者头部正后方或右后方；治疗下磨牙时，术者位于患者头部右前方”。

3.操作步骤-进入并穿通髓腔-“无名指”**改为**“环指”。

4.操作步骤-探查通畅根管，建立根管通路-最后**增加**一句话“上颌磨牙开髓，术者左手持镜也要用环指作支点，须全程通过口镜观察镜中物像进行所有操作，不能直视操作；下颌磨牙开髓，术者可直视或口镜辅助观察。”

5.髓腔入路预备的合格标准和常见问题-常见问题-操作方法不规范-**增加**“医、患者体位欠佳；不用口镜观察”。

## 第十节 牙拔除术

1.物品准备-操作要求-牙拔除术的要求-牙拔除术操作-**增加**“但又不伤及牙龈”

## 第十四节 磨牙铸造金属全冠的牙体预备

术前准备-牙体预备-牙体预备方法与要求-“形成 0.5mm 宽圆角肩台（全冠边缘位置应根据具体情况决定，...更有利于修复体边缘密合和龈组织健康）” **改为**“形

成 0.5mm 浅凹形宽圆角肩台边缘或全冠边缘位置应根据具体情况决定...更有利于修复体边缘密合和龈组织健康”。

## 第五章 病史采集

“口腔黏膜溃疡、口腔黏膜白色...修复后疼痛等” **改为**“颌面部肿痛...修复后疼痛等”。

### 第一节 牙痛

1.询问病史要点-现病史-“疼痛部位的确定及放散的范围” **改为**“疼痛的部位及牵涉的范围”。

2.临床思辨-顺序调整。

3.临床思辨-疼痛的激惹因素-**增加**一句话“咬合痛一般反映...可怀疑牙隐裂”。

### 第二节 牙松动

所有“肿胀” **改为**“红肿”。

## 第九节 口腔黏膜白色斑纹

- 1.临床思辨- “1.口腔白色角化病” **改为** “1.口腔白角化症”。
- 2.临床思辨- “7.苔藓样反应” **改为** “7.口腔苔藓样损害”。
- 3.临床思辨- “8.慢性盘状红斑狼疮” **改为** “8.盘状红斑狼疮”。
- 4.临床思辨-**增加** “9.口腔黏膜下纤维性变：以颊...等自觉症状”。
- 5.临床思辨- “瘘管是否持续有排出物” **改为** “瘘管或窦道是否持续有排出物”。

## 第十三节 开口受限

临床思辨-口腔治疗史或拔牙史- “应考虑拔牙...下颌关节紊乱病” **改为** “有的拔牙操作...颞下颌关节紊乱病”。

## 第十四节 修复后疼痛

- 1.临床思辨-修复体粘固后疼痛预防或处理措施-**增加** “避免使用有游离酸析出的磷酸锌水门汀”。
- 2.临床思辨-修复体粘固之后口腔检查- “可见创伤（牙合）或早接触” **改为** “可见早接触（牙合）干扰”。
3. “调改卡环、基托或人工牙” **改为** “卡环、基托或人工牙与基牙解除过紧部位缓冲处理”。
4. “上颌隆突，上颌结节的颊侧，下颌舌隆突等处骨质隆起...受力后容易造成组织压伤” **改为** “上颌隆突，上颌结节的颊侧，下颌舌隆突，下颌舌骨嵴等处骨质隆起...受力后容易造成组织压伤”。
5. “遇到此类情况...以减轻黏膜的负荷” **改为** “可能的情况...支持作用”。

6. “患者戴义齿后...或重新做全口义齿” **改为** “重新做全口义齿...降低垂直距离”。
7. “必须找出早接触点和（牙合）干扰部位，给予磨除达到（牙合）平衡” **改为** “确定早接触点和（牙合）干扰部位，选磨调（牙合）至（牙合）平衡”。
8. “义齿在正中咬合和侧方（牙合）...（牙合）力分布不均匀” **改为** “义齿有正中咬合早接触...（牙合）力分布不均匀”。
9. “需对症处理” **改为** “人工牙排列位置...正常形态”。
10. “对症处理；不能修理者重新修复” **改为** “修复设计，重新修复”。

## 第六章 口腔颌面部常见疾病的诊断、鉴别诊断和治疗原则

### 第一节 龋病

- 1.临床表现-浅龋-检查所见-第 2 小点中**增加**一句话“又称作早期釉质龋”。
- 2.临床表现-中龋-检查所见-**增加** “（4）牙髓诊断性试验测试正常。（5）X 线片显示龋损透射影止于牙本质全层中线以外，洞底至髓腔尚有一段距离”。
- 3.静止龋-检查所见- “（1）邻面龋呈浅碟状，轻度着色，表面光亮。” **改为** “（1）邻面龋损呈黄褐色、褐色龋斑，浅碟状或外敞形浅洞，轻度着色，表面光亮。”。
- 4.临床表现-静止龋-检查所见-**增加** “（3）常见于磨牙的（牙合）面和失去邻牙的患牙邻面”。5.鉴别诊断-**增加** “（五）深龋与死髓牙的鉴别”相关内容。

### 第二节 牙本质敏感症

诊断-删除“3.可用主观评价评定牙本质敏感的程度”相关内容。

### 第四节 根尖周炎

治疗原则-删除一句话“待窦道口闭合后再行根管充填”。

## 第五节 慢性龈炎

诊断-“无附着丧失和牙槽骨吸收” **改为**“探诊深度可略有**增加**，无附着丧失和牙槽骨吸收”。

## 第六节 药物性牙龈肥大

1.临床表现-症状-**增加**“伴发炎症者也会有牙龈红肿、出血症状”。

2.诊断-删除“探诊出血”。

## 第八节 慢性牙周炎

1.临床表现-检查所见-“(2)附着丧失：能探到或看到釉牙骨质界。” **改为**“(2)牙周袋形成，有附着丧失。探诊深度加深，能探到或看到釉质牙骨质界”。

2.诊断-“4.存在附着丧失和牙槽骨吸收。” **改为**“4.探诊深度加深，存在附着丧失和牙槽骨吸收。”。

## 第九节 侵袭性牙周炎

治疗原则-**增加**“(OHI、洁治、刮治及根面平整)”。

## 第十二节 复发性阿弗他溃疡

1.轻型复发性阿弗他溃疡-删一句话“约占复发性阿弗他溃疡患者的 75%~85%”。

2.轻型复发性阿弗他溃疡-“一般 7-14 天溃疡愈合” **改为**“一般 10-14 天溃疡愈合”。

3.疱疹样复发性阿弗他溃疡-删一句话“约占复发性阿弗他溃疡患者的 5% ~ 10%”。

4.重型复发性阿弗他溃疡-删一句话“占复发性阿弗他溃疡患者的 10% ~ 15%”。

### 第十三节 口腔念珠菌病

慢性红斑型念珠菌病-临床表现-“表现为双侧口角潮红” **改为** “表现为双侧口角潮红或湿白”。

### 第十四节 口腔白斑病

鉴别诊断-“1.白色角化症” **改为** “1.口腔白角化症”。

### 第十五节 口腔扁平苔藓

鉴别诊断-“5.苔藓样反应” **改为** “5.口腔苔藓样损害”。

### 第十九节 口腔颌面部间隙感染

“消毒不严也可引起” **改为** “无菌操作不严格也可引起”。

### 第二十四节 牙体缺损、牙列缺损和牙列缺失

**增加** “3.种植义齿修复治疗原则...也会显著改善修复效果”