

病例分析

历年真题及答案

今日实战

张某，女，29岁，已婚，职员。2019年7月14日初诊。

患者20天前行剖宫产手术，3天前出现高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多，色紫暗如败酱，有臭气，心烦口渴，尿少色黄，大便燥结。

查体：T 38.3℃，P 96次/分，R 24次/分，BP 112/80mmHg。痛苦面容，下腹部压痛(+)。舌红，苔黄而干，脉数有力。

要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	产后发热	2
中医证候诊断	感染邪毒证	2
西医诊断	产褥感染	2
西医诊断依据	1.有剖宫产手术史。 2.高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多，色紫暗如败酱，有臭气，心烦口渴，尿少色黄，大便燥结。 3.查体下腹部压痛(+)，舌红，苔黄而干，脉数有力。 4.血常规：WBC $10.5 \times 10^9/L$ ，N 86%。 5.超声提示：子宫正常。	4
中医治法	清热解毒，凉血化瘀	2
方剂名称	五味消毒饮合失笑散加味	2
药物组成、剂量及煎服法	金银花 20g，野菊花 12g，蒲公英 12g，紫花地丁 12g，紫背天葵 12g，蒲黄 15g (包煎)，五灵脂 12g。 3剂，水煎服。每日一剂，早晚分服。	2

西医治疗措施	<ol style="list-style-type: none">1.支持疗法：加强营养，增强抵抗力，纠正贫血与电解质紊乱。2.处理感染灶：清除宫腔残留物，脓肿切开引流，采取半卧位以利于引流。3.应用抗生素：按药敏试验选用广谱高效抗生素。中毒症状严重者，可短期加用肾上腺糖皮质激素，提高机体应激能力。4.手术治疗：子宫感染严重，药物治疗无效，炎症继续扩散时，应及时行子宫全切术，清除感染源，抢救患者生命。	4
--------	--	---

金英杰中医西医