

1. 答案 C
2. 答案 D
3. 答案 A
4. 答案 D
5. 答案 C
6. 答案 B
7. 答案 C
8. 答案 C

病史采集 总分 15 分

评分标准	总分 15 分	
一. 问诊内容 13 分	13 分	
(一) 现病史		
1. 根据主诉及相关鉴别询问	10 分	
(1) 发病诱因:有无外伤、感染、服用药物、日光照射或接触化学试剂		1 分
(2) 发热: 程度、热型、有无寒战		2 分
(3) 面部红斑:外形、大小、两边是否对称、局部有无不适(如疼痛、瘙痒,与日晒的关系, 其他部位有无皮疹		2.5 分
(4) 伴随症状:有无口腔溃疡、脱发、有无关节痛、口干和眼干、有无皮肤黏膜出血		1.5 分
2. 诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查:血常规、尿常规、抗核抗体、皮肤科检查		1 分
(2) 治疗情况:是否用过退热药物和激素类药物治疗, 疗效如何		1 分
3. 一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1 分
(二) 其他相关病史	3 分	
(1) 有无药物过敏史, 有无光过敏史		1 分
(2) 与该病有关的其他病史:有无心脏病、肾病和出血性疾病、风湿性疾病病史, 有无皮肤病病史, 月经与婚育史, 有无遗传性疾病家族史		2 分
二. 问诊技巧	2 分	
1. 条理性强, 能抓住重点		1 分
2. 能够围绕病情询问		1 分

病例分析 总分 22 分

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	3 分	
1. 慢性肾小球肾炎		2 分
2. 肾性高血压		0.5
3. 慢性肾脏病 3 期		0.5
二、诊断依据(初步诊断错误, 诊断依据不得分)	6 分	
1. 慢性肾小球肾炎		
(1) 青年男性, 慢性病程		1 分
(2) 双下肢水肿、血尿、蛋白尿、高血压		2 分

(3)尿常规:蛋白(+++), 沉渣 RBC 25~30 / HP, 颗粒管型 2~3 / HP		1 分
2.肾性高血压:青年男性, 肾脏疾病之后发现血压升高。无高血压家族史		1 分
3.慢性肾脏病 3 期:病程超过 3 个月, 血肌酐升高 \hat{m} (e G F R) 57 ml / (m i n \times 1.73 m ²)		1 分
三、鉴别诊断	4 分	
1.继发性肾小球肾炎(如狼疮性肾炎、过敏性紫癜性肾炎 \hat{m} 乙肝病毒相关性肾炎)(答出其 中一个即可得分)		1.5 分
2.高血压肾损害		1.5 分
3.无症状性血尿和蛋白		1 分
四、进一步检查	5 分	
1.尿相差显微镜检查		1 分
2.补体、乙肝病毒标志物、抗核抗体谱、抗肾小球基底膜抗体		2 分
3.肾脏 B 超		1 分
4.必要时行肾穿刺活检		1 分
五、治疗原则	4 分	
1.限制水盐摄入, 优质低蛋白饮食加必需氨基酸治疗		1 分
2.密切监测肾功能情况下, 首选 ACEI 或 ARB		1.5 分
3.根据肾穿刺病理类型酌情给予免疫抑制剂治疗		1 分
4.避免劳累、感染及应用肾毒性药物		0.5

第二站 体格检查 总分 20 分

评分标准	总分 20 分	
一、肺部听诊检查(须报告检查结果)	6 分	
一、考生站位正确, 告知被检者体位、姿势正确		
1.告知被检者取仰卧位或坐位, 充分暴露前胸部和背部, 考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)		0.5 分
二、检查方法正确, 动作规范		
1.呼吸音及啰音检查:考生用听诊器的膜型体件在胸壁检查, 听诊顺序由肺尖开始, 自上而下, 由前胸到侧胸、背部		1 分
2.左右两侧对称部位进行比较		0.5 分
3.每处至少听 1~2 个呼吸周期		0.5 分
4.要求被检者均匀而平静地呼吸, 必要时嘱被检者深呼吸屏气或咳嗽		0.5 分
5.语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“y i”长音(或耳语“1、2、3”), 考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下, 左右两侧对称部位对比听诊		1 分
6.胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊, 嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊		1 分
三、检查结果正确		
1.告检查结果:双肺呼吸音是否清晰, 有无增强或减弱, 有无异常呼吸音, 有无啰音有无胸膜摩擦音, 语音共振有无增强或减弱		1 分

二、腹部包块检查(假定包块位于左下腹)(深部触诊法)	2 分	
一、考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		
1.告知被检者取仰卧位、暴露腹部，腹部放松，双腿屈曲，考生位于被检者右侧		0.5 分
一、检查方法		
1.考生右手手指并拢触诊		0.5 分
2.将被检者腹壁下压至少 2 厘米，以了解包块情况，然后将指端逐渐触向包块		0.5 分
3.做滑动触诊，滑动方向应与包块长轴垂直		0.5 分
三、脑膜刺激征检查(颈强直必做、Kernig 征和 Brudzinski 征任选一项，须口述阳性表现)	8 分	
一、考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		
1.被检者去枕仰卧位，双上肢自然伸直置于躯干两旁，双下肢自然伸直，考生站在被检者右侧，嘱被检者放松		1 分
二、检查方法正确，动作规范		
1.颈强直		
①考生左手置于被检者枕部，检查者以一手托患者枕部，另一只手置于胸前作屈颈动作，通过观察或感觉被动运动时的阻力和询问有无疼痛，以了解被检者是否有颈部肌肉或椎体病变		1 分
②考生右手轻按被检者胸前，左手托持被检者枕部并作屈颈动作，体会被检者颈部有无抵抗感及其程度		1 分
2.Kernig 征		
①考生左手固定被检者右侧或左侧膝关节，右手托持于被检者右侧或左侧足跟部，屈髋、膝关节使之均呈 90°屈曲		1 分
②右手抬高被检者小腿并使之伸膝，(考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣 0.5 分)		1 分
3.Brudzinski 征		
①考生右手轻按被检者胸前，左手托持被检者枕部并作屈颈动作		0.5 分
②观察被检者髋、膝关节有无屈曲动作		0.5 分
三、口述检查结果和阳性表现		
1.颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强		0.5 分
2.Kernig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛		0.5 分
3.Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲		0.5 分
4.报告检查结果:正常人脑膜刺激征为阴性		0.5 分
四、提问	2 分	
1.描述中枢性面瘫与周围性面瘫的主要体征区别		2 分
答:中枢性面瘫时皱额、闭眼无明显影响，只出现病灶对侧下半部面肌瘫痪(1 分)，而周围性面瘫病侧上下半部面肌均有瘫痪表现(1 分)		
五、职业素质	2 分	
(一)体检前能向被体检者告知，与被体检者沟通时态度和蔼，体检中动作轻柔，能体现爱护被检查者的意识，体检结束后能告知，有体现关爱被检查者的动作		1 分
(二)着装(工作服)整洁，仪表举止大方，语言文明，体检认真细致，表现出良		1 分

好的职业素质		
--------	--	--

第三站 基本操作 总分 20 分

评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分)	总分 20 分	
一、穿隔离衣过程	6 分	
1.准备工作:戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露)，洗手(口述)，手持衣领从衣钩上取下隔离衣，清洁面朝向自己将衣服展开，露出肩袖内口		2 分
2.一手持衣领，另一手伸入袖内并向上抖，拉衣袖使手露出，同法穿好另一袖		2 分
3.两手沿衣领边缘由前向后，在颈后系好领口，然后扣好袖扣或系上袖带		2 分
4.从腰下 5 c m 侧衣缝处将隔离衣后身部分向前拉并触及衣边，捏住，同法将另二侧衣边捏住，同法将另一侧衣边捏住		2 分
5.两手在背后将两侧衣边对齐，向一侧按压折叠，以一手按住，另一手将腰带拉至背后压住折叠处，在背后交叉，回到前面打一活结，系好腰带		2 分
二、脱隔离衣过程		
1.解好腰带，将腰带牵至身前，并打一活结		1 分
2.解开袖口，在肘部将部分袖管塞入袖内，暴露前臂		1 分
3.消毒双手，从前臂至指尖刷洗 2 分钟，清水冲洗擦干（口述即可）		2 分
4.解开衣领		1 分
5.二手伸入另一侧口内清洁面，拉下衣袖过手，再用衣袖遮盖着的手在外面拉下另一衣袖，两手在袖内使袖子对齐，臂逐渐退出		1 分
6.双手持衣领，将隔离衣清洁面向外两边对齐，挂在钩上		1 分
三、提问	2 分	
1.脱隔离衣时，如果衣袖触及面部怎么办？		1 分
答:应当立刻用肥皂水清洗面部		
2.隔离衣的哪些部位是清洁？		1 分
答:隔离衣的内面及衣领为清洁区		
3.做滑动触诊，滑动方向应与包块长轴垂直		
四、职业素质	2 分	
(一)体检前能向被体检者告知，与被体检者沟通时态度和蔼，体检中动作轻柔，能体现爱护被检查者的意识，体检结束后能告知，有体现关爱被检查者的动作		1 分
(二)着装(工作服)整洁，仪表举止大方，语言文明，体检认真细致，表现出良好的职业素质		1 分