

口腔医学

国家执业医师资格考试考前冲刺模拟试卷 II

(医学综合笔试部分)

口腔执业助理医师

(报考类别代码:220)

考生姓名: _____

准考证号: _____

第一单元

A1型选择题(1~82题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 注射青霉素过敏引起的过敏性休克是
 - A. 副作用
 - B. 继发反应
 - C. 应激效应
 - D. 毒性反应
 - E. 变态反应
2. 毛果芸香碱滴眼后可引起
 - A. 缩瞳,降低眼内压,调节痉挛
 - B. 缩瞳,升高眼内压,调节痉挛
 - C. 缩瞳,降低眼内压,调节麻痹
 - D. 扩瞳,升高眼内压,调节痉挛
 - E. 扩瞳,降低眼内压,调节麻痹
3. 口腔白斑是癌前损害,在镜下显示典型的
 - A. 角化过度与不全角化
 - B. 颗粒层肥厚
 - C. 棘层松解
 - D. 上皮异常增生
 - E. 黏膜下层炎症细胞浸润
4. 牙髓坏死的临床表现除外
 - A. 牙暗灰不透明
 - B. 患牙叩诊正常
 - C. 牙冠变黑褐色
 - D. 电活力测无反应
 - E. 温度测验正常
5. 下列哪项可用于腺周口疮和结核性溃疡的鉴别诊断
 - A. 有无自限性
 - B. 有无疼痛
 - C. 有无伪膜
 - D. 发病年龄
 - E. 是否吸烟
6. 可复性牙髓炎对下列哪项刺激最敏感
 - A. 酸刺激
 - B. 探诊
 - C. 触诊
 - D. 冷、热刺激
 - E. 以上均不是
7. 形成“釉梭”的原因是
 - A. 造牙本质细胞埋入牙釉质中
 - B. 牙本质细胞的膨大部分
 - C. 釉柱的畸变
 - D. 钙化不良的釉柱
 - E. 膨大的釉丛
8. 上颌6牙冠第五恒牙尖通常位于
 - A. 近中颊尖的颊侧
 - B. 远中颊尖的颊侧
 - C. 近中舌尖的舌侧
 - D. 远中舌尖的颊侧
 - E. 远中舌尖与颊尖之间
9. 下列关于牙本质过敏症治疗的描述,不正确的是
 - A. 牙本质过敏症可以自愈
 - B. 颊面的过敏点可用麝香草酚脱敏
 - C. 牙颈部可用氟化钠脱敏
 - D. 较局限的敏感区,可作充填治疗
 - E. 对牙本质过敏的有效治疗必须封闭牙本质小管

10. 可用来间接盖髓的材料是
- A. 磷酸锌水门汀
 - B. 聚羧酸锌水门汀
 - C. 氢氧化钙
 - D. 复合树脂
 - E. 以上均是
11. 多形性腺瘤是
- A. 良性肿瘤,生长较快
 - B. 良性肿瘤,生长缓慢
 - C. 恶性肿瘤,易复发
 - D. 恶性肿瘤,生长较快
 - E. 良性肿瘤,不复发
12. 牙周探诊的最佳力量是
- A. 10 ~ 20g
 - B. 15 ~ 20g
 - C. 20 ~ 25g
 - D. 20g 以下
 - E. 25g 以上
13. 附着性龈下菌斑中的优势细菌为
- A. 革兰阳性需氧菌
 - B. 革兰阳性兼性菌
 - C. 革兰阳性兼性菌和厌氧菌
 - D. 革兰阴性能动菌
 - E. 革兰阴性厌氧菌
14. 牙周病最重要的临床表现是
- A. 口臭
 - B. 牙周溢脓
 - C. 牙齿移位
 - D. 牙周袋形成
 - E. 牙龈肿胀、出血、疼痛
15. 松动牙固定适用于
- A. 在牙周治疗后有咀嚼不适和(或)牙松动度继续加重的牙
 - B. 在牙周治疗前有松动的牙
 - C. 在牙周治疗后仍有松动的牙
 - D. 在牙周治疗后仅有咀嚼不适的牙
 - E. 任何松动牙
16. 下列不属于骨上袋特点的是
- A. 常指单面袋
 - B. 袋底位于釉牙骨质界的根方
 - C. 袋底位于牙槽嵴顶的冠方
 - D. 牙槽骨一般是水平吸收
 - E. 牙槽骨不构成牙周袋壁
17. 属于医疗保健机构提供婚前卫生指导的是
- A. 性卫生知识教育
 - B. 遗传病诊查
 - C. 传染病诊查
 - D. 心理健康指导
 - E. 对生育保健提供医学意见
18. 关于腺周口疮的临床表现,下列哪项是错误的
- A. 损害常为多个大溃疡,罕见单发
 - B. 溃疡直径为 1 ~ 3cm 或更大
 - C. 常累及深层黏膜腺组织
 - D. 溃疡周围组织红肿或微显隆起
 - E. 病程可达数周至数月,愈合后可留瘢痕
19. 正常牙龈的颜色呈
- A. 粉红色
 - B. 鲜红色
 - C. 暗红色
 - D. 暗紫色
 - E. 以上均可能
20. 可复性牙髓炎选用的盖髓剂是
- A. 氢氧化钙 + 蒸馏水
 - B. 玻璃离子水门汀
 - C. 氧化锌丁香油糊剂
 - D. 抗生素 + 激素
 - E. 聚羧酸水门汀

21. 下列关于急性化脓性根尖周炎症状的描述,不正确的是
- 自觉持续性跳动
 - 患牙明显伸长
 - 咬紧牙齿时疼痛暂缓解
 - 根尖区红肿、叩痛
 - 相应面部反应性水肿
22. X线片上难以显示的牙槽骨吸收方式是
- 水平型牙槽骨吸收
 - 垂直型牙槽骨吸收
 - 反波浪形牙槽骨吸收
 - 凹坑状牙槽骨吸收
 - 扶壁骨形成
23. 成釉细胞瘤没有的组织学分型是
- 滤泡型
 - 丛状型
 - 梭形细胞型
 - 基底细胞型
 - 棘皮瘤型
24. 在下述牙根形态的生理意义中,错误的是
- 根分叉越多,其支持作用越大
 - 根分叉越宽,其支持作用越强
 - 上颌切牙受向上向前的力,故唇面小于舌面
 - 上颌磨牙舌尖受力最大,故舌根比颊根大
 - 下颌磨牙牙根横截面呈葫芦形,有利于稳固
25. 牙龈炎的临床表现是
- 牙龈可呈鲜红或暗红色
 - 刷牙或咬硬物时牙龈可有出血
 - 牙龈有探诊出血
 - 牙龈袋
 - 以上均是
26. 下列关于腭大孔的描述,不正确的是
- 位于硬腭后部
 - 在硬腭后缘前约0.5cm处
 - 相当于腭中缝至龈缘的连线中点处
 - 是翼腭管的开口
 - 腭前神经和腭降血管由此孔穿出
27. 未经医师注册取得执业证书的
- 只准从事医疗业务
 - 只准从事预防业务
 - 可以从事相应的医疗、预防、保健业务
 - 不得从事医师执业活动
 - 可以重新申请医师执业注册
28. 牙槽骨吸收的标准是
- 牙齿松动程度,Ⅱ度以上松动为有骨吸收
 - 牙周袋深度大于4mm的牙周袋为有骨吸收
 - 牙槽嵴顶到釉牙骨质界的距离超过2mm可确定有骨吸收
 - X线示牙周膜间隙透射区变宽
 - X线示根端有圆形或椭圆形阴影
29. 乳牙窝沟封闭的适宜时间是
- 2~3岁
 - 3~4岁
 - 4~5岁
 - 5~6岁
 - 6~7岁
30. 下列有关牙周袋的最佳解释是
- PD = 3mm
 - PD ≥ 5mm
 - PD ≥ 3mm,未见上皮附着向根方增殖
 - 只与上皮附着向根方增殖有关
 - 与骨丧失有关,上皮附着可正常
31. 医德评价的最高标准是
- 医德基本原则

- B. 医德规范
C. 有利于促进医学科学的发展
D. 有利于人类生存环境的改善
E. 获得群众的好评
32. 执业医师考核不合格的,可以责令其暂停执业活动,并
A. 定期考核
B. 接受培训和继续医学教育
C. 继续执业
D. 注销注册
E. 予以取缔
33. 上颌神经在颅中窝段发出的分支是
A. 颧神经
B. 脑膜中神经
C. 蝶腭神经
D. 腭神经
E. 上牙槽后神经
34. 下述下颌中切牙的形态特征中不正确的是
A. 下颌中切牙是恒牙中最小的
B. 下颌中切牙切缘平直,近远中切角相等
C. 下颌中切牙远中接触区靠近切角,近中接触区离切角稍远
D. 下颌中切牙切缘比颈缘宽
E. 下颌中切牙舌侧窝不明显
35. 牙龈肥大的临床特征是
A. 牙龈呈深红或暗红色
B. 牙龈松软发炎,表面光滑
C. 龈缘肥厚
D. 龈乳头呈球状,常覆盖牙冠近牙颈 1/3 或更多,探之易出血
E. 以上都对
36. 医师行牙髓治疗时的无菌操作,不包括
A. 戴一次性手套
B. 剪短指甲
C. 肥皂洗手
D. 消毒毛巾擦干
E. 75% 酒精浸泡
37. 氧氟沙星的特点是
A. 抗菌活性强
B. 耐药性产生慢
C. 血药浓度低
D. 作用短暂
E. 血浆半衰期为 15 小时
38. 下列不属于慢性龈炎局部刺激因素的是
A. 咬合面充填物高点
B. 食物嵌塞
C. 牙列不齐
D. 牙石
E. 不良修复体
39. 临床窝沟封闭术失败的最主要原因是
A. 清洁不彻底
B. 酸蚀时间不够
C. 酸蚀后唾液污染
D. 固化时间短
E. 涂布封闭剂有气泡
40. 下列不属于行为疗法的是
A. 系统脱敏
B. 移情
C. 厌恶疗法
D. 放松训练
E. 生物反馈
41. 牙槽骨 II 度吸收是指
A. 吸收 \leq 1/3 根长
B. 1/3 根长 $<$ 吸收 $<$ 2/3 根长
C. 1/2 根长 \leq 吸收 \leq 2/3 根长
D. 1/3 根长 \leq 吸收 \leq 1/2 根长
E. \geq 2/3 根长

42. 下列关于牙石的描述,不正确的是
- 牙石对牙周组织的危害主要来自机械刺激
 - 牙石增加了菌斑的滞留
 - 龈下牙石需用探针检查
 - 龈下牙石对牙周组织的危害大于龈上牙石
 - 牙周病治疗时应彻底清除牙石
43. 执业医师法规定医师除正当治疗外,不得使用
- 麻醉药品
 - 精神药品
 - 放射性药品
 - 医疗用毒性药品
 - 以上均是
44. 盘状红斑狼疮的淋巴细胞浸润特点是
- 黏膜下层少量淋巴细胞浸润
 - 固有层淋巴样滤泡形成
 - 淋巴细胞浸润见于扩张的毛细血管周围
 - 基底膜下大量淋巴细胞呈带状浸润
 - 固有层血管周围有密集的淋巴细胞浸润
45. 不主要反映医学心理学重要性的是
- 医学模式改变
 - 改善医患关系
 - 临床工作需要
 - 预防战略转变
 - 卫生经济学需要
46. 关于中央性颌骨骨髓炎的 X 线片表现,哪项说法是错误的
- 骨小梁模糊不清,有骨质破坏
 - 病变边界不清
 - 骨质破坏严重处可有骨膜反应
 - 可有死骨形成
 - 可见弥漫性骨密度增高
47. 与 1 型糖尿病患者牙周破坏严重程度有关的因素是
- 糖尿病的类型
 - 代谢控制的程度
 - 糖尿病病程的长短
 - 有无全身并发症
 - 以上均是
48. 医德关系的主体是
- 医生
 - 医务人员
 - 患者
 - 被救治者
 - 护士
49. 龈沟深度超过多少均应记录
- 1mm
 - 2mm
 - 3mm
 - 3.5mm
 - 4mm
50. 下列良性肿瘤中复发率最高的是
- 成釉细胞瘤
 - 牙源性钙化上皮瘤
 - 牙源性腺样瘤
 - 良性成牙骨质细胞瘤
 - 牙瘤
51. 预防根管治疗器械误吸或误吞的措施如下,错误的是
- 用橡皮障
 - 患者体位合适
 - 医生集中注意力
 - 不预先告知患者
 - 根管器械栓安全绳
52. 下列关于面神经走向的描述,不正确的是
- 穿内耳道底入面神经管

- B. 经茎乳孔出颅
C. 在面神经管内发出二条分支
D. 以茎乳孔为界分为面神经管段和颅外段
E. 穿腮腺浅叶, 扇形分布于表情肌
53. 不良修复体可引起
A. 龋病
B. 牙周组织破坏
C. 口臭
D. 牙龈脓肿
E. 以上都有
54. 下列哪种牙周病的患者多有外周血中性粒细胞功能缺陷
A. 牙周萎缩
B. 慢性龈缘炎
C. 成人牙周炎
D. 侵袭性牙周炎
E. 急性坏死性溃疡性龈炎
55. 不属于舌下区主要内容的是
A. 舌动脉
B. 舌下动脉
C. 舌下神经
D. 舌神经
E. 舌下腺和颌下腺深部
56. 牙釉质和牙骨质在牙颈部比例最高的相接方式是
A. 牙骨质少许覆盖在牙釉质表面
B. 牙釉质少许覆盖在牙骨质表面
C. 牙釉质与牙骨质端端相接
D. 二者不相接
E. 以上4种比率相同
57. 龈上洁治术前应先含漱, 最好用
A. 0.12% 氯己定
B. 清水
C. 0.2% 高锰酸钾溶液
D. 2% 戊二醛
E. 30% 过氧化氢
58. 急性牙髓炎自发痛的时间特点是
A. 吃饭痛
B. 夜间痛
C. 遇冷痛
D. 遇热痛
E. 饭后痛
59. 牙本质发育不全症的特征是
A. 牙釉质发生结构变化, 但牙本质结构基本正常
B. 牙釉质结构基本正常, 但牙本质发生结构变化
C. 牙釉质发生结构变化, 牙本质也发生结构变化
D. 牙釉质和牙本质结构基本正常, 但有过度矿化
E. 牙釉质结构基本正常, 牙本质发生结构变化, 有过度矿化
60. 龈上菌斑中的优势细菌为
A. 革兰阳性需氧菌和兼性菌
B. 革兰阳性兼性菌
C. 革兰阳性兼性菌和厌氧菌
D. 革兰阴性能动菌
E. 革兰阴性厌氧菌
61. 菌斑在牙周炎中所起的作用是
A. 菌斑在牙周炎的进展中起决定性作用
B. 菌斑在牙周炎的病因中起决定性作用
C. 菌斑对牙周炎的预后起决定性作用
D. 菌斑对宿主的免疫反应起决定性作用
E. 菌斑对牙龈炎发展为牙周炎起决定性作用
62. 右侧侧方咀嚼形成的Ⅱ类杠杆, 其支点位于
A. 右侧颞下颌关节

- B. 左侧颞下颌关节
C. 右侧牙列
D. 左侧牙列
E. 升颌肌张力
63. 塑化过程中, 遗漏个别感染根管未作处理, 最可能发生的并发症为
A. 残髓炎
B. 根管内吸收
C. 慢性根尖周炎
D. 化学性根尖周炎
E. 不发生并发症
64. 对牙齿破坏性最大, 最易引起牙齿丧失的根尖脓肿排脓途径是
A. 唇颊侧牙龈
B. 上颌窦
C. 牙周袋
D. 腭侧牙龈
E. 龋洞
65. 牙乳头起源于
A. 外胚间充质
B. 口腔外胚层
C. 轴旁中胚叶
D. 侧板中胚叶
E. 以上都不是
66. 牙石的致病作用主要是
A. 表面常可形成未钙化的菌斑
B. 本身坚硬粗糙, 对牙龈有机械刺激
C. 多孔结构容易吸附大量的细菌毒素
D. 妨碍日常口腔卫生措施的实施
E. 以上均是
67. 下列关于牙周袋概念的描述, 不正确的是
A. 牙周袋是病理性加深的龈沟
B. 牙周袋包括假性牙周袋和真性牙周袋
C. 假性牙周袋因牙龈肿胀或增生所致
D. 真性牙周袋是指 6mm 的牙周袋
E. 临床上的牙周袋既有龈缘向冠方延伸的, 也有沟底向根方延伸的
68. 下列关于腺泡细胞癌临床表现的描述, 正确的是
A. 发病无年龄差异
B. 肿瘤主要发生于颌下腺
C. 女性发病为男性的 2~3 倍
D. 临床表现与多形性腺瘤相似, 但触之较硬
E. 临床上绝大多数无疼痛及消长史
69. 正常龈沟的深度是
A. $\leq 0.5\text{mm}$
B. $\leq 1\text{mm}$
C. $\leq 2\text{mm}$
D. 2~3mm
E. $\leq 3\text{mm}$
70. 水痘 - 带状疱疹病毒在成年人、老年人可引起
A. 水痘
B. 手足口病
C. 疱疹性咽峡炎
D. 带状疱疹
E. 手足口病和带状疱疹
71. 医学抽样研究中的样本是
A. 总体中特定的一部分
B. 总体中有代表性的一部分
C. 随意搜集的部分观察对象
D. 总体中的一部分
E. 研究对象的全体
72. 结合上皮是
A. 有角化的鳞状上皮
B. 向根尖方向逐渐变厚
C. 在龈沟底部约含 15~30 层细胞

- D. 长轴与牙面长轴垂直
E. 有上皮钉突
73. 舌下神经是舌的
A. 感觉神经
B. 运动神经
C. 舌前 1/3 的味觉神经
D. 舌后 1/3 的味觉神经
E. 舌中 1/3 的味觉神经
74. 慢性牙周炎的基础治疗不包括
A. 消除龈上、下菌斑及牙石
B. 纠正食物嵌塞、殆创伤
C. 口腔卫生指导
D. 暂时性固定松动牙
E. 牙周手术
75. 与艾滋病预防无关的有
A. 严格检疫,防止传人
B. 严格选择血制品和供血者
C. 避免接触污染 HIV 物品
D. 避免性关系混乱
E. 加强对危险患者的监测
76. 上下颌骨处于正中关系时,下颌可做多大范围的开闭运动
A. 15mm
B. 20mm
C. 25mm
D. 30mm
E. 35mm
77. 不能用于合并严重并发症的带状疱疹患者的药物是
A. 阿昔洛韦
B. 干扰素
C. 西咪替丁
D. 泼尼松
E. 转移因子
78. 与牙周炎治疗后复发或病情继续加重有关的牙周可疑致病菌是
A. 中间普氏菌
B. 福赛类杆菌
C. 具核梭杆菌
D. 牙龈卟啉单胞菌
E. 伴放线放线杆菌
79. 链霉素过敏性休克抢救应静脉注射
A. 去甲肾上腺素
B. 氢化可的松
C. 异丙肾上腺素
D. 10% 葡萄糖酸钙
E. 西地兰
80. 下列不属于牙槽骨垂直型吸收特点的是
A. 牙槽骨不发生水平方向的吸收
B. 牙槽骨发生垂直方向或斜行的吸收
C. 与牙根面形成角形的骨缺损
D. 牙槽嵴高度多降低,牙根周围的骨吸收较多
E. 垂直型吸收多形成骨下袋
81. 标准误越大,表示此次抽样得到的样本均数
A. 系统误差越大
B. 可靠程度越大
C. 抽样误差越大
D. 可比性越差
E. 变量值的离散程度越大
82. 关于氢氧化钙,下列说法不正确的是
A. 氢氧化钙是最具疗效的盖髓剂之一
B. 对牙髓组织无毒性、无渗透性
C. 有消炎和减轻疼痛的作用
D. 用于盖髓的氢氧化钙,pH 值为 9~12
E. 直接接触牙髓后,牙髓组织可发生凝固性坏死

A2 型选择题 (83 ~ 102 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

83. 患者,男,58 岁。左上颌前牙有“蛀牙”求补。曾有过自发痛史,现咬合不适。口腔检查:左上 3 牙冠广泛深龋,已穿髓,探诊(-),叩诊(±),松动 I 度,根尖区牙龈上可见瘘管口。X 线片示,根尖透影区边界不清楚,形状也不规则。该患者最有可能的诊断是
- A. 慢性牙髓炎
B. 慢性根尖周脓肿
C. 根尖周囊肿
D. 根尖周肉芽肿
E. 根尖周致密性骨炎
84. 患者,男,54 岁。自诉左上后牙饮用冷、热水时疼痛,无自发痛。口腔检查:左上后牙未探及明显龋洞,叩诊(-),左上 6 殆面远中牙体颜色稍显暗黑色。为确定诊断,应采用的辅助检查是
- A. 实验性备洞
B. X 线片检查
C. 牙周探诊
D. 选择性麻醉定位
E. 咬诊
85. 患者,男,22 岁。自诉上前牙冷水刷牙时酸痛明显 1 个月余,无自发痛。口腔检查可见左上 2 近中邻面深龋洞,冷刺激疼痛明显,刺激去除后疼痛即刻消失。牙髓电活力测验为一过性敏感反应,探诊无穿髓孔,叩诊(-),无松动,牙周检查(-)。最可能的诊断是
- A. 可复性牙髓炎
B. 不可复性牙髓炎
C. 牙本质过敏症
D. 牙髓钙化
E. 牙髓坏死
86. 患者,男,76 岁。唇周皮肤出现红斑、灼痒,随后出现簇集针头大小水疱,破溃后结有黄痂。该患者最有可能的诊断是
- A. 鹅口疮
B. 唇疱疹
C. 口角炎
D. 盘状红斑
E. 扁平苔藓
87. 患儿,男,8 岁。摔伤后入院。X 线片显示为左肱骨下端骨骺分离。三周后到市医院就诊,接诊医生填 X 线申请单时将左写成右,放射科发现错后,拍了左手,却将一个“右”字铅号贴在 X 线片上。入院后值班医师在主诉中写左,诊断上又写右,手术通知单上也写右。术前备皮时,护士仍在右臂备皮。手术医生术前曾去查看患者,检查出是左臂跌伤,手术时竟仍在右臂上开了刀,暴露到关节囊未见异常时,经再次询问患儿,方发现开错了手术部位。该事件的主要责任者是
- A. 接诊医师
B. 放射线医师
C. 经治医师
D. 备皮护士
E. 手术医师
88. 患儿,男,12 岁。近半年感觉疲倦,头晕,乏力,心悸,呼吸急促,全血红蛋白 90g/L,

红细胞压积 82fl, 原卟啉大于 500ug/L, 其最可能的原因是

- A. 钙缺乏
- B. 铁缺乏
- C. 叶酸缺乏
- D. 锌缺乏
- E. 维生素 B₁₂ 缺乏

89. 患者, 男, 25 岁。外伤致下前牙松动, 触痛明显, 无自发痛、夜间痛。口腔检查可见右下 1 松动 II 度, 叩(+), 右下 2 和左下 1 松动 I 度, 牙石 I 度。治疗上应该采取的措施是

- A. 下前牙调殆
- B. 固定下前牙松牙
- C. 牙周基础治疗
- D. 观察右下 1 牙髓状况
- E. 以上均是

90. 患者, 男, 18 岁。自述牙龈出血 1 周, 用药物牙膏认真刷牙也不见好转。此时应该

- A. 停止刷牙, 待牙龈出血好转后再小心刷牙
- B. 配合使用具有消炎爽口作用的含漱液
- C. 到医院口腔科检查治疗
- D. 换一种药物牙膏再试一试
- E. 继续刷牙一周, 不好转再看医生

91. 患者, 女, 28 岁。自诉左侧乳房有硬结, 到某医院外科诊治。经活体组织检查证实为乳腺癌。经患者及其家属同意后, 收住院行乳腺癌根治术。在术中右侧乳房也作了活体组织切片, 检查结果为“乳腺良性肿瘤, 伴有腺体增生”。虽然目前不是癌组织, 但是将来有癌变的可能性, 医生决定将右侧乳房切除。术后患者及其家属认为, 医生未经患者或其家属同意切除右侧乳房, 要求追究医生的责任并要求赔偿。上

述病例从伦理学上分析, 哪一个说法是正确的

- A. 该医生未经患者及其家属同意, 自行切除患者右侧乳房, 损害了患者的知情同意权
- B. 该医生为了防止右侧乳房癌变, 切除右侧乳房的做法是正确的
- C. 该医生未经患者及其家属同意, 自行切除患者右侧乳房, 是对患者的伤害, 不符合不伤害原则
- D. 患者及其家属的赔偿要求是无理的
- E. 以上说法都不对

92. 患者, 女, 68 岁。口腔内多数牙冷、热刺激酸痛 2 月余, 无自发痛。患者 3 个月前曾因鼻咽癌颌面和颈部接受过放射治疗。口腔检查可见口腔内多数牙牙颈部环状龋损, 探诊酸痛, 叩诊(-), 温度刺激疼痛明显, 刺激去除后症状即刻消失。最有可能的诊断是

- A. 静止龋
- B. 继发龋
- C. 猛性龋
- D. 线性牙釉质龋
- E. 潜行性龋

93. 患者, 男, 18 岁。自诉刷牙出血数月, 查见牙松(-), 牙龈红肿, 牙周探诊深度 ≤ 3mm, 牙石(++), 探诊出血。最佳处理措施是

- A. 服用阿莫西林和甲硝唑
- B. 口腔卫生宣教和龈上洁治术
- C. 口腔卫生宣教, 龈上洁治术, 根面平整术
- D. 服用牙痛宁片, 使用含漱剂
- E. 进行牙龈切除术

94. 患者, 男, 45 岁。右侧唇红部出现白色斑块 2 年, 无自觉症状。患者有烟酒嗜好。口腔检查可见右侧唇红部一白色斑块, 均

- 质状,不能被擦去,涂片镜检 3 次未找到芽胞或菌丝。不恰当的处理是
- 停止吸烟
 - 口服维生素
 - 0.2% 维甲酸局部涂擦
 - 硝酸银局部处理白色斑块
 - 定期随访,如出现恶变指征应立即切除
95. 某医生选择适当资料计算相应指标,进行 t 检验。进行 t 检验的资料应满足的条件是
- 负偏态资料
 - 正偏态资料
 - 偏态资料
 - 正态或近似正态资料
 - 以上都不是
96. 患者,男,59 岁。自诉左下前牙自发性剧痛 3 天,夜间加剧。口腔检查可见左下 1 切缘磨损近髓,探诊疼痛(++),冷刺激疼痛(++),并持续较长时间,牙体未见明显龋损,叩诊(-),无松动,牙周轻度萎缩。引起剧痛的原因是
- 慢性牙髓炎
 - 急性牙髓炎
 - 慢性根尖周炎
 - 急性根尖周炎
 - 逆行性牙髓炎
97. 患儿,女,1 岁半。双颊、唇、舌黏膜突发成簇、针头大小透明小水疱及溃疡,伴啼哭、流涎、发烧。该患儿最有可能的诊断是
- 雪口病
 - 原发性疱疹性口炎
 - 疱疹样口疮
 - 复发性口疮
 - 疱疹性咽峡炎
98. 医生刘某看药品经营能挣钱,便与院领导拉关系,请假离岗搞药品销售,时间近 3 年。医院未按规定履行报告职责,若导致严重后果,卫生行政部门会给予警告,并对该机构的行政负责人给予
- 行政处分
 - 行政罚款
 - 注销注册
 - 吊销执照
 - 以上都不是
99. 患者,男,22 岁。经婚前医学检查,发现患有梅毒。那么该患者
- 可以结婚
 - 可以暂缓结婚
 - 应当治愈后结婚
 - 可以结婚,但必须同时接受治疗
 - 不能结婚
100. 患者,男,60 岁。诉左下后牙咀嚼疼痛。口腔检查见牙体无明显病变,颊侧牙周袋深 6mm,牙龈退缩可见根分叉区完全开放,探针能水平通过分叉区,X 线片显示根分叉区完全开放。按 Glickman 根分叉病变分类法,属于
- I 类根分叉病变
 - II 类根分叉病变
 - III 类根分叉病变
 - IV 类根分叉病变
 - 正常
101. 患者,男,59 岁。左侧舌根疼痛 3 天,影响进食。口腔检查可见全口仅余留左下 6 残冠。缺失牙已义齿修复。左侧舌根部见 1 个直径 1cm 的溃疡,触痛明显。最佳处理措施是
- 溃疡切除
 - 磨除左下 6 锐利边缘
 - 化疗
 - 拔除左下 6
 - 泼尼松加利多卡因于溃疡基底部浸润注射

102. 患者,女,26岁。右上后牙龈肿痛1周,口服消炎药治疗无效。检查:左上6侧牙周脓肿形成,叩(+),冷测敏感,牙周袋8mm,应急处理措施是
- A. 局麻下开髓

- B. 龈上洁治
- C. 脓肿切开引流
- D. 龈下刮治
- E. 药物治疗

B1型选择题(103~132题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(103~107题共用备选答案)

- A. 可引起药物性牙龈增生的药
 - B. 是急性坏死性溃疡性牙龈炎的局部冲洗药
 - C. 是白血病牙龈病损的含漱剂
 - D. 是去除局部刺激因素后牙龈缘涂敷的药
 - E. 应用于牙龈切除术后
103. 1%~3%过氧化氢溶液
104. 氯己定溶液
105. 苯妥英钠
106. 2%碘甘油
107. 牙周塞治剂

(108~110题共用备选答案)

- A. 就业前体检
 - B. 加强医护照顾
 - C. 普查、筛检、定期体检
 - D. 预防并发症和伤残及康复
 - E. 转三级医院
108. 属于一级预防措施的是
109. 属于二级预防措施的是
110. 属于三级预防措施的是

(111~115题共用备选答案)

- A. 上下唇的游离缘,即皮肤和黏膜的移行区
- B. 唇红和皮肤的交界处

- C. 上唇的整个唇红缘,呈弓背状
- D. 唇弓两侧的最高点
- E. 上唇正中唇红呈珠状向前下的突起

111. 唇峰是

112. 唇红缘是

113. 唇珠是

114. 唇红是

115. 唇弓是

(116~117题共用备选答案)

- A. 用于重症肌无力
 - B. 用于青光眼,降低眼内压
 - C. 仅作为药理学研究的工具药
 - D. 用于有机磷农药中毒
 - E. 用于平滑肌痉挛
116. 新斯的明
117. 乙酰胆碱

(118~121题共用备选答案)

- A. 过敏性休克
 - B. 肾脏损害
 - C. 抑制骨质生长
 - D. 胃肠道刺激
 - E. 骨髓抑制
118. 四环素常见的不良反应是
119. 氨基糖苷类的主要不良反应是
120. 氯霉素的严重不良反应是

121. 红霉素的主要不良反应是

(122 ~ 123 题共用备选答案)

A. 腺样囊性癌

B. 腺泡细胞癌

C. 混合性牙瘤

D. 牙源性钙化囊肿

E. 牙源性角化瘤

122. 恶性肿瘤早期即可有疼痛、麻木等神经症状的为

123. 镜下可见影细胞的肿瘤为

(124 ~ 126 题共用备选答案)

A. 18%

B. 38%

C. 40%

D. 63%

E. 87%

124. 上颌第一磨牙近中颊根双根管者约为

125. 下颌第一磨牙近中根颊舌向双根管者约为

126. 下颌第一磨牙的远中根颊舌向双根管者约为

(127 ~ 129 题共用备选答案)

A. 眶下间隙

B. 颞下间隙

C. 翼颌间隙

D. 咬肌间隙

E. 颌下间隙

127. 最易发生腺源性感染的间隙为

128. 造成下颌升支部边缘性颌骨骨髓炎最常见的间隙感染为

129. 下牙槽神经阻滞麻醉如针头污染可造成的间隙感染为

(130 ~ 132 题共用备选答案)

A. 直方图

B. 圆图

C. 散点图

D. 直条图

E. 线图

130. 适用于构成比资料,表示事物内部各部分所占比重可绘制

131. 适用于连续性资料,说明事物随时间的动态变化过程可绘制

132. 反映两变量间相关关系可绘制

A3/A4 型选择题 (133 ~ 150 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(133 ~ 136 题共用题干)

患者,女,14 岁。口腔检查见上下前牙移位,松动 I ~ II 度,X 线显示第一磨牙牙槽骨弧形吸收至根中 1/2,上下前牙牙槽骨水平吸收至根 1/2 ~ 2/3。

133. 该患者最有可能的诊断是

A. 侵袭性牙周炎

B. 慢性牙周炎

C. 慢性龈缘炎

D. 快速进展性牙周炎

E. 青春前期牙周炎

134. 此病的致病菌主要是

A. 梭形杆菌

B. 链球菌

- C. 伴放线放线杆菌
- D. 螺旋体
- E. 乳酸杆菌

135. 下列关于该致病菌致病机制的描述, 不正确的是

- A. 产生白细胞毒素, 损伤乃至杀死白细胞
- B. 抑制中性多形核白细胞趋化
- C. 产生内毒素
- D. 产生成纤维细胞抑制因子
- E. 产生无活性胶原酶

136. 下列不属于该病治疗原则的是

- A. 早期治疗
- B. 调整机体防御功能
- C. 可同时进行正畸治疗
- D. 适当时同时使用阿莫西林和四环素作为辅助治疗
- E. 定期复查和进行必要的后续治疗

(137 ~ 139 题共用题干)

患者, 男, 11 岁。自诉跌倒后上前牙伸长不适。口腔检查见右上 1 伸长, 松动 II 度, 叩(+), 龈缘少量出血, 牙髓无活力。

137. 该患牙进一步的处理措施是

- A. 拍 X 线片
- B. 固定松牙
- C. 调殆
- D. 根管治疗
- E. 定期观察

138. 若排除了根折和牙槽突骨折, 则应诊断为

- A. 牙髓坏死
- B. 牙髓充血
- C. 牙髓炎
- D. 牙震荡
- E. 部分性牙脱位

139. 确诊后, 该患者的治疗方法是

- A. 固定松牙
- B. 固定松牙、调殆
- C. 固定松牙、调殆、定期复诊(6 个月)

D. 定期观察

E. 固定松牙、调殆、定期复诊(1 年内)

(140 ~ 142 题共用题干)

患者, 男, 19 岁。因左下后牙龈出现溢脓几周就诊。检查发现左下第 2 前磨牙颊侧根部瘻管, 挤压见脓液溢出, 牙体未见龋坏, 咬合面见黑色环状改变, 探针无法探入, 叩诊(+).

140. 该患者最可能的诊断是

- A. 深龋
- B. 急性根尖周炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 慢性根尖周炎
- E. 急性牙髓炎

141. 病变发生的途径是

- A. 深龋
- B. 外伤
- C. 畸形中央尖
- D. 牙周感染
- E. 血源性感染

142. 为进一步确诊, 应做下列哪种辅助检查

- A. 视诊
- B. 叩诊
- C. 冷热诊
- D. X 线片
- E. 探诊

(143 ~ 145 题共用题干)

在对某地区开展氟预防龋齿、局部涂氟活动时, 相关的操作人员要掌握氟预防龋齿的知识。

143. 氟化亚锡溶液不常用的原因是

- A. 配制困难
- B. 口味不佳
- C. 操作程序复杂
- D. 每次需新鲜配制
- E. 患者不易合作

144. 涂氟操作前必须要
- A. 向患者讲清注意事项
 - B. 半小时内禁食水
 - C. 选择适应证牙齿
 - D. 用消毒液洗手
 - E. 清洁干燥牙面

145. 临床涂氟不适宜
- A. 作为有效防龋措施
 - B. 作为公共卫生措施
 - C. 龋齿易感者使用
 - D. 专业临床使用
 - E. 预防乳牙龋

(146 ~ 147 题共用题干)

患儿, 14 岁。主诉右下颌后牙进食时疼痛 1 个多月, 无明显自发痛。口腔检查: 右下第一恒磨牙殆面深龋洞近髓腔, 探诊酸痛, 未探及穿髓孔, 冷刺激酸痛明显, 刺激去除后疼痛即刻消失。

146. 初步诊断牙髓状态为
- A. 可复性牙髓炎
 - B. 急性浆液性牙髓炎
 - C. 急性化脓性牙髓炎
 - D. 慢性闭锁性牙髓炎
 - E. 牙髓钙化

147. 最佳的治疗方法是
- A. 牙髓切断术
 - B. 干髓术

- C. 间接盖髓术
- D. 直接盖髓术
- E. 单层垫底后充填

(148 ~ 150 题共用题干)

患者, 男, 28 岁。因车祸颌面部外伤 8 小时后急诊。检查: 患者左面部肿胀明显, 眶周眼睑及结膜下瘀斑, 压痛, 张口受限, 张口度半指, 咬合关系正常。

148. 常规行 X 线检查时, 最好拍摄
- A. 头颅正位片
 - B. 头颅侧位片
 - C. 鼻颏位和颧弓位
 - D. 下颌曲面体层片
 - E. 颅底片

149. 可能的诊断是
- A. 面部软组织挫伤
 - B. 下颌髁状突骨折
 - C. 颧骨及颧弓骨折
 - D. 上颌骨骨折
 - E. 下颌骨体部骨折

150. 有效的治疗措施是
- A. 局部冷敷
 - B. 抗感染治疗
 - C. 颌间牵引固定
 - D. 颅颌固定
 - E. 手术复位